


SC. 4. P. 6.









IOANNIS A TVRRE  
MEDICI. AC PHILOSOPHI  
RIPALTENSIS  
DE SANGVINIS OFFICINA,  
MOTV, AC VSV  
LIBRI TRES.

In quibus celebres

RECENTIORVM AVCTORVM  
OPINIONES

De Sanguificationis loco, de Circulatione Sanguinis,  
de Fætus, Seminis, Lactisq; genesi, ac de nonnullis  
alijs cohærentibus ventilantur, & oppugnan-  
tur, vt ad VETERVM tandem placita  
cuncta dicta pro posse reducantur.



MEDIOLANI,

Ex Typographia Philippi Ghisulphij. MDC LXVI  
SUPERIORVM PERMISSV.

IOANNIS A. TARRI

MEDICI AC PHILOSOPHI

ALMA MATER

DE SANGVINEIS O. TIGNA

MOTV. A. C. V. S.

LIBRI TRES

IMPRIMATUR

**F. Io. Dominicus de Cremona Sac. Theol. Magister, ac Commissarius S. Officii Mediolani.**

**Carolus Ghioldus Theol. S. Nazarij pro Emnen.<sup>m</sup>, & Reuer.<sup>m</sup>**

**D. D. Cardinali Litta Archiepiscopo**

**Franciscus Arbona pro Excellentissimo Senatu.**





# FERDINANDO CAROLO

MANTVÆ, MONTISFERRATI &c.

DVCI SERENISSIMO:

IOANNES A TVRRE

MEDICVS, AC PHYLOSOPHVVS

S. P. D.



Nter ceteras generosorum Principum magnanimitates SER.<sup>ms</sup> DVX, non infimū habet locum ea, quæ humillimæ gratitudinis, & deuotionis insignia non despicens, hilari vultu Seruulorum, quamuis minima, munera suscipit, & lætis vlnis amplexatur. Hanc cum apprimè scitam in magnanimo CAROLI SECVNDI Genitoris tui spiritu nobilissimam tenere sedem, itaūt literatorum omnium cætus Illum. strenuum sui Propugnatorem, ac Euectorem suspiceret; trepidantem id fiduciam, & contremiscentem anhelationem meam adeo sustinuerat, ac firmarat, vt, omni sprete hæsitazione, timiditateq; hanc exiguam grati, ac deuouentis animi mei sæturam ad Ser.<sup>mos</sup> pedes suos deponere decreuerim. Duplex ad hoc me causa impulerat; naturalis vna, gratiosa altera. Ea me subditum, hæc deuinctissimum effecerat. Natus enim, educatus, moratusq; Ripaltę Montisferrati, non alium Supremum in Orbe Dominum,

4  
quàm CAROLVM ab incunabulis agnoueram .  
Benignissimo dono, nullisq; præmissis meritis, inter  
Sue Celsitudinis Curiales peculiari priuilegio adscri-  
ptus, Ipsum solum inter Heroes beneficum experie-  
bar. Quare, cum ad tollendas è Medicina præiudi-  
cialissimas humano generi nouitates, Opus de San-  
guinis officina, motu, & vsu construxerim, cui nam  
alteri, & subdititiæ oblationis, & gratitudinis ergo,  
illud offerre, donare, dicare rationabiliùs deberem?  
Debillimum Opus, exiguum munus: At uerò, si sub  
Augusto CAROLI nomine in lucem prodiret, ma-  
ximum futurum. Sed verò, dum prælo tradi festi-  
naret,

*Mors a quo pulsans pede pauperum tabernas,  
Regumq; turre*

benignissimum Orbi iubar eripuit. Cuius ergo sub  
auspicijs dignius tandem exeat in lucem Opus, quàm  
sub FERDINANDI CAROLI tam præclari geni-  
toris germinis inconcussi, Hæredis dignissimi, Suc-  
cessoris indubij?

Suscipe igitur, benignissime PRINCEPS, hanc,  
quantulacunque sit, memoris, deuotæq; voluntatis  
meæ significationis Ideam, eamq; sic excipe, vt quis-  
quis contra eam inuidus, aut æmulus blatterare,  
quouis tempore audeat, miro coruscantis protec-  
tionis tuæ splendore cæcutiens, & admiretur, & obmu-  
tescat. Interim verò DEVM OPTIMVM MA-  
XIMVM, vt te per sæcula Populis tuis sospitem con-  
seruet, humiliter deprecans, Amplitudinem tuam  
summè reuereor. Ripaltæ &c.

# Index Capitulorum primi Libri.

Cap. I.	Quod Iecur sit officina sanguinis, probatur ex Galeno, pag. 9	
Cap. II.	Probatur ulterius, Cordi non incumbere onus sanguinem ex chylo gignendi, sed Iecori.	18
Cap. III.	Soluntur rationes contrariæ Aristotelis, & Iscum Galeno quodam modo conciliatur.	24
Cap. IV.	Quoniam sit Iohannis Pecqueti de Sanguinis officina receptaculum.	28
Cap. V.	Quoniam inde de eiusdem succi officina fuerit Thomæ Bartholini sententia, Eiusque lepidæ ad Iecur exequiæ.	31
Cap. VI.	Observationes aliquæ circa dictorum Opinantium dicta.	33
Cap. VII.	Quæ de Laëcio, earum succo, & usu fuerit Ludovici Bilsi celeberrimi Anatomici sententia.	36
Cap. VIII.	Ersi dentur venæ lacteæ, ac Pecqueti Receptaculum, chylus tamen ad Iecur, non ad Cor migrat.	40
Cap. IX.	Lacteas venas, chylum receptantes glandulas Veteribus quodammodo innotuisse, monstratur.	43
Cap. X.	Chyli per thoracicum tubulum translationem nulli ex adverso suppensis vchylus inferuire posse, probatur.	48
Cap. XI.	Quod nullo modo illac fiat chyli transductio, inductione probatur: Et primò non per impulsione.	54
Cap. XII.	Chyli introductio in Lacteam thoracicam, neque attractione fit naturaliter.	59
Cap. XIII.	Chylus in totum per thoracicum tubulum ire non potest: Dato autem, quod pro parte multa absurda sequuntur.	61
Cap. XIV.	Quis usus dicto Receptaculo fuerit à Veteribus attributus; quæ circa ipsum sit opinio Auctoris; quidquæ sit lacteus succus in eo contentus.	64
Cap. XV.	Quid de lacteis sunt præsententis, tum thoracicis, de quæ earum lacteo succo sit tenendum.	66
Cap. XVI.	Tolluntur contrariæ obiectiones multæ.	70
Ca. XVII.	Respondetur ad experimenta contraria.	71
Ca. XVIII.	Adducitur Excellentissimi Torrini nuperrimum experimentum, & in propriæ sententiæ confirmationem trahitur.	77
Cap. XIX.	Tolluntur Bartholini oppositiones de Lactearum succo.	80
Cap. XX.	Quæ à dictis Auctoribus contra Galeni rationes pro Hepatis sanguifico ministerio opponuntur, & eorum solutio.	85
Cap. XXI.	Quævis contra Veterum auctoritates dicuntur, impugnatur, & ad bilem fecerendam Iecur non esse distatum, coniungitur.	88
Ca. XXII.	Examinantur officia à Pecqueto, & sequacibus Iecori attributa, & respuuntur.	92
Ca. XXIII.	Rei conclusio, & pro Iecore revivificante Carmen.	94

# Index Capitum secundi Libri.

Cap. I.	Circulationem sanguinis, si detur, qualis, & quæta cunque sit, non obesse Veterum de eiusdem officina opinioni, nec novam fulcire monstratur.	99
Cap. II.	Contrariæ rationes pro Circulationis velocitate probanda allatæ dissolvuntur.	105
Cap. III.	Adducuntur quædam, quæ admittendæ Circulationi obstant plurimum, & a contrariis solutionibus vindicantur.	108
Cap. IV.	Ostenditur causarum dicti circulatorij motus insufficientia, & Harveiani pro eo dispositi modi incongruitas.	117
Cap. V.	Aliæ circulationi admittendæ oppositiones sunt, & earum solutiones adductæ superantur.	123
Cap. VI.	Adduntur aliæ obiectiones ad dictam Circulationem elidendam, & adductæ responsiones refelluntur.	129
Cap. VII.	Probatum ulterius, non dari sanguinis circulationem.	137
Cap. VIII.	Sanguinem non ad Cor solum, sed & ad membra omnia naturaliter migrare per venas, probatur ex phlebotomia.	141
Cap. IX.	Sanguinem à maioribus venis ad minores, minimas, & extra naturaliter ire, à spontinis excretionibus, & à partium alitione arguitur.	146
Cap. X.	Per arterias etiam sanguinem versus Cor naturaliter moveri, ostenditur.	152
Cap. XI.	Adducuntur præcipuæ rationes Harveiani dogmatis.	155
Cap. XII.	Prima Harveiana ratio dissolvitur.	158
Cap. XIII.	Secunda Harveiana dissolvitur ratio.	165
Cap. XIV.	Tertia Harveiana ratio solvitur.	170
Cap. XV.	Solvitur quarta ratio Harveiana.	173
Cap. XVI.	Aliæ duæ probationes diluuntur, & ad oppositas auctoritates respondetur.	178
Cap. XVII.	Quod non sola contractio, Sed & distensio in pulsu sit Cordis, & arteriarum actio, probatur.	181
Cap. XVIII.	Quod eodem prorsus modo, ac tempore pulsent arteriæ, quo Cor.	189
Cap. XIX.	Quod non ob sanguinis à Corde factam propulsionem dilatentur arteriæ pulsantes.	195
Cap. XX.	Quod idem sit tum pulsus, tum respirationis usus, & is non ad sanguinem circulariter vehendum.	200
Cap. XXI.	Impugnatur Galtruchij de sanguinis circulatione sententia, & ad omnes eius rationes respondetur.	205
Cap. XXII.	Quædam sibi met ab eodem Galtrucchio factæ, & inde solutæ obiectiones refirmantur.	210



# Index Capitum tertij Libri.

Cap. I.	I	Nuentæ Lactææ nec veterem de lacte opinionem atterunt, nec nouam elucidant magis : lac enim in mammis, & ex sanguine, non è chylo gignitur.	219
Cap. II.	Multæ	contra offeruntur Neotericorum pro chylo pugnantium rationes, obiectionesque, & solvuntur singulæ.	227
Cap. III.	Fætus	in vtero non chylo, sed sanguine nutritur : frustra ergo putatur Lactearum inuentum quicquam conferre ad huiusmodi nouam opinionem firmandam.	236
Cap. IV.	Fætum	chylo non enutrirî probatur.	239
Cap. V.	Obiectiones	pro Deusingio, ac alijs contra prima superiora argumenta factæ perimuntur.	242
Cap. VI.	Obiectiones	contra secundas superiores rationes, chylum excludentes factæ, vel factu faciles solvuntur.	247
Cap. VII.	Afferuntur	pro fætus enutritione lactea tùm Deusingij, tùm sequacium argumenta.	250
Cap. VIII.	Solvuntur	omnia supra allata Partis argumenta.	252
Cap. IX.	Tot exempla	Neotericorum, a brutis sumpta, non valere in hominis vterino alimento statuendo, monstratur.	260
Cap. X.	In fætus	conceptu cum semine non chylum, sed sanguinem requiri, probatur vterius.	266
Cap. XI.	Semen	ex puriori sanguinis substantia, non è chylo fieri, probatur.	270
Cap. XII.	Proponuntur	contrariæ ad id pro chylo facientes rationes, & diluuntur.	277
Cap. XIII.	Aliæ	adducuntur rationes pro chylo facientes, & dissoluntur.	281
Cap. XIV.	Nùm	è sanguine alantur omnia corporis membra, disceptatur, & pro affirmatiua arguitur.	285
Cap. XV.	Contrariæ	Pallierij rationes afferuntur.	289
Cap. XVI.	Vnicum	succum ad totum corpus alendum, non plures requiri, probatur, & ad rationes supra positas respondetur.	291
Ca. XVII.	Non malè,	imò melius per vetera, quàm per noua dogmata, multa enucleantur Naturæ ænigmata.	296.

FINIS.

# Index

Cap. I.	De rebus in genere	1
Cap. II.	De rebus in speciebus	2
Cap. III.	De rebus in partibus	3
Cap. IV.	De rebus in modis	4
Cap. V.	De rebus in locis	5
Cap. VI.	De rebus in temporibus	6
Cap. VII.	De rebus in personis	7
Cap. VIII.	De rebus in rebus	8
Cap. IX.	De rebus in actionibus	9
Cap. X.	De rebus in exceptionibus	10
Cap. XI.	De rebus in iudiciis	11
Cap. XII.	De rebus in legibus	12
Cap. XIII.	De rebus in constitutionibus	13
Cap. XIV.	De rebus in decretis	14
Cap. XV.	De rebus in sententiis	15
Cap. XVI.	De rebus in iuramentis	16
Cap. XVII.	De rebus in testamento	17
Cap. XVIII.	De rebus in hereditatibus	18
Cap. XIX.	De rebus in usufructibus	19
Cap. XX.	De rebus in servitutibus	20
Cap. XXI.	De rebus in hypothecis	21
Cap. XXII.	De rebus in pignus	22
Cap. XXIII.	De rebus in emptionibus	23
Cap. XXIV.	De rebus in venditionibus	24
Cap. XXV.	De rebus in locacionibus	25
Cap. XXVI.	De rebus in conductibus	26
Cap. XXVII.	De rebus in societatibus	27
Cap. XXVIII.	De rebus in partnershipibus	28
Cap. XXIX.	De rebus in consortium	29
Cap. XXX.	De rebus in coactionibus	30





# AD LECTOREM.

## PRÆFATIO.



*Quantum cuius Reipublica præiudicij afferat sanctionum novitas, veterumq; immutatio legum, neminem, credo, sanæ mentis Virum inspicere latet: Ex ijs enim sicut inueterata. v. gula pesundantur; ita & granatur regimen, & totus rerum confunditur Ordo: hoc autem attrito, & omnis tollitur quies, & nullus non dissensionibus, civilibusque iurgijs datur aditus.*

*Idem die de quadibet vitæ disposita Arte: in eam enim quidquid non inuehitur, vt quod vetera, simulque imbibita præcepta subsanat; sic operatam concordiam destruit, ordinem confundit, & controuersijs sat aptam viam conseruit. Quod quidem, si in omnibus dammandum, potissimum in Medicina, vel detestandum, vel potius amare stendum est: cum nil eam perturbare sit potius, quin, & Orbis saluti pessima damna ferat: Si namque, vt iam Musa cecinit.*

*Eripit interdum, modò dat Medicina salutem; quid de lacera, quid de tritis inuoluta sperandum?*

*Sed enim quibusdam genijs aded naturale est, noua semper appetere, veteraque fastidire omnia.*

*(Est nam cunctarum novitas gratissima rerum.)*  
*vt nil non intentatum relinquat, quò se singulares, & ab omnibus destit. commonstrent. In quo tamen quibusque strenuis Artis Professoribus competit, omnes intend. re nervos, vt huiusmodi rixantias euellant, & tot novitatum Authores carpant, eorumque damnoſa inuenta, antequàm altius radices impingant, extirpare conentur.*

*Cum ergo mihi inuifere contigerit quendam Libellum ab Excellentissimo. Phsyico Ioanne Alcidio Genæ editum, in quo duorum Authorum, nempe Ioannis Terqueti, & Thoma Bartholini Anatomicorum illustrium quadam opuscula de Venis Lacteis Thoracicis, deque Vasis Lymphaticis continentur,*

in *hīs* conspexi, hosce, alioquin celeberrimos Viros, dictis nuper compertis  
 diffusibus, sanguificationis munus humano Hepati (: quod tamen iamper bis  
 ostosacula à Medicis omnibus obtinuerat) omnino eripere, Cordiq; dicare;  
 ex quo plurima, ad praxim pertinentia, immutari, & confundi, necesse est;  
 Non potui igitur me continere, quin statim, arrepto calamo, totis viribus  
 tantum paradoxum impugnare, & proscribere tentarem. Eoque magis ad  
 hoc me accingere decrevi, quod huiusmodi inuenti nescius, in quibusdam iam  
 ante editis scriptis meis, tamquam infallibile, & in Medica Arte concessum  
 posueram, Iecur venarum esse principium; in eo sanguinem procreari; ab  
 eoquē in omnes nutriendas abire partes, prout in Hippocratis, Galeni, Avi-  
 cennae, ceterorumq; Medicinae Principum scriptis inuenitur clarissimis notis  
 expressum.

Nunc omnia retrorsum videntur incedere. Iecur bili deditum, vel cruoris  
 inane coloratum ponitur. Sed non hac novitatum summa est; i sosmet enim  
 Pecquetum, & Bartholinum pro suo magis sulciendo inuento, latē subscribere,  
 inveni, circulationi sanguinis, ab Arueio Anglo Medico celeberrimo in  
 Medicum theatrum introducta. Scilicet hic acutissimus Naturæ scrutator,  
 cum Hominem Microcosmon à Phil sopho dictum perpe xerit, non mediocrem  
 illi laudem, sibi quē gloriam parare meditatus, si Calicum, qui solus in eo  
 deesse videbatur, circulationem, ac perpetuum motum conscriberet; magno  
 cum sua fama incremento, hunc ad hucusque feliciter in primario corporis  
 succo descripsit, sicquē ingeniosē, & ad vniū rem refecauit, ut plurimos  
 habuerit, & adhuc habeat acclamatores non paucos: Hac tamen speciosa  
 adinuentione permisa, mirum, quos coronatae Theses elaborantur, quos succu-  
 lenta dogmata, quod antiquissima documenta profiguntur: Nec enim hic  
 Novatorum ceterorum pes sistitur; sed, his nuperis traditionibus acceptatis;  
 plurima ad Theoricam Medicinā partem spectantia argumenta peruertuntur.  
 Neque inconsultū hoc factum, vel sit adhuc: Libertas quippē sicuti corporis,  
 ita & ingenij non à paucis expetitur eō, ut, Veterum studij abdicatis, possit  
 quis in omnibus elabi innocuē, & labor executiatur, & labendi facilitas eua-  
 dat in Artē.

Pauca etiam lachrymabiles sepe fines popeterunt. Latet sic forsan au-  
 guis in herba. Videbitur paulatim, in quem exitum sint tot novitates co-  
 surae. Ad Theoricam nunc illas dirigitur: sed quidnam tandem vertetur in  
 Praxim? ut enim domus præter sponte ruat, clanculum fundamenta truden-  
 tur. Purgatio, & phlebotomia omnium remediorum (diata excepta) præ-  
 cipua sunt. In *hīs* ritē administrandis summum artemisum, & prudentia  
 summa exquiritur; in *hīs*q; omnis serē Medici, vel honoris, vel dedecoris alea  
 consistit. Lapsus autem in his multi circa locum, tempus, quantitatem, &  
 electionem, quos effugere (dimittenda) vel aduenientes regere, sub speculo-  
 rum velorum umbra non displicet interdum.

Et verò, si chylo alteretur fetus, si non ex sanguine semen, lac, & nutritio  
 consistunt; qui pro his phlebotomia timeatur? Si ab arterijs omnes expul-  
 siones

iones adueniunt, si venarum solum opus reductio ad Cor est, quod vena scissa, quid scissionis locus conferet, quid purgantis electio inuabit? Si sanguis circulator, & ad Cor toties redit, quò pulsus (qui virium summa est) Aconomia seruetur, quid aliud Medicina incendet, quam, ceteris post habitis, naturalem hunc seruare, inuare, suscitare, vel seruare votum? Si ad collisionem iecur non facit, nec ad depurationem lien, renes; totaq; res in arterias deferentes, & Cor demandans voluitur; cur nos de alio solliciti, quam de Corde?

Huc ergo, queso, accurrant singuli Artis Eneflores, & omnium bene librato pondere, euigilent ad incrementa sophismatum. Augienti statim antiquam omnia succendat, non fossam, sed amphoram, non aerem, sed aquam opponant. Fateor, in hanc metam iam alios celebres insudasse Viros, eaq; non leuiter dissimisse paradoxa: sed quoniam iterum atque iterum. Alij insurrexere illorum propugnatores, qui ingenij salicitate pollentes, orienti dant oscula Soli (quis enim nouis non alliciat, si pulchra?) ideo non indecens, nec inutile futurum putavi, hanc nouiter Aream metiri, ut, vel ipsam forsan validius repetitis, vel alijs additis, vel contrariorum nouis iaculis repulsatis, noua machinamenta cadant, vetera solidentur.

Singulis autem occurrere, mihi occupatissimo, & imbecillimo non datur: plura tamen, & posiora percurram, nec veritati, quantum in omnibus per melicuerit, unquam deero; quò intra huius limites coercita Iuniorum ingenia, quæ vera sunt, essi vetera, non dedignentur. In tres igitur Libros opus hoc meum diuisum est; in quorum primo Iecur venosi, alimentosiq; sanguinis officinam esse, ut Medicorum hucusque placita voluere, multis probatur rationibus, exinde solutis oppositis argumentis; non obstantibus Vasis lacteis à Pecqueto, ac lymphaticis à Bartholino inuentis; qua data etiam, primam non virgere, nec infringere opinionem, demonstrantur. In secundo, multa contra Harueianam sanguinis circulationem aguntur obiecta, elucidantur obscura, & eius Valla diruuntur. In tertio autem circa sanguinis usum introducta nouitates, quoad licet, extirpantur, dum de lactis generatione, ac materia plura dubia enodantur; defatus conceptu, ac alitione; de semine; de solidarum partium nutritione; deque alijs scitu dignissimis rebus pertrahatur; ut in omnibus antiqua firmatur veritas, Arsque in suo pristino nitore seruetur.

Tu ergo, benignissime Lector, si in hunc meum fortè incidas laborem, ne statim illum abicias, tamquam infimi Auctoris: sed ad rem ipsam medullatus intendens, perlegere ne dedigneris: sic enim vel in eo acquiescens, recentiores illas sententias condemnabis, vel saltem ad meliora contra ipsa smet iacula forsan incitaberis. Vtrumque mihi gratum, Arti honestum, tibiq; non inutile cadet.

Ne expectes autem à me eos dicende lepores, eas styli elegantias, easq; grammaticales titillationes, quibus supradictorum Auctorum, Neotericorumque libri undique sunt repleti: Non enim in ijs proferendis, sed in verè enucleando, scopum præfixi meum, eius dicti non inscius.

» Quæ pura sunt, nuda videri amant ;

» Mos est sæda coloribus abdere :

» Vix vlla est sine suspitione delinitio :

*Puillum Opus est : ast*

» Et paruis quoque rebus inest sua sæpè voluptas :

*Interim vero, Turris non immemor, vale : Ripalta Montisferrati &c.*





# LIBER PRIMVS,

IN QVO

DE SANGVINIS OFFICINA,

DEQVE AD EAM CHYLI MOTV

DISSERITVR,

ET

OBIECTIONES DISSIPANTVR.

CAPVT PRIMVM.

*Quod Iecur sit officina sanguinis, ex Galeno probatur.*



**N**Emini, opinor, non innotescit, si quid circa sanguinis officinam fluctuationis adhuc in Medicorum scholis adsit, consistere in reciprocis tùm Cordis, tùm Iecoris fautorum, qui passim, & per varia tempora insurrexere, mox intermissis, mox effervescentibus luctis: Quamuis enim visus fuerit aliquando Plato in hoc munus aduocare venas, nec sine aliquo Galeni consensu; id tamen non de specifica, veraq; sanguinis generatione, quæ ab omnibus, & a Platone ipso, non in vasis, sed in visceribus libenter reponebatur, intelligendum fuerat: sed de quadam vltiori sanguinis coctione, ac perfectione, addita, vt puto, non à tunicis tantùm venarum (virtute ipsis à Iecore præstita); sed ab ipsomet etiam in ijs præexistente sanguine, qui si non aliud, sui sal-

*Quæ sangui-  
ficatio vanis  
competit.*

tem

Lienī signi-  
ficationem  
competere  
negamus.

tem miscella, in sibi similem naturam nouum accedentem sanguinem  
ultrò disponit. Tum, & quicquid de liene aliqui Neotericorum com-  
menti sunt pro imperfecta quadam sanguificatione et eiusdem chyli por-  
tionis ab ipso attracti, & auctoritate vacat, & ratione. Auctoritate  
quidem, cum nullus Veterum illi tale munus attribuerit: nunquam enim  
(vt alios reticeam) dixit Galenus, a liene sanguinem procreari; sed benè  
ab eo limosiozem, & crassiozem sanguinis portionem ex hepate allici,  
vt, illius seiunctione facta, reliquus purior maneat sanguis, & peculiari  
illiusmet continuata coctione, aliquid purioris succi pro suimet propria  
alitione aliciatur; ad quod multum facere arterias, quæ ei copiosæ à  
Natura tributæ sunt, docet idem 4. de vsu part. cap. 15. Ratione autem:  
quia Natura unicuique actioni principem aliquam partem in corpore  
dicauit, quæ si bina aliquando fuerit constructa, eiusdem prorsus sub-  
stantiæ, naturæ, ac qualitatis vtraque, & in vtroque latere visitur, vt  
videre est in renibus, oculis, auribus, naribus &c.: lienis autem substan-  
tia, natura, qualitas, quantum colore, sapore crassitie, densitate, duri-  
tie, & formatione ab hepate distent, unicuique constat.

Alternæ fuere duorum illorum viscerum, cordis nempe, & iecoris  
victoriæ, vsquequò, Galeni accedente facundia, & Anatomica peritia  
eiusdem, facile ei fuit in suammet opinionem cunctos aduocare sequa-  
ces; Vtpotè qui palpabili probatione, & congruentijs ad vnguem se-  
cundantibus, non deserta interim Cordis dignitate circa sanguineæ por-  
tionis perfectionem, elaborationem, Hepati vniuersum condendi san-  
guinis venosi negotium cooptauit. Et quamuis non deerint, qui inti-

Nùm à ieco-  
ris carne, aut  
ab ipsius ve-  
nulis giga-  
tur sangui-  
s contronert-  
tur, & ab  
vtriusq; citan-  
tur Auct.

mius rem disquirentes, controuerferint, nùm à parenchimate, seu carne  
ipsius; nùm verò à venulis eiusdem, sanguis perficiatur, Alijs pro illo  
tenentibus, vt fecit Vesallius lib. 5. de corp. hum. fabr. cap. 7. Christopho-  
rus à Vega de Art. meden. cap. 2. & 5., Io. Baptista Cortesius Miscellan. m-  
dic. decad. 9. Epist. 5. (qui verè cum Galeni mente 4. de vsu part. 12., &  
alibi passim expressa, concurrunt): Alijs autem pro his, vt Iacobus  
Schechius lib. de prim. instrum. sanguificat. Laurentius Iouertus decad. pri.

Parùm tamen  
hoc pro Artis  
exercitatio-  
ne refert.

parad. 4. Piccolhominijs lib. 2. lect. 17. Attamen hoc parùm pro Artis  
exercitatione refert, cui sufficit organum actionis inuestigare, de prima-  
ria simplici particula parùm alioqui sollicitæ; cum hoc indubitatum sit,  
quicquid in parte illa organica vitiatur, actionem quoque ipsam plus  
minusuè vitiari: maximè quando, qui à parte venularum sunt, opem pri-  
mariam eis a carne impartiri existimant; itaut hæc disceptatio tota  
ferè dependeat ab illius articuli decisione, de Portæ, Surculorum, cum  
Cauæ Surculis coitu, vel separatione, qui etiamnum videtur anceps.

Iecoris offi-  
cium, sangui-  
ficare chylū.

Proprium igitur Iecori à Medicis attributum officium, etsi nunc ite-  
rum in controuerfiam reduci tentetur, illud est, vt chylum ad se per vena-  
rum Surculos, qui in Portæ venam inferuntur, vel ipsius immediata sunt  
germina, attractum, in sanguinem probum pro suo alimento commutet:

Alterum



Alterum verò, ei aliorum gratia concessum, est, vt sibi superfluum sanguinem in totum corpus per suos canales, venas scilicet, distribuatur, suoque nativo calore ventriculum foueat. Diceretur autem non male alterum hoc opus accidentale quoad ipsum: quia, cum lecor rationis sit expers, ac solummodò à naturalibus suis potentijs ducatur, nil aliud, quàm seipsum nutrire reuera contendit; accidit autem, vt alimentum sibi, ob principem vim sæcundè agenti, superfluatur multum, à quo & ventriculi calor fouetur, & quod inde à se pellitur, cæteræ partes attrahunt, & in locum dissolutæ substantiæ sibi reponunt; Quod quidem à gubernante Natura sic seriò dispositum est, vt alterum alteri membrum, quamuis inficium, elaboret, simul communicent omnia, & inuicem foueantur; quemadmodum, & de ventriculo, Corde, cerebro, ac alijs particulis, quæ pro toto, vel pro reparanda Specie laborant, fieri, supponendum; vt perbellè de ventre, & iecore idem docet *Gal. lib. 6. de placit. Hipp. & Plas. cap. 8.* Sed quoniam delicatioribus auribus quoddam hoc videretur paradoxum, age, & proprium absque illo adiecto hoc quoque munus Iecoris dicatur: quippè, cum duplex accidens sit, separabile, & inseparabile, si de ultimo habeatur sermo, nil differt, siue proprium, siue inseparabiliter contingens munus hoc Iecoris dicatur. Si ergo quæsierit quis, quodnam membrum in homine sanguini procreando dicatum propriè à Natura extet, liberè respondere licet, hepar esse, non Cor, à quo solus arteriacus, spirituosusque gignitur cruor.

Alterum alteri membrum quamuis inficium elaborat.

Sanguis procreando Iecore dicatum non Cor.

Huius dogmatis rationes multas toto superius citato libro cumulat Galenus, desumptas à similitudine plantarum viuentium, à iecoris figura, colore, substantia; à vasibus tum proprijs, tum ab eo verè emanantibus; & ab adiacentibus recrementorum expurgatorijs; Quæ adeo claræ sunt, vt ferè demonstrationem pariunt, & propterea Auerroes, postquam lib. 3. de part. ani. cap. 4. in commento Aristotelis, & Galeni sententias ritè examinauit, eosque conciliare circa sanguinis generandi locum conatus est, postmodum apertissimè concludat, hepar ex chylo primò sanguinem generare; Cuius verba sunt hæc: Et dicamus, Iecur vniuersaliter habere iuuamentum necessarium corporibus animalium sanguineorum: quia est instrumentum generatiuum sanguinis venarum: Sed, cum sanguis sit necessarius ad esse animalium nutrimenti gratia, atque augmenti; ideo hoc membrum est necessarium pro esse animalium, quod ostenditur, quia est primum membrum, quod primò conuertit chylum in sanguinem.) & Vesallius, licet luxuria carpendi Galenum laboraret, licetq; de venarum origine steterit anceps, hoc tamen pro iadubitato concessit, sanguinem gigni in hepate, ab eoque in Cor pertransire, vt in *supracitato lib. 5. cap. 7.* legitur. Siquidem.

Sicuti tenemus, eo loco esse arboris alendæ principium, vbi, iactò semine, videmus, ad auras germinari truncum, qui in varios ramos eductus

Primo Galenatio à plantarum similitudine.

que

que scinditur, vt in minima cacumina deueniatur; in terram autem varias radicum soboles profundari; ita in corpore nostro ibi principium nutritionis existimandum est esse, vbi radicationes venarum versus abdomen, quod, vt ait Hipp. lib. de hum. 4. & Arist. lib. 3. de part. ani. cap. 3. in animatis terræ vicem gerit (in eo enim sit prima alimenti concoctio, & præparatio succi, qui peruenulas fugitur) emanant; & vnde truncus magnæ venæ incipit, qui postmodum adeo ramificatur, vt in exillimas omnium extremarum, & externarum partium venulas tandem exoluatur. Sic est de hepate: nam ab ipso prodit vena Portæ, à qua innumera bilis progerminationum, hiantiumq; riuulorum soboles in ventriculū, & intestina (quasi quædam radicatio) implantatur; Ac indidem exit Cauæ truncus, partim superius, per Cordis dexteram transiens, ad membra omnia, vsque ad minima distributus, partim inferius ad omnes etiam minimas extremitates miro ramificationum implexu deriuatus.

Vasorum venalium à lecore progerminatio.

Cor nullam venalem radicationem in abdomen implantauit,

An Portæ, & Cauæ capitula inter se coeant, valde dubium est.

Ratio secunda à figura, & cōformatione partu.

Ratio tertia à colore, & substantia partu.

Quod de Corde dici non potest: id enim in abdomen nullam venalem radicationem implantauit propriam (cum nec lien, nec ventriculus, nec intestina, nec mesenterium venas sanguiferas, quæ cordi propriè communicant, nanciscantur); nec ab eo ad omnes ideo partes per venales ductus distribuitur sanguis. Circa quod aduertendum est, venam Cauam, vbi in lecoris gibbam implantatur, in minores, ac minimas venulas ibidem finiri, & obliterari; sicuti etiam accidit venæ Portæ in concauam intromissæ partem. Quæ venulæ an inter se coeant, ac inferantur, ita ut sanguis ab hac in alteram venam commigrare, citra intermedium substantiæ lecoris penetrandæ, liberè possit, vel non, valde dubium est: nam, etsi Vesalius ponat tanquam clarum, dictas venas per sua oscula simul communicare: attamen & ante ipsum Galenus, & post eum Curtius, Faloppiusq; qualibet adhibita diligentia, apertè testantur, huiusmodi vnionem, seu connexionem se nunquam potuisse discernere; sicuti, & Bartholinus, cum Slegelio, quauis pariter addita in bubulo hepate cura, idem fatentur.

Figura quoque, ac cōformatio Hepatis non paruum est huiusmodi veritatis argumentum: nam eum in formas varias iuxta partium contiguarum commoditatem diuidatur, & veluti quadam manu dextram, ventriculi foueat, infinitasq; ac inuolutas venularum cauernulas in se contineat, non potest non dici, in ipso chylum oberrare, ex quo eius in sanguinem conuersio contingit. Cordi autem vnica forma oualis, in ferè acutum desinens, data est; & cum duplici solum ventriculo præditum sit, in suumq; corpus venulas paucissimas admittat, quatuor autem ostijs satis parentibus peruium vndique reddatur; illud potius ad transitum sanguini præbendum, quàm ad coquendum, & gignendum ipsum, aptum natum esse, dicendum est.

Color etiam lecoris, & substantia, quæ sanguini cocto, aut concreto simillima est, videtur, quod aliter esse non posse, commonstret: nam vnaqueque



unaqueque pars in sui similitudinem concoctos à se humores transfert ; unde videmus , à ventriculo chyllum dealbari , à mammarum glandulis lacteis sanguinem in lac converti ( vt in tertio sustinebitur Libro ) , à seminalibus testibus semen fieri , à pingui corpore oleosum , seu pinguem generari suocum : Ergo , cum nulla pars in homine sanguini similior sit iecore , iure dicimus , ab ipso iecore propriè sanguinem generari . Cor e contra , nec sic purpureum , sed pallidum magis ; nec molle ; sed durum densumq ; nec intus sanguineum , sed membraneum , nerueisq ; fibris plurimis præditum ; neque chylum imbibere ; neque sanguinis formam ipsi tribuere poterit .

Vasa item eandem sententiam comprobant : Nam à iecore derivari venas , testantur Hippocrates lib. de alim. num. 7. qui etiam 2. Epid. 1. Cava-  
nam venam hepaticam , seu iecorariam , nominat , Galenus idem cit. lib. 6. de placit. Hipp. & Plat. cap. 5. item lib. 4. de usu part. cap. 12. & 13. Anic.  
can. 1. fen. 1. doct. 3. cap. 3. & post eos Valsesius , Fallopius ; ( qui de hoc peculiarem disputationem contra Aristotelicos instituisse , fatetur lib. de anat. obser. pag. 114. ) Andreas Laurentius lib. 4. quest. 1. exercit. 6. Hieron. Capivicius de meth. anat. cap. 16. valijq ; Anatomici plures : Nec enim Vesallius , nisi plura pro Aristotele contra Galenam agat circa Cavae capacitatem , & alia ad hoc argumentum spectantia , contrarium de finire audeat : Sed & Bartholinus ipse Anatom. reform. libello pri. de venis cap. 1. hanc contra Aristot. disertè sustinet positionem . Idem testatur ipsarum venarum naturam quæ quæta manet , vt iecur nec pulsatione movetur , vt Corp. & ab eo manantes arteriæ , vt autem ait Poeta  
Sic canibus earuli similes , sic matribus hadi :

Testatur earum substantia arterijs longe mollior , subtilior , simplicior , & ravior , quæ cum iecoris , eiusq ; vasorum mollicie , subtilitate , simplicitate , & raritate magis confert , quàm cum Cordis , eiusq ; arteriacarum appendicum duritie , crassitie , compositione , & densitate . Testatur denique modus derivationis , ac insertionis ipsarum in dictamet viscera : nam si Portæ venam inspicias , ab infinitis , vt sic dicam , venularum concauæ iecorariæ regionis rivulis in magnum Caudicem , qui postea per alios suos ramulos mille ferè canaliculos , tamquam radices , naturales in partes omnes insinuat , eam efformari conspicies : Si Cauam consideres , ipsam etiam ex plurimis iecorariæ gibbæ venulis in Truncum , qui deinde per totum corpus supra infraq ; copiosissima sua germina , in formam radicatæ , & ramulosæ arboris , pandit , illam enasci , & effingi , obseruabis . Cum Corde verò Portæ vena haudquaquam , nisi per Iecoris carnem , vel anastomosis aliquam communicat ; Caua autem non in Cor penetrat , aut radicibus firmatur , sed per dextram illius auriculam transiens , solum veluti ostium quoddam in dextrum eius ventriculū aperit , tribusq ; valvulis aditum sibi à Cordis influxibus oculū-

Ratio quanta  
à Vasis ; Ven-  
as enim à  
iecore deri-  
uari , probetur .

A Causa va-  
lulis in Cor-  
eantibus, ibi  
suum non esse  
originem,  
arguitur.

dit. Ad quod nescio, cur non respexerint, qui à Corde venas deriuant: Si enim canalium vsus proprius est succum contentum vehere, manifestum, ibi originem esse, à quo succus in canale ingreditur, non vbi ab eo exit. Si ergo à iecore sanguis in Cauam, & ab hac in Cor traducitur, non e contra, manifestum, ibi, non hic, illius esse originem. Valeat etiam, quod in ijs animantibus, quæ dextro Cordis ventriculo carent, nec vena hæc aperitur in Cor, sed sursum pergens, ramificatur in pectore; cui tamen tunc in Iecur insertio, & incauernatio minime deest. Signum evidens, huic, non illi suum deberi productionem: Concludatur ergo, si continentia à iecore veniunt, etiam contentum ab ipso prodire, imò produci.

Ratio quanta  
ob adiectionem  
excrementorum  
purgatoris.

Sed nec vllum membrum, aut vas propè Cor efformatum fuit, quod reciperet, traheret, & expurgaret excrementa, quæ necessarii in coctione chyli erant progignenda, sicuti videmus, propè Iecur de his prouisum optimè à Natura esse siquidem, & renes ad ferositatem expurgandam, & cystim felleam probile, & lienem pro atro, ac sæculento succo expiando, Iecori propè astare, omnibus hucusque non fuit ignotum. In qualibet autem coctione excrementa quæpiam ab agente calore segregari, omnimò necesse est. Sequeretur ergo, si Cor sanguinem, coquendo, gigneret, vt impurgatus ille ad caput, pectus, Iecur, lienem, cæterasq; demandaretur partes; vel totus in aliquam aut retroiret, aut protruderetur partem, in qua posset purificari, & inde ad alendas partes dispensari. Sed vtrunq; inconueniens: nam, si primum, in prospera partium succederet alitio; & vbiq; scaturigo excrementi-ria superesset, peculiaribus gignendis morbis idonea, vel saltèm sæditibus nimium obnoxia; Si secundum, deberet aliquis peculiaris dari ad illam partem ductus, qui in Corde nullus agnoscebat, nisi vel generalis in totum corpus dispensans, nempe Aorta; vel peculiaris in pulmones reiectans, quibus excernendi non nisi per tussim, à Natura conceditur facultas; & illa non omnibus data est, & quibus datur, præter naturam esse, & periculo plenam, constat. Retrogredi autem per Cauam in Iecur, & à valulis supradictis impeditur; & à contrario naturali consensu negatur; & vbi fieret, Naturæ sagacitati, quæ semper superflua deuicat, & Cordis dignitati, quæ non agnoscit elatiorem, non parum derogaret.

## CAPVT SECVNDVM.

*Probaturs vterius, Cordi non incumbere onus sanguinem ex chylo gignendi, sed Iecori.*

Prima ratio à  
congruentia  
& laudabili  
securitate.

**Q**uod si his Galeni rationibus aliquid addere libet, adde in primis, quod neque Cordi, in quo velocissimi spiritus, & arteriaci sanguinis

guinis fucina est; quod primum, ac verè princeps totius corporis membrum dignoscitur; in quo propriè vitalis, ac pulsifica facultas, (quæ aliarum, animalis scilicet, & naturalis regina est), residet; cuiquæ potissimum animi regimen, totiusq; corporis fouendi munus incumbit; tantum vltro debebat onus incumbere, vt sanguificatio putatur; alioqui sub onere nimio casuro. Sufficiat ei si totum viuificet, regat, foueat, Cerebro vim spiritalem, ac calorificam influat, Heparq; ipsum suo disfluente calore consēpiat. De reliquo, & Hepati alimonie concoctionem, distributionemq; & cerebro sensum, motum, ac intellectum inesse, exerceri, & ad actum deduci, sinere debet, finitq;: Sic enim, & in Politicis fieri, videmus. Sæ Regi est, vt omnibus præsit, imperet, regat: opera verò tum status alimonie, tum Consiliorum adhibitionis, tum Populorum, exercituumq; ductus, quibusdam Principibus demandatur, ac ferè absoluta permittitur. Alioqui dubium, ne sub onerum multiplicitate, insultuumq; immediato robore deficeret, operum verò seruitute Regia sædatur Maiestas; Quorum vtrunq; graue, ac periculosa, adde, & indecens iustissimè censetur: Quippè Principibus nimium præiudicialia censentur immediata certamina, nimium grauis ad opera ipsa descensus, nimis indecorum mechanicos ferre labores. Ea quidem, quia, si malum aliquod ab hoste contingat, immedicabile est, cum à nullo alio suppetias habitari sint; quod in alijs cessat, ob influentem à Ducibus vim, robur, & opem: Hæc verò tum, quia sic à præcipuo, & generali diuertuntur officio; tum quia quod quid delicatius, eò facilius læditur, deteritur, & sædatur. Naturæ ergo prudentia, à qua cuncta, quæ hominis Artē cadunt, desumpta sunt, Cor, tamquam humani Orbis Regem, in medio pectoris, vt in munitissima Arce locauit sepsit, muniuitq; primum; inde verò à Coquinarijs lebetibus, & expurgatorijs ductibus, quodam validissimo septo intermedio, seiunxit; vt modò de tot exploratoribus simul, & bellantibus (qui sensus sunt) in alta turricula collocatis, & quod magis est de fidissimis ei paratis in altiori sede Consiliarijs recteant. Absit igitur ab eò periculum, & indecentia hæc, vt in Regiam Coquina migret, in Aulam contentio. Quæ adhuc dissimilia sunt, alibi euincantur prius; quæ sæda, longius educantur omnia, & quæ propinantur ei, purissima sint, & ab omni prorsus labe remota: securi autem præcipua alimenti, & populationis ministeria relinquuntur; huicq; numerosissimus Venarum famulatus, tamquam præcipuo Regis Proceri, assit, quò sine vilo labore Regi non solum, sed & vniuersæ Turbæ affluentes porrigantur vndique dapes.

Neque rerum ordo (cuius tamen tanta in naturalibus dignitas est, vt sine eo nil non inconcinne secundum Naturam esse dicatur); nec viscerum situs quicquam pro sanguificando chylo annuit Cordi: Etenim cum ventriculus in primis ab illo distet non parum, & infra ipsum præterea situs sit, si Cor assumendi chylum, vt in sanguinem conuerteret,

ministerio vacaret, ad quid finire, vt ille iam coctus, adhuc inferius per pylorum ad intestina descendat, quod postmodum per tortuosus anfractus eundem à remotiori attraheret? nonne satius fuisset, vt ad se per rectam viam à stomacho probam succi partem alliceret, in sanguinem conuertendam, excrementa verò intestinis excremenda relinqueret? Sed nec illi Cor proximum est, nec vllum huiusmodi ductum, qui rectè à ventriculo ad se feratur, sibi fecit Natura: Signum euidentius, de què ad ipsum demandandum fuisse chylum. Quippè Natura nec in superfluis affluit, nec in necessarijs desistit. decur autem ex altera cum à parte ventriculi digniore, & commodiore contiguum sit, in illa ferè regione corporis secundum longitudinem viuat, pluraq; vascula tamquam canales, in illum, ac intestina porrigat: facillimè huic incumbere muneri, & in totum corpus citra tot retrocessus alimentum dispensare potest.

Tertia ratio à capacitate.

Nec magnitudo Cordis, nec capacitas ea est, vt possit tantam chylī molem, quanta bis, ter, quateruè in ventriculo singula diè disponitur, in se coquendam recipere, ac retinere, nisi succedesset, ad iugiter portionem post portionem admitteret, ac alternatim pelleret? Quod, vt singulis manifestum, alia probatione non eget, si quantitas succi à ventriculo exeuntis, & ab intestinis percolati, cum Cordis alterutra cavitae comparatur. Si sic verò, quæ coctio in oculi nictu, & nouo semper, ac iterum affuso crūdo, expectanda? & quis aliquid cogitandi, & deliberandi, circà rerum regimini locus, tempus uè daretur? Et quis iræ, amoris, lætitiæ cæteris uè animi passionibus additus? decur autem tum magnitudine præpoller; tum capacitate, non ex dens, miris, innumera bilibusq; venularum marandis potitur tant per eos aliquid temporis succus oberrans, non possit non concoqui, percolari, ac perfici; tum alteri actioni minimè vacans, nec à coctione distrahitur, nec ab aliquo perturbatur.

Quarta ratio temperaturæ.

Vterius: cum Cor calidissimum omnium corporis partium sit, itaue vix tactus; si sit immediatus, eius ventriculorum (præcipuè sinistri) caliditate ferre possit, quomodo cum chylō, qui frigida naturæ est, proportionem habiturum esset? Aut enim Cor à chylī temperie refrigeraretur, aut chylus uretetur, aut hic saltem in calidissimam naturam corpori, quod temperatum est, nutriendo ineptum, abiret; vbi autem alterandi subiecti non corruptio, sed eiusdem maturatio, vniū, vel perfectio expetitur, non contrarietas, sed analogia, non oppositio, sed similitudo, non improprio acti dentium, vel substantiæ, sed moderata proportio expetitur. Quod autem chylus frigidus sit, scitis, & ciborum, potuumq; coquendum (si sumpta simul omnia) & acuatior, non diuini, considerentur), tum actualis tum potentialis friguitas, & ventriculi concoquentis substantia exanguis, membranosa, nerveaque, ac ideo frigida, vt docent cum Galeno plerique Anatomici; & si addantur vasa, per quæ ferri ipsum ad Cor, Neoterici contendunt, ipsa quoque frigidiora

Chylum si-  
gidum esse  
probat ex  
causa efficiē-  
te, & mate-  
riali.

frigidiora censuit *Rossineus cit. lib. 5. cap. 22.* ubi de lactis loquens, 5. Frigidiores (inquit) sunt venis reliquis; quod hæc contactu sanguinis; 5. qui chylis calidior est, incalescunt; & tamen non ad medium temperamenti statum veniunt. ) Cui consentit *Bartholinus lib. 3. de venis cap. 3.* Id ipsum arguit, & acidula eiusdem qualitas, & aqueus color, & lactea similitudo, & inodora substantia, & tenuis fluxibilitas, nullaque illius post exitum consumptio, euolatio, condensatio. Item probat, & assertis Neotericorum Chorus non indecens, & in specie nuper citati duo, qui ob id illam lactis immediatam materiam (quamvis indigne, ut in tertio videbitur libro) autumant; circulum illum euitare cupientes, quod è chylis sanguis, & è sanguine chylus (sic lac denominant) fiat. Ergo, si in omnibus Natura gradatim incedit, iuste debuit per lecur moderate calidum, ut quod ex sanguinea substantia minimum immutata constet, chylus transire, ibique ulterius concoqui, calcescere, purpurea donari, ut Cordi alendo, spiritibus, sanguinique arterioso reparandis idoneus, proportionatus, & facilis redderetur.

Quinimò, & quia in Corde fons, focusque natiui caloris residet ex *Arist. 3. de part. ani. 7.*, non nisi periculosè in illud crudi adhuc alimenti moles continuè accederet: vel enim vitalis obrueretur flamma, vel hæc eadem, validius agens in sibi contiguum obiectum, illud vreret, seu corrumperet. Et primum equidem euentu facillimum, sicuti enim frigidusculi aeris accessus flammam potius viuificat; ita aquæ, vel frigidi, sed cædi liquoris affusio eandem retundit plurimum, & potissimum si crudum crudo semper addatur. Quantum autem facilius, & periculosius refrigeretur Cor, quam cæteræ partes, & quare, vide *Gal. lib. de usu puls. cap. 2.* Secundum verò non minus facile: quia validissimi contractus imbecilliori plerumque parat interitum: quæ enim lentæ, & paulatim sunt mutationes, tutæ sunt, quæ repenti, ac plurimum, naturæ inimicæ, ut ex *Hipp. 2. aphor. 53. colligitur.* Exemplo sint, quæ extrinsecus igni accidunt: huius enim foco si immediate aliquid coquendum superponas, vel suffocatur ignis, vel si is vincat, exterius adurens, summa sua aëtiuitate viam sibi met ad incima coquenda præcludit; cum alioqui si vel in moderata distantia, vel medietate, scilicet in aëre, flamma, chalybe &c. illi coquendum offeratur, optimè res succedat, & perfecta expectetur concoctio: Ità ergo, & cordi casurum, verisimillimum est in ipsum enim immediate delatus chylus, vel calorem nativum extinguere, si hic fortè imbecillus, vel vratur ipse, si is validus extet; quæ non accideret, si sibus in ventriculo, tamquam in lebetæ, feruaret, vel, uti in moderata distantia, coquatur chylus in lecore: calor enim à flamma intus fluens, si fomentum continuum focus suppeditet, quamvis retundatur, inuincibilis est; & quamvis actio retardetur, vel à crudo prohibeatur interitum; is tamen semper accurrens, vel tandem euincit, vel sine discrimine cedit. Sed hic dicit aliquis, ipsum Cordis ventriculum prolebetæ

Quinta ratio à caloris natiui foco, & origine.

Obiectio.



**Responsio.** inferuire, æqua proportio, si focus extra ipsum ventriculum esset, & post eius parietes: at quia in ipso met ignis vivit, pullulatq; semper, frustra is pro lebe, si focus est, supponitur. Aduertat hic etiam quibus, cum chylum frigidum dicimus, intelligi de frigiditate illa, quæ in animalis dari sine iactura potest; tùm & de virtuali potius, quàm de actuali: cum in vivente nil adeo frigidum, quod actu teporem non habeat.

**Sexta ratio à sanguinis venosæ arteriosæque diversitate.** Amplius: Cum vnica Cordis sit, ac vniformis structura, quod per consequens vniformis sit temperaturæ, necesse est; maximè cum non sit corpus adeo magnum, nec eius cavitates adeo distantes, vt alteram in dextera, alteram in læua eius parte temperiem (quicquid de æquali vtriusque calore sit) possit obtinere. Si sic autem est, quomodo duplicem sanguinem, nempe arteriosum, qui tenuissimus, calidior, ac flauior; & venosum, qui mediocriter crassus, purpureus, & temperatus est, progignere valet? Sed & caloris, saltèm actualis diversitate concessa, nec à Corde sanguinis illa diversitas emanare potest: nam in Cavam, ac venas alias, ab eodem propriè, ac naturaliter egrè, vel non ob sigmoides valvulas datur sanguinis regressus; Qui verò ab ipso in arterias penetrat, totus, per sinistrum transiens ventriculum, vniformis erit, nulli locorum ipsius substantia mutata. Ad secur itaque spectat venosi succi constructio, & ad Cor arteriosi; sicque clara diversitatis causa assignabitur, & melior regendi corporis æconomia servabitur.

**Septima ratio à Cordis motu.** Item: Cum Cor continuè moueatur, subfultetq; non solum, sed & alternatim dilatetur, constringaturq; non videtur ad tantam succi molem excoquendum habile; idque tribus de causis. Primò quia motus, præcipuè dilatans, & constringens, variat mutuum alterantis, & alterati contactum, qui in coctione necessarius est, & ex hac variatione, actionis distractio contingit. Secundò quia flammæ directos ignis contorquet. Tertiò quia ob vacui metum, vel quod in angustia pellitur, in dilatactione reassumitur, vel quid aliud superuenit. Non primum, quia inutilis redditio. Si secundum, vel illud succus est similiter coquendus, vel aerem corpus. Si hoc, aeris frigiditas coctionem turbabit. Si illud, crudum super crudum pessimum. Aliam in habilitatis causam, moræ nempe in eo sanguinis pusillitatem, quam circulares supponunt, non assero, vs qui adiuventur circulationi, eiusque consequentijs penitus repugno. Dicit verò hic aliquis mihi: nonne concedis, à Corde sanguinem arteriosum gigni? Cur ergo, & alium non poterit producere venosum?

**Responsio.** Respondetur, ad illum gignendum leui transmutatione opus esse, nec arteriosum sanguinem à venali in alio differre, quàm tenuitate, & caliditate; quæ qualitates ab ipso Corde faciliè in sanguinis portionem, quæ calidiori vè atriculo obtingat, imprimi possunt: At non sic faciliè cadet, si chylus ipse totus, vel totus incoctus sanguis ab eodem sanguificandus, vel immutandus, ac perficiendus esset. Iterum quis obijcet, secur etiam, & Ventriculum in respiratione non secus, ac Cor, moveri



moueri quodammodò: Sed iniusta obiectio: nam hic verè eorum motus non est, sed leuis tantùm, & externa à diaphragmate compressio: Cur autem, & in se ipsum, & extra se continuè mouetur.

Videmus etiam, ex diuersitate temperamenti lecoris, tam intra sanitatis limites, quàm in morbofo statu, variari quoque totius corporis existentiam, tam quoad habitum, proceritatemq; magnitudinem, & his contraria; quàm quoad coloris, temperiei, & substantiæ modum. Sic qui temperato, vel modicè calido, humidoq; iccore sunt, habitum carnosum, succulentum; colorem viuidum, ac rubicundum; staturam, ve altam, vel saltem mediocrem sortiuntur; Qui modicè frigido, habitum demissum, debilem, exilium venarum, pauci sanguinis, staturamq; humilem nanciscuntur; Qui nimis calido, habitu gracili, excarni, vlceroso, calore febriculoso, colore flauo, vel adusto præditi sunt; Qui nimis frigido, humidoq; hi habitu cachectico, fluído, segni, calore languido, coloreq; albicante induuntur. Et sic de alijs temperaturis dicendum. Ergo in hepate facultatis naturalis principium, & sanguificationis officina est.

Ad hoc idem probandum non parùm conferunt quædam coniecturæ non leues; quarum prima est, quod pars dextra corporis melius leua nutritur, & ideo plurimis crus, pes, brachium, manusq; dextra corpulentiora sunt, & carnosiora, quàm quæ in altera parte. Secunda est, quod eadem pars calidior quoque est sinistra, vt in specie de vtero docuit Hippocrates, & docet de manibus, pedibusq; ac cæteris partibus experientia. Tertia quod eadem est habilior, validior, & agilior in plerisque. Quæ cum à Corde non proveniant, vtpotè quod potius in sinistram magis flectit, in eam mucrone pulsat, & in eam per Aortam vitales spiritus primò transmittit; vel saltem æqualiter in ambas partes (vt in medio positum) suas dispergit merces; procul dubio in lecur ipsum eorum causa refundenda est, quod, vt sanguinis, & natiui spiritus indefessus Opifex, partem dextram potissimum, & vicinior, & directior nutrit, fouet, roborat.

His omnibus rationibus addatur Authoritas omnium Medicinæ Procerum. Hippocr. lib. de hom. struct. num. 5. apertè fatetur, secundam digestionem à lecore fieri, & corporis partibus ab ipso alimentum præstari lib. de alimento num. 7. Venarum radicationem hepar esse, articularum Cor, & ex his sanguinem in omnia aberrare dixit. Democritus in Epistola ad Hippocratem idem clariùs testatur. Platonem eiusdem fuisse sententiæ asserit Gal. lib. de placit. Hipp. & Plat. 8. non semel. Et sic hucusque apud Auctores Medicos adeo hoc firmum, & acceptatum fuit, vt aliter putare, aut scribere, nulli non videretur esse nefas.

## CAPVT TERTIVM.

*Soluntur rationes contraria Aristotelis, & Is cum Galeno  
quodammodo conciliatur.*

Cui Veteres  
precipue le-  
cori sangui-  
ficationem  
assignave-  
runt.

**S**olus quippè Aristoteles visus est huiusmodi Medico dogmati liberè  
contraire, qui quibusdam fretus rationibus, *lib. 3. de partib. ani. 4.*  
& alibi sæpè statuit, principium, seu fontem sanguinis esse Cor. Et  
hunc Philosophorum non impigra Cohors sequuta est, adeoque sæ-  
pius cum Medicis dimicarunt, ut litem sub iudice adhuc vegetam esse,  
contendant. Verùm à dicta sententia Medici cum suis Principibus ac-  
latum quidem vnguem ob adductas ab ijs rationes deterriti fuerant va-  
quam: sed imò firmi, inconcussi; in ea permanserant, ijs potissimum  
adducti argumentis, ac signis, quæ sensibus patentia ex Anatomæ pas-  
sim habebantur: Nam si hominum cadauera, seu viuorum brutorum  
corpora diffecabantur, inueniebatur nonnunquam in mesaraicis qui-  
busdam venis, & glandulis chylosa quædam, albâque substantia, ve  
proinde ab Antiquis Arabibus vena Portæ lactea diceretur, uti videre  
est apud *Vesall. lib. 3. de corp. hum. fabr. cap. 5.* Cuius hæc sunt verba:  
„ Dein Portæ vena ab alijs etiam Iecoris manus nuncupatur, quod  
„ Iecur ea ad elaborati in ventriculo cibi attractionē, tamquam manu,  
„ vtatur. Sunt qui Lacteam appellant, quod succus, quem ab intesti-  
„ nis ad se defert, lacteus sit. ) Apud Aristotelem quoque *lib. 1. de hist.  
anim. cap. 17.* Gaza inteprete, Lactes dicebantur huiusmodi partes me-  
sentericæ. Et Erasistratus non semel in hædis lactentibus lacteum  
succum in ijs partibus conspexerat, teste *Gal. lib. ansang. in art. sit. cap. 5.*  
Quorum vasorum ductus cum proximè in truncos, & in Iecoris cauam  
ducerentur (quæ propterea à Portæ nomen antiquitus promeruit): à  
Iecore autem ad Cor alia non adsit vena, quàm magna illa, quæ Caua  
dicitur, in qua nunquam chylosus humor, sed semper, ac perpetuò flo-  
ridus cruor, & perfectus sanguis repertus fuerit, & adhuc reperiatur;  
quid aliud portendebant, quàm in Iecore ex illo chylo gigni sanguinem,  
ab eoq; ad Cor, & vniuersum corpus demandari? Quippè qui sensus  
negat, & confugit ad rationes, dat signum soliditatis ingenij, nesciens  
assignare effectuum causas, & dubiorum enucleationes.

Cor esse ve-  
narum prin-  
cipium de-  
genuit.

Soluebantur verò rationes Aristotelis omnes: nam primo, quod Cor  
sit venarum principium, iure merito negatum fuit ex hoc præcipue, quòd  
Orta suis attestantur principijs: Si ergo Cor incessanter mouetur, ac pul-  
sat, & venæ, si ab eo essent, pulsare deberent, prout arterijs, veris eius  
germinibus, est concessum; Ad quod etiam facit illa exonerationis, de-  
mandationis, aditusq; denegatio, quæ in eas Cordi fit à sygmoidibus,  
ingressum quidem, non egressum ferentibus; faciuntq; alia obstacula  
capite



capite præcedenti exposita, & lecori adaptata. Nisi forsan cum Gal-  
truccio diceremus, ibi venæ nomen arterijs quoque ab Aristotele con-  
cedi, & sic optimè dici posse Cor venarum esse originem; quod quidem,  
verissimum cum sit, nil de venoso genere concludit.

Neque insuper natura Cordis venosa est, vt Idem ait ( nisi iterum  
cum venalis nomenclaturæ extensione frustra eius dicta sumantur ); sed  
potius arteriosa; dum ipsum carne dura, ventriculorum tunica crassiori,  
& inquieta indole, a qua venæ abhorrent, constructum fuit.

Natura Cor-  
dis venosa  
non est.

Quod verò principalem locum, hoc est in medio thoracis, & in par-  
te elatiori, nobiliori, tutiori; obtineat, neque ad hoc quicquam conclu-  
dit, imò e contra: nam ideo nobiliori quoque, ac seriusiori officio dica-  
tum esse à natura debebat, nempe vt cunctis gratiam, calorem vitam-  
que impartiretur membris; Regis instar, non autem, vt chyli coctioni,  
tanguinisque procreationi, tamquam Coquus, præset, eumque in cor-  
pus alendum distribueret, vt Oeconomus.

Eius locus  
principalis  
contra con-  
cludit.

Nullam autem venam in Cor tendere, verum non est: quia imò à  
vena Caua rumulus quidam procedit, qui varias venulas in Cordis cor-  
pus dispergit, vt habetur ex *Gal. lib. de dissect. ven.*, & *art. cap. 2.* Item,  
& vena ad modum coronæ eius basim ita circumdat, vt ab inferiori Sede  
ramos deorsum ad Cordis vsque mucronem dispergat, Cordis substan-  
tiam petentes, sinistramque; latus vndique amplectentes, vt tradit *Vesall.*  
*lib. 3. cap. 7.*

Et in Cordis  
substantiam  
venæ ingre-  
diuntur.

Item quod Cor in medio cauum sit, non vrget adeo, vt ei tale munus  
adaptemus. Illinc enim verum est arteriæ principium, in sinistrum inde  
ventriculum exilientis, per totum indicem corpus dispergendæ. Et hoc  
est, quod Aristoteli ansam dedit putandi, inibi tertium adesse Cordis ven-  
triculum, vt idem aduertit *Vesall. cit. lib. 6. cap. 12.*, cum tamen duo  
tantum in homine; dexter nempe, & sinister, inueniantur, vt habetur  
ex *Hipp. lib. de Cord; mun. 4. Gal. lib. 6. de vsu part. cap. 9. & 13 Vesall. lib.*  
*6. cap. 11.* cæterisq; post eos omnibus Anatomen proferentibus. Quare  
illud cauum cum ad arteriam spectet, aliud non arguet, quam illud esse  
sanguinis arteriosi, & vitalis spiritus officinam.

Eius media  
cauitas arte-  
riæ principi-  
um.

Kursus (inquit Aristoteles) nullum aliud in homine membrum, præ-  
ter Cor, sanguinem extra venas, & in se ipso continet; argumentum  
ab eodem in venas; non è contra, sanguinem emanare. Sed parcat mihi,  
si dixerò, in hoc Cordi præire Iecur, non solum enim hoc vndique veno-  
sum, sanguineque scatens est; sed & ex ipsomet sanguine concreto, ac  
minimùm immutato, veriusq; coactò illius substantia constat, vt non  
solum Hippocrates cum suis sequacibus, sed & idem *Arist.*, sensusq; ipse  
,, fidem faciunt. Et *Galenus 6. de placit. Hipp. & Plat. 8.* Si conspice-  
,, tur, (inquit) sanguis, caro lecoris est efficta.) Igitur quò magis  
continenti, quam contento, virtus coquendi, seu immutandi, tribuitur,  
eo & hepatis, quod sanguis propriè est, (modo iam dicto), non Cordi,

Quod in se  
sanguinem  
continet, ni-  
hil vrget

quod in se sanguinem continet (caro autem est) gignendi sanguinis officium tribuendum. Et forsan duo ij ventriculi instar duplicis magnæ venæ ipsi Cordi inseruiunt, vt quod ob eius carnis soliditatem, venarum insertioni resistentem, ei denegatur (pro sanguinis scilicet copia excipienda) ab hisce cavitatibus, venarum officio fungentibus suppleatur.

Vnum esse  
omnis princi-  
piis affirma-  
tur,

Vnicum (addit Aristoteles) debet esse omnium principium: Cor autem omnium partium primò consistit, perficitur, viuit, palpitat, dispensat; cæterorumque membrorum nobilissimum est, & verè princeps: dicendum ergo, & admittendum, etiam principium, & fontem sanguinis esse. Vt tum enim verò, nec huiusmodi quicquam ratio valet: sufficit enim, vt Cor vnicum omnium dicatur principium, fontem esse vitalis facultatis, quæ sub se potentia, & animalem, & naturalem continet: » Est namque Vita ipsum nutrire, sentire, moueri, intelligere, operari &c. *vt habetur 2. de ani. tex. 1. 3.* Sicuti & prius dixerat *tex. 3.* Vita est, quæ per ipsum corpus fit alitio, augmentatio, & diminutio. ) Coctionibus autem, tum generalibus, tum priuatis incumbere, non sibi, sed alijs membris, ab eo spiritu vitali donatis, congruit magis, vt experimenta probant: Chylus enim in ventriculo, lac in vberibus, semen in testibus, spiritus animalis in cerebro, ros in qualibet enutrita parte gignitur, & hæc adiuvante nativo calore, spirituque viuifico, qui à Corde quoque influit: Ergò dari vnum omnium principium, sicuti cæteras publicas coctiones assignatis partibus, & priuatas cu nctis alijs non subripit, ita nec iecori sanguinis generationem iuste poterit abrogare.

Cor primum  
gigni nega-  
tur, & vbi  
gignitur, nil  
concludit.

Quod autem primò omnium partium in generatione consistat, pulset, & sanguinem contineat Cor, id quidem primò negatur: vel enim cum *Galeno lib. de format. sat. cap. 3. 6.*, & alibi Corde prius securi gignitur; cum natura, necessitate, ac ordine prior sit vita plantæ, post animalis, ac vltimò hominis, vt perfectior; vel, vt verius autumo, omnia simul inconfusa membra gignantur; quæ tamen nò statim ob ruditatem, & exiguitatem possunt distingui, sed paulatim crescendo discernuntur, sciunguntur, distinguuntur; exemplo herbarum, plantarumque; quarum multas in sui ortus principio diiudicare est impossibile, quas postmodum simul augeri, & distinguere dies, conspiciamus: Nec enim à iecore, vel à Corde venas, abt arterias procreari, sed omnia à virtute seminis cum menstruo efformari, ex ipsis derivari, ac in ea inferi, paulatimque delineari, censendum: nam nec quod gignitur, aliud ipso gignendi tempore gignere; nec quod formatur, aliud eodem actu efformare potest; cum idem simul agens; & patiens in eodem genere esse nequeat. Quod forsan annuere voluit *Hippocrates lib. de loc. in hom. num. 1.* dicens: » Mihi quidem videtur principium corporis nullum esse, sed omnia » similiter principium, & omnia finis. ) Cum verò quædam principia dicuntur,

dicuntur, vt supra de Iecore dicebatur, intellige, in his radicari, ex his germinari, & ab his ea quodammodo regi. Sed secundò, quamvis illud concederetur, nec officeret; cum aliud sit quid primò consistere, gigni, & sanguinem continere; aliud verò sanguinem virtute propria generare: In embryo siquidem sanguis, vel immediatè (vt in humano) per matris venas, arteriasq; in totum formandum, formatumq; confluit corpus; vel virtualiter à matris calore ex apta iam introducta materia (vt in ouo) non à cordis virtute progignitur; cuius signum est, incubatione matris cessante, & sanguificationem cessare, & vitam; Vbi verò animal iam ex se regi, & sanguinem gignere valet, tunc non Cor solum, sed & Iecur, & vniuersa membra consistunt; itaut, non ex eo, quod quid primò gignatur, & consistat, sanguinis officinam arguere ibi liceat. Quod autem in ouo fecundo prima sanguinis gutta obseruetur in corde (si verum hoc sit), id non ipsius facultate fieri, sed ex maiori materia, illius aptitudine ad talem formam à matris commutante calore recipiendam euenire, dicendum. Addatur, & tertio exemplum oui, cui tantum tribuunt Recentiores, minimè omnium hominis generationi conuenire, ab eoq; ad hanc non valere argumentationem, vt ex professo *lib. 3. cap. 7. & 8.* monstrabitur.

Illud tandem argumentum, quod nullum animal sanguinem gigneret Corde, etiam ad Iecur trahi potest, sine quo, vt ipse etiam fatetur Aristoteles, nullum huiusmodi animal est; Et sicuti verè dicere possumus, à nullo alio in Iecur membro sanguinem, qui proximè ex chylo gignatur deriuari; ita ad Cor verius à sanguifico Iecore demandari, ab illoquè simul attrahi, fatendum est. Nec hic mihi opponatur Gasparis Bacchini auctoritas de Matthæo Ortelio, sine Iecore, & liene inuento cum Caua intestinis annexa: vel enim fabula est, vel metaphoricè prolatum; vel vt dictum vnus, ac si nullius esset, tenendum, vel vti quid monstrosum, nullam prolata thesis facit diremptionem.

*Nec facit  
Cordis ne-  
cessitas.*

Quare satius fuerit vnà cum Auerroe, Auicena, & alijs Aristotelis dictum sic interpretari; Cor scilicet primum in se sanguinem continere, generareq; nempe vitalem, ac spirituosum, esseque primum, hoc est mediatum, principium sanguinis quoque venalis, & alimentosi ex eo, quod viuificos spiritus ad Iecur transmittit, sine quibus nec hoc sanguificaret; Iecur autem esse verum fontem, & vltimum, sed immediatum principium sanguinis, ab eoq; illum ad Cor, cæteraq; membra corruari. Et hoc Medicis sufficit, quibus sat est, nosse, fontem sanguinis esse hep-  
par, sicuti, & sensuum, ac motuum cerebrum, vt ait *Auic. prima primi doctr. 6. cap. 1.* & commentatur Iacobus de Forliuio cum alijs. Hecq; pro parte consonant ipsi Galeno, qui locis citatis concedit, sanguinem arterialem etiam iuxta Platonis sententiam gigni in Corde; nec inficiatur, Iecur pro suo munere Cordis spiritibus egere: hoc tamen ex altera addito, quod nec Cor spiritus gignere, nec nutririj valeat, nisi à Iecore

*Conciliatæ  
Galeno Acti-  
onitica.*

sanguis ei suppeditetur ; itaut per ipsum reciproca sit egestas , & reciprocum ministerium ; Qui videtur ex Hipocrate id mutuassee *lib. de hom. struct. num. 2.* vbi hæc habet : Sed lecur Cordi sanguinem non præter , veri fidem assatim suppeditat : nam ignis absque materia permanere neutiquam potest .

*Ipsemet Aristor. fuit lecori .*

Addatur his pro coronide , ipsum quoque Aristotelem , suimet ferè oblitum , vel à veritate coactum , idem sentire ; qui eodem *lib. 3. de part. anim. sed cap. 7.* hæc formalia protulit verba : Sed enim Cor , & lecur omnibus animalibus necessaria sunt ; alterum propter caloris originem : ( locum enim adesse aliquem , quasi lares , forumquè , oportet , quò naturæ fomites , & primordia ignis natiui contineantur , & feruentur , eundemquè tutum esse , veluti arcem corporis totius , necesse est ) ; alterum , lecur dico , cibi concoquendi gratia adest . ) Patet autem cuique , hic non de cibi prima cōctione agere Aristotelem : nam & ipsi , & omnibus in confesso est , eam in ventriculo fieri : ergo eum de chylō coquendo dicere , ambigendum non est . Quare non immeritò , imò prudentissimè nonnulli Philosophorum , vel Principem suum deferentes , vel sic interpretantes , fontem venosi sanguinis lecur nominant : Alij verò idem concedentes , solummodò prætendunt , sanguinem à lecore profectum , si nutrire debeat , à Corde prius perficiendum esse . Cum his , si de mediata perfectione scilicet per transfusum quoquò in venas , medijs arteriarum anastomosibus , & sygmoïdum rimulis , spiritum , vitalemquè calorem , intelligant , libens , & ego consentio : alioquin , si de immediata Cordis elaboratione agant , reluctaturus vbiq̃ue ; qui à lecore citrò vltroq̃ue sanguinem per venas dispergi , à partibusquè simul trahi , citrà Cordis ingressum , contendo , vt monstrat venarum ipsarum ramificatio , non ad Cor solum , sed ad omnes æque , ac ad ipsum , partes protensa , sanguinisquè venosi ipsius tam superioris , quam inferioris , tam Cordi proximi , quàm remoti homonimia , & identitas .

### CAPVT QVARTVM.

*Quanam sit Iohannis Pecqueti de sanguinis officina recens opinio .*

**H**ÆC fuit apud Medicos saltè omnes decantata , acceptata , ac indelebiter determinata sententia de Officina sanguinis , deque lecoris proprio munere , vsque ad proximè superiora tempora , quando erumpens fortasse Ioannes Pecquetus in cuiusdam viui canis anatomen , cum , enulsa Corde à cæteris inuolucris , similem lacti substantiam à vena quadam viderit exire , cepit , & in eo tunc , & in alijs postea dissectis canibus inuestigare illius lactei liquoris , & ductum , & originem : Ipse ergo post plures diligentes sectiones tandem inuenisse fatetur quoddam chyli

chyli Receptaculum iuxta lumbos, & renes, à quo per Spinam dorsii duo teretes, & membranei riuuli ascendentes dictum humorem lacteum deferre videntur ad venas subclauias ab eo dictas ( & sunt venæ, in quas Claua, Cor prætergressa, antequàm in duas iugulares scindatur, sub clauicula diuiditur, ad axillas, brachiaquæ tendentes ); & in eas foraminulis quibusdam penetrant, & lac refundunt, non quidem ad iugulum ascensurum ob quasdam ab eo ibi adstructas valvulas hoc impeditentes; sed bene ad Cor cum remeante à membris sanguine, vt & ipsum sanguis euadat, peruenitur. Ad dictum verò Receptaculum ipsummet chylum deferri per alia multa venosa vascula albicantia, iam olim ab Asellio Ticinensi inuenta, delineata, & inde pluribus alijs passim accepta, ac celebrata, quæ multas, variasquæ veluti radices in intestina, præcipuè tenuia, insinuant, manifestò patere dicit.

Receptaculi  
& thoracici  
tubuli lactei  
inuentio.

Qui Auctor, cum multas diligentias adhibuisse fateatur, vt videret, an venulæ illæ, lacteæ dictæ, ab eodem Receptaculo, aut glandulis alijs ( prout dictus Asellius tradiderat, aperta; figura commonstrauerat ) possent eundem succum chylosum deferre, siuè mediâtè per Portam, siuè immediâtè, in lecur; nullumquæ se nec minimum talis delationis vestigium vnquam conspiciere potuisse, asserat; & ex altera semper viderit, per supradictos ductus thoracices in subclauias seu axillares venas dictum lacteum succum deportari; Non ab re, tamquam in certa alea consistens, latis buccis, non ampliùs ad lecur, sed ad Cor ipsum chylum, in sanguinem commutandum, permeare, nec ampliùs ad lecur, sed ad Cor, sanguificationem spectare decantauit.

Non lecuri,  
sed Cordi sig-  
nificatione,  
conuenire,  
asserit Pec-  
quetus.

Sicquæ in quodam ab eo condito Libello, cui EXPERIMENTA NOVA ANATOMIA nomen imposuit, circa id muneris lecoris dignitati longum Vale donauit: Cui tamen, tamdiu à Medicis iure purpurato membro, ne querulum omninò illud relinqueret, neuè frustrà à Natura idem à Natura procreatum esse videretur, alia quatuor officia attribuit; vnum scilicet, quod vice cuiusdam pistilli ventriculum succutientis, & ab eo in intestina, indequæ in lacteas chylum exprimentis, inseruiat. Alterum, quod sit sanguinis à Corde ad partes nutriendas transmissi, & ad ipsum reinigrantis, veluti colatorium quoddam. Tertium, quod bilem à sanguine expurget; Et quartum, quod ventriculi coctionem suo vegeto calore coadiuuat. Et hoc modo illud sibi condecorasse visus est, dum loco vnus quatuor illi officia, seu ministeria assignare inueniuntur. Quibus quintum addere poterat, cuius meminit *Aristot. lib. 3. de part. anim. cap. 7.* quod nempe, sicuti, & alia viscera, inseruiat pro sustentamento venarum; quæ cum pensiles sint, viscerum connexu stabiliuntur, vniuntur, & totius adducuntur; sicuti de Caua inter Cor, & lecur; de Porta inter hoc; & lienem videre est.

Quatuor of-  
ficia lecori  
à Pecquet  
attributa.

Alled illius  
ex Aristot.  
scitum.

De huiusmodi verò ministerijs, & de modo, quo Chylus in dictum Receptaculum, in lacteas thoracicas, & in Cor commigrat, non solum in

in libello citato, sed melius in alio, cui DISSERTATIO ANATOMICA nomen inscriptum est, is pertractauit Auctor: ibi enim, cum prius per alligationem eorum vasculorum videret quidem versus Spinam, & superiora ea inaniri, versus verò mesenterium, & intestina turgere, sibi clatum visum fuit, huiusmodi commigrationem non per attractionem, sed per impulsione[m] fieri. Hoc statuto, modum deinde, quomodo fieri huiusmodi expressio possit, indagare contendit; & post varias dubietates, quod nempe ad hoc valere possent ventris compressiones in exonerandis intestinis, vesica, cystiq; fellea fientes, vel arteriarum comitum vibrationes, vel constrictiones, ac dilatationes vicissitudinarie muscutorum abdominis, quæ ob respirationem continuè insurgunt; tandem ad vnicæ respirationis efficaciam se restringit. Per hanc enim (ait cap. 2.) dum pulmones dilatantur, diaphragma versus inferiora premitur, lecurquè more cuiusdam pistilli, per intervalla succutientis, molis grauamine, ac motu non solum è ventriculo chylum in intestina adigit, sed & eorundem dilatando porulas, illac subtilissimam impellere in lacteas alimenti partem optimè potest.

Quomodo  
chylus in la-  
cteas adigi-  
tetur Arist.

Quam per-  
plexe Idem  
astruat chyl-  
i impellendi  
modum, no-  
tatur.

Circa quæ obiter notandum nobis est, quàm perplexè huiusmodi. Idem astruat impellendi causam. Hoc posito (inquit ipsæ), mitto contractionem illam, atque distentionem, qua muscoli, respirationis opera, continuato motu agitantur, non sic enim viscera comprimunt, vt ex intestinis chylum valeant exprimere. Mitto arteriarum circa intestina micantium vibrationem; nam quiescentibus post ligatam Cæliacam arterijs, nihil minus Lacteas irrepens chylus tumefacit: Superest igitur, vt ad vehementem muscutorum contractionem, vel ad continuam expirandi nec non aspirandi vicissitudinem confugiamus. Verùm; quia perpetuus chyli, quamdiù quidem alimenta suppetunt, transitus iugem pariter postulat compressionis causam, qualem ineptum est in muscutorum contractione, prope modum momentanea, quærere; ad respirationis demùm vices, meo quidem iudicio, recurrendum.) Ecce quomodo in hoc varius, & vacillans cernitur: si enim putat ipse, ex illa muscutorum contractione, quæ sequitur expulsiōem alui, vel vesicæ, posse à ventriculo, & intestinis in Lacteas chylum exprimi, cur postmodum inquit, ineptum esse, ad hanc causam momentaneam confugere? Si verò rursus inquit, contractionem, ac distentionem muscutorum, quæ à respiratione procedit, non sic viscera comprimi, vt ex intestinis chylus exprimi valeat, cur postea reinfero, vel ad hanc, vel ad alteram supradictam esse confugiendum? Et cur rursus, priori seclusa, ad vltimam; insufficientem nuncupatum, se reducit, in eaque firmatur, addita solum capite secundo lecoris compressione, eandem respirationem insequente? Melius autem multo erat Ei ad hoc, vt suam magis firmaret, ac eueheret expressiōem, omnes dictas cumulare causas, itaut per vnā, duas, tres, ac plures commodè fieret:

Sed



## CAPVT QVINTVM. 31

Sed ne sic quidem naturalitèr talem fieri posse Chyli in Lacteas, aliasuè venas appulsionem, videbitur infra cap. 11. Pro nunc sufficiat Pecqueti, ac aliorum Neoteritorum adinventiones memorari, quo possint earum ponderari vires in hæpatis hæmatosi, prout illi supponunt, releganda.

## CAPVT QVINTVM.

*Quanam inde de Officina Sanguinis fuerit Thomas Bartholini sententia,  
Eiusque lepida ad Iecur Exequia.*

**H**VIC Peequatianæ opinioni aliquantisper, & per quoddam tempus contrariari visus est Excellentissimus Thomas Bartholinus; Medicus Anatomicusquè Danus, qui libro de LACTEIS THORACICIS edito huiusmodi lumbaribus, ac thoracicis ductibus, à se primo in homine recens strangulato admissis, inuentis, ac publicè ostentatis, chylumquè per eos supra ad Cor migrare, concessit; concludit, Iecori quidem minimè denegandum esse sanguificationis officium; verum illud potius esse patiendum, itaut vel à Corde subtiliorem, à Iecore autem crassiorem chylum in sanguinem conuerti; vel partim ab vno partim ab altero confici, prout melius naturæ placuerit, vel coegerit necessitas, per Eum dicendum, & credendum sit. Et hoc nonnullis rationibus ab eo in capite decimo quinto cumulatis egregiè comprobare visus est; quarum prima est, quod per multas suas anatomicas obseruationes clarè cognouit, à magno pancreate, & glandulis candicantes venulas plenas eodem chylolo succo, vel sero ad Iecur, & ad Portæ venam non minùs, quàm ad Receptaculum, & glandulas permeare, sicuti & iam antea obseruauerat VValleus, & omnium primus Asellius Lactearum Inuentor tradiderat, cum à his multis, quorum fides cum tot sint, videtur esse solius Pecqueti fidei præponenda. Altera, quod ductus thoracici, & glandularum tam sunt exigui, & foraminula adeo tenua, vt non adit pro toto vehendò chylò conueniens proportio. Alia, quod, læso in hydropè Iecore, læditur & sanguificatio, vnde loco sanguinis serum, phlegma, flatus in corpore acervantur, sicuti & nonnullæ aliæ exinde promanant ab offensione Iecoris, vel Thoracicarum obstructione læsiones, à quibus & vomitus, & Cordis oppressiones, & natiui caloris, ac spiritus suffocationes consequuntur. Quare his, & quibusdam alijs adductis, sibi meritò concludere videtur, sanguificandi ministerium non vni tantùm ex his partibus, sed vtrique simul competere, itaut, harum viarum altera obstructa, diu perdurare nequeat animam, & varia symptomata cum interitu tandem suboriantur, vt quibusdam exemplis, quæ habem prætereo, patefacere conatur.

Verùm, non sibi diu constans, cum postmodum, vt ipse palam asse-

Iecur Iecur,  
& Cor pat-  
tidum esse  
sanguifica-  
tionem, con-  
cludit.

Prima elu-  
dem ratio.

Secunda ra-  
tio.

Tertia ra-  
tio.

Et.

Pecqueto sub-  
scribit, &  
Vasa Lym-  
phatica pro-  
ponit.

Hepatis Exe-  
quies Barho-  
liniana.

ut, reuoluis perspecta, considerata, & cognita, inuenerit, vascula ab ipso prius à glandulis; & pancreate ad secur concessa, plena esse, ac effundere non lacteam succum, non illius serum, sed limpidam aquam; nec conducere à Lacteis ad secur, sed ab hoc in Receptaculum; nullamque aliam adesse semitam, quæ hinc ad secur pergeret; & in alteram festinans abiit sententiam, & priori palinodiam concinns, omnino, & ipse lecori vale dixit, totam sanguificationis operam Cordi tribuens, & Ioanni Pecqueto subscribens; ut apud Eundem legere est libro de Vasis Lymphaticis inscripto. Nec amplius apud Eum valuit vasorum prius monstrata exiguitas; non oscillorum pusillitas, non traducendi succi copia, non alia à se producta ratio, quin (ut lymphæ Author habetur), adiciat, non solum chylo tenuiori vehendo, sed & crassiori; neque his tantummodo, sed & lymphæ simul ad Cor deducendæ solitarii Thoracicum tubulum apprimè suffecturum. Et sic, lecori prius Purpura detracta, eidem lepide sequentes Exequias cecinit.

ABI. VIATOR.

CLAUDITVR. HOC. TVMVLO.

QVI. TVMVLAVIT. PLVRIMOS.

PRINCEPS. TVI. CORPORIS. COQVVS.

ET. ARBITER.

HEPAR. NOTVM. SECVLIS.

SED.

IGNOTVM. NATVRÆ.

QVOD.

NOMINIS. MAIESTATEM. ET. DIGNITATEM.

FAMA. FIRMAVIT.

OPINIONE. CONFIRMAVIT.

TANDIV. COXIT.

DONEC. CRVENTO. IMPERIO.

SEIPSV. DECOXERIT.

ABI.

SINE. IECORE. VIATOR.

BILEMQUE. HEPATI. CONCEDE.

VT.

SINE. BILE. BENE. TIBI. COQVAS.

ILLI. PRECARE.

Et sic à duobus his recentioribus Auctoribus, verè in Anatome in signibus omnino explosa videtur antiquissima de membro à Natura sanguificationi dicato sententia Medica. Sic Antesignanis, præire videntur Alumni, & Aristotelis ferè sopita, vel saltèm arctata sententia his temporibus nimium ampliata reuixit; Vt hinc videatur, etiam in opinionibus, & ingenij conceptibus sua quædam dari fata, ut modò eleuentur, modo labantur, nuncquæ ortum, nunc interitum subeant, & non immerito ijs sequens adaptari Poeticum dictum.

Nec



*Nec forma aeterna, nec cuique est fortuna perennis.*

Ambulatoria quippè est voluntas hominis, labilis opinio rerum; & quæ Sol elicit matutinus, nonnunquam tenebræ vespertinæ sepeliunt, quæ non eruat, dies aliquando dissipat.

laceat nunc infelix hoc Viscus, & in Telluris viscera detrusum, per caliginosum inambulet Orcum, quoadusquè, Euridicis fortunæ capax, Orpheum aliquem lyra, vel tuba canentem experiatur in inferis: Vtinam tamen feliciori sorte; ne scilicet, ad Viam redux, cupido quidem, sed vetito Amantis incuitu, ad pristinam denud trahatur infelicitatem; hac maxime infausta tempestate, qua nec Principibus parcitur, & contra Herodes ipsos quidlibet audere, etiam vulgaribus inficis non videtur indignum.

## CAPVT SEXTVM.

*Observationes aliquot circa difforum Opinantium dicta.*

Circa talem verò opinionem nonnulla, antequàm ad vltiora progrediamur, à nobis obseruanda veniunt, quæ magnam dubietatem in simili admittenda deliberatione ipsis præferre debebant. Et primò obseruo, hosce duos Auctores Pecquetum, & Bartholinum valde, vsupra tactum est inter se dissentire, in describendis huiusmodi lacteis vas, & Receptaculo: nam vbi Pecquetus asserit, inueniri versus lumbos inter renes quoddam membraneum impluuium satis amplum, in quod plurimi riuuli, ab intestinis oriundi, terminantur, & ex quo bini canaliculi procedunt, per Spinam hinc & hinc ascendentes, ac ad duas subclauias venas, propè Cauam eò loci finientes, & introeuntes, vbi Caua in axillares diuiditur, & ad radicem ferè iugularium; Bartholinus lib. de lact. Thorac. cap. 6. asserit, dictum Receptaculum in hominibus non inueniri; sed bene quasdam magnas glandulas, ab eo lumbares dictas, vt plurimum tres, in quas dicta vascula lactea ab intestinis, & pancreate deriuantur; ab ijs verò non duos canales sursum per Spinam ascendere, sed vnicum in sinistra eius parte tantum; nec in duas axillares, sed in sinistram solum inferi, vt in capite eiusdem quinto habetur, & vt lib. de dub. lact., ac alibi firmat. Vbi Pecquetus firmiter fatetur, nullum vas, nec vllum ramusculum à dicto impluuiio, & lacteis ductibus in iecur manare, Bartholinus lib. de lact. Thorac. cap. 15. clarè affirmat, ac testimonio Afellij Ticinensis, primi Lactearum inuentoris, Vuallæi, Higmori, ac Fallopij multa à dictis lacteis vasculis, ac pancreate, vascula in venam Portæ inferi, & in iecur tendere, eodem lacteo succo, & nonnunquam sero, referta, latè confirmat. Vbi ille quarta, vel quinta hora post pastum ait inueniri lacteum succum in dictis vasculis, ac Receptaculo, in ieiunis verò, & famelcentibus non inueniri; Hic è contra

Pecqueti, & Bartholini  
dissentio circa  
Receptaculi  
formam, & thoracicarum  
nummerum.

Idem circa  
lactearum  
cum iecore  
communio-  
nem.

Idem circa  
tempus, &  
ex sententiam  
eorum lactem.

& septima, & decima post pastum hora, & pleno adhuc existente ventriculo, & quod magis est, statim aspto cibo, tradit, dictum succum aliquando, aliquando verò serum, & quid instar euaniidi lactis comperiri; sicuti è contra *cap. quinto* ait, vno homine post horas quinque à paru stragulato, qui obesus valde, & sanus erat, nullibi, nec in glandulis, nec in Lacteis chylum repertum fuisse, quod confirmauit capite decimo quinto in cadauere alio, in quo nec lacteas vnquam inuenire potuit.

Lactearum  
exilias, &  
lacteicane-  
scentia suc-  
ci.

Secundo obseruo, hosce ambos Authores ingenuè confiteri, huiusmodi vasa, tam mesenterij, quam thoracis, adeò exilia esse, vt, si fortè vel exierit ob incisionem ab ijs albus succus, vel animal extinctum frigidum iam fuerit, aut ob inedia gracile; vix, ac ne vix quidem possint discerni, solummodoquè veluti fibrillæ albæ, aut veluti neruuli, aut pinguedinis quidam peruij, & longi processus, appareant; itaut ille succus facillimè euanescat, & oculatissimorum hominum oculos effugiat; Et hæc esse, ait, causam dictus *Bartholinus cap. 19.*, cur Anatomici celeberrimi non antea similem chyli semitam obseruare potuerint.

Bartholini  
dissentius cit-  
eo Recepta-  
culum.

Obseruatur tertio, eosdem Authores non solum, alterum ab altero, sed à semetipsis quoque in rerum serie referenda non raro dissentire: Nam *Bartholinus lib. cit. de lact. thorac.* modò vice Receptaculi tres in homine esse glandulas lumbarès sub mesenterio positas, duas scilicet aliquantò inferiores, & vnā superiorem, quæ tamen inuicem per ramusculos communicant; modò vnicam; modò plures esse, asserit. Hunc eas à mesenterio seiundas, & solum antica parte cum eo connexas; nunc in mæzæreo ipso positas esse, innuere videtur. Huiusmodi rerum contrarietates ex proprijs ipsius verbis venaberi facile: Siquidem, quod sint tres, ipsius verba *cap. 5.* hæc sunt: In primo glandulas plenas tres lumbarès loco Pecquetiani Receptaculi, monstrauimus publice. Idem *cap. 6.* asseuerat dicens: In hominibus tres glandulas notavi, duas maiores inuicem superpositas, sed mutuis ramulis lacteis coniunctas inter Cauam descendentem, & Aortam in angulo, quem emulgentes cum vena faciunt; tertia superior, diaphragmati vicinior, eiusq; principio neruo sub appendice immersa. Quod vnicam, desumitur ex *cap. 4.* vbi sic ait, Progressus lactearum ab omnibus intestinis, etiam cæco: frequentius tamen à tenuibus, & copiosissimæ à ieiuno, vnde ad glandulam mesenterij mediam perducit instar capreolorum vitium implicantur, indequè partim ad hepar, cum Porta varijs insertionibus abeunt rectà, partim ad emulgentes, partim ad Cauam, quem admodum *Vvallæus*, & omnes oculati obseruauerunt; vt chylum hac semita incedere, dubitare amplius non liceat. Quod verò plures tribus sint, tradit *cit. cap. 6.* dicens: Credo tamen, varium esse in varijs numerum: siquidem in quodam homine plures in mesenterio

„ Mesenterio comparebant glandulæ, quàm in alijs hæcenus à me disse-  
 „ dis ) Ex quibus verbis apparet quoque, dictas glandulas esse in me-  
 „ senterio; quemadmodum, & ex citatis verbis capitis quarti, & ex ijs,  
 „ quæ capite quinto leguntur, aptè colligitur; cuius hæc sunt notæ: In  
 „ primo lacteas mesentericas, & thoracicas chylo repletas inuenimus:  
 „ in altero autem ne chyli in vasis illis vestigiū vsquā visum: nec tamen  
 „ spe frustrati, aut expectatione: comparebant enim in mesenterio  
 „ glandulæ lumbaræ, & in thorace ductus chylo destinati. ) cum tamen  
 „ è contra cit. cap. 6 dictas glandulas retro mesenterium repofuerit  
 „ his verbis: Situs, infra centrum mesenterij, quod subinde alteri exa-  
 „ ctè superponitur, sub cæliaca, & emulgentibus circa lumbaræ ver-  
 „ tebras, inter earundem musculos psoas media ferè regione inter re-  
 „ nes, & capsulas atrabiliaras. ) Et inferius sic: Connexio. Postica  
 „ parte adhæret vertebrae lumbaribus. Antica mesenterio perramur-  
 „ culos lacteos, qui chylum ad hanc cisternam deriuant. ) Itaut certò  
 „ nescias per ipsum distinguere, an hæc glandulæ lumbaræ in mesente-  
 „ rio sint, & sic eadem ab Hippocrate; Galeno, Vesellio, cæterisque mæ-  
 „ zareo dicatæ; an extra mesenterium nouiter inuentæ aut saltèm recèns  
 „ animaduertæ: quod tamen vltimum videtur concludere cap. 19. vbi  
 „ dicit, lacteas glandulas nouas; glandularum mesenterij nomine faciliè  
 „ ad huc vsque scrutatori bus imposuisse.

Rursus cum superius visum sit, in allatis verbis ex capite quarto de-  
 „ cerptis, & ex capite decimoquinto, & decimo septimo ab ipso verè asse-  
 „ uerari vnà cum alijs ab eo citatis Auctoribus Vallæo, Higmoro,  
 „ Afellio &c. à mesentericis lacteis, & glandula varios ductus, & ramu-  
 „ sculos ad hepar prodire, in quibus idem chylosus succus, ac in ijs, in-  
 „ uenitur; cumq; varijs rationibus probet, ob id hepatis sanguificationem  
 „ non eripiendam: Libro tamen de Vasis Lymphaticis, vt sibi lymphati-  
 „ corum ductuum gloriam paret, non veretur certius affirmare, dicta va-  
 „ scula ad hepar tendentia non lacteum succum, non fuscum serum, sed  
 „ limpida aquam in Pecquetianum Receptaculum effundere, ac eiuf-  
 „ dem qualitatis, cuius alia vascula in lacertis brachiorum, & crurum in-  
 „ uenta, continere, diuulgat.

In alijs quoque multis modò negat, modò affirmat; exempli gratia  
 „ cap. 14. de lact. thorac. ait, mox sumpto cibo, thoracicas lacteas eo suc-  
 „ co refert as reperiri; capite decimo sexto id ferè negat. Cap. 13. ciuf-  
 „ dem operis in venæ in sectione inquit sæpius serum instar lactis pro-  
 „ diisse, & exemplum cuiusdam puellæ assert. At in Defens. ad Riol.  
 „ negat, id posse fieri, nec nisi in cacochinis; nec lac esse, sed pituitosum  
 „ succum, ibidem contendit: Illic cap. 17. in principio admittit, & con-  
 „ cedit, lienem acidum succum, & renes serum transcolare; hic vtrum-  
 „ que inquit antiquum, & improprium esse. Item d. lib. de lact. thorac.  
 „ tenuiorem solum succum in lacteas abire docet; altero vero lib. Defens.

Aliæ dissec-  
 „ tiones circa  
 „ lactearum in-  
 „ cessus, & de-  
 „ lationes.

Aliq; ita circa  
 „ colent quæ-  
 „ sitatem, rem-  
 „ pus, vsum.

ecliam crassum, mechanicorum instrumentorum exemplo, infumi posse in exillima vascula, tradit.

Itz dissectio-  
nes Casus, vel  
Naturæ vitio,  
non Aucto-  
rum, impu-  
tanda.

Ab his verò mihi hæc dictorum varietates prædictis Auctoribus vitio vertere, quos oculatissimos, & fortunatissimos veneror, & verè ingenuos demitor: Vitia quippe casus potius sunt, vel disectorum corporum naturæ lusiones, aut illusiones ludicræ: Ea enim in plurimis varietate gaudet, & inconstantiae non rarò innitens, summam sibi in hæc pulchritudinem, & admirabilem quandam sapientiæ emphasim sibi poscit, parat, auget. Singulorum porò natura ineffabilis est, & mira in quoq; varietas: Cum hoc tamen in essentialibus, & ad actionem quamper am necessariò requisitis eadem Natura semper, nec, nisi coacta, vel impedita, deerrat; & ubi in similibus, quod tale visitur, monstrum, & præternaturale quid nuncupatur. Sic quæ ad hominis naturam, vitam, dispositionem, situm figuram requiruntur, non genericè tantùm, sed & speciatim earum partium, quæ principes sunt, vel Principum ministræ, nunquam aut rarissimè immutantur; quicquid de numero, magnitudine, situ, coloreve aliarum minus principum nonnunquam imò frequenter appareat, vt in venularum, præcipuè externarum, distributionibus, glandium numeris &c. videtur. Has proinde assertorum multiformitates nil ob aliud adduximus, quàm vt ex his venaremur inventorum ductum non valdè essentialem famulatum, nec sic necessarium situm, connexiobem, capacitatemq; vt nutritionis summa, (quæ potissimum in sanguificatione consistit), ijs ritè, & rationabiliter demandetur. Nec enim sic (ex altera) Cauam, vel Portam in suis infectionibus diuersificari, sicuti nec intestinorum continuationem, ductum, ac intolusiones aberrare, cernimus: vt potè quibus alimentum deductio commendata fuit.

Cur in me-  
dium allata,  
& quod ex  
his eratur.

## CAPVT SEPTIMVM.

*Qua de lacteis, earum succo, & usu Iugur. Bilsij sententia.*

**H**icce duobus Auctoribus in paucis convenire videtur Ludouicus Bilsius celeberrimus, & ipse Anatomicus: Is enim (sic referent Antonio Deusingio præsertim lib. de chyli motu à num. 55. usque ad num. 65., & in disertat. Epistol. de hepate, off., ac alibi) adinuenisse, publicèq; monstrasse prohibetur, in huiusmodi venas lacteas (quas roriferas appellat) ab intestinis vaporis modo rorida m, seu tenuissimam chyli portionem recipi, eamq; per glandulas mesenterij percolatam partim ad hepar per easdem venulas, partim ad Receptaculum migrare. Hinc non solum thoracicum tubulum ascendentem progerminari, sed & infra ad vterum, testes, inguinum glandes, aliasq; partes ramificari; per superiorem verò tubulum non solum in subclauias inferi venas, sed &

ramos

ramos ad pericardium, ad mammas, fauces, colli glandes, caput, ac vniuersum corporis habitum ramos demandari, scribit.

Verum hunc non esse chylum, qui in sanguinem possit commutari, sed roridum tantum succum, qui pro partium irroratione, ac refrigerio inferuiat, & arbitratur ipse, & rationibus comprobatur; quarum prima est quod sanguis, quò minus per Cor transierit, eò turbidior, crassior, magisq; coagulatus, cernitur, & sic is, qui per mesaraicas abijt chylus, per horam soli expositus, inspissatur, ac vitreus euadit: at is, qui per dilatatum tubulum ad subclauias ascendit, cochleari exemptus, nulla ratione coagulatur. Altera est, quod hic succus per vniuersum corpus æquè, vt in Cor, abire potest; Et ideo non tantum Cordi materia suppeditatur, vt possit sanguis confici, pro toto nutriendo corpore sufficiens. Tertia quod sicuti nemo dixit, succum illum, qui in vasis lymphaticis inter lecur, & glandulas reperitur chylum esse, ita nec alium posse dici chylum, qui in Receptaculum, & thoracicum tubulum progreditur, cum ex iisdem lacteis, eodem modo, & per easdem glandulas percolatus incedat. Quin, & pericardium non posse illius liquoris affluxu destitui, quin animal moriatur, asserit ipse, cum tamen non tanta sit chyli necessitas, quin possit, & per diem integrum, & amplius animal consistere. Tandem se monstrare posse ait, ex copiosa per dies tres, vel quatuor saluatione parum, vel nil talis roridi liquoris ad Cor ex receptaculo peruenire, cum tamen interea, dummodò sufficiens animali cibi, & potus quantitas suppeditetur, nil, vel minimum corpus debilitetur; Ex quibus sibi luce clarius deducere posse videtur, non chylum, sed roridam quandam substantiam per similia vascula suggeri; Vt ideo nunc tandem constet, Vasa hæc, & si nomine diuersa (nam à Pecchetto lactea, à Bartholino lymphatica, à Bilsio rorifera, ab alijs chylifera, & fortè aliter nominantur) re tamen eadem, vel annexa esse; quamuis Bartholinus anceps aliquando sit, an lactea, an lymphatica nonnulla sint, vt potè qui cupit priorem tenere opinionem de chyli itinere ad Cor: qui tamen in hoc concurrit, lympham suam eadem vestigia peragere.

Alterum verò crassiorem, & nutritiam chyli portionem per mesaraicas venas ad hepar ire, artificiosissima autopsia commonstrat egregius ille Vir: quandoquidem, vt idem refert. *Deusingius cit. lib. num. 56.*, & sustinet in alio opere de hep. off. contra Bartholinum; canem viuum sine ferè sanguinis effusione aperiens, atque venas mesaraicas, arteriasquè secernens, hæc ligat, ne quid sanguinis ab his in illas possit exudare hinc canem, denuò conuulsum relinquit per quatuor, vel quinque horas, donec cibis, ante sectionem exhibitus, in chylum sit conuersus, cum interea aliquo liquore reficiens. Hinc aperit eum denuò, ostenditquè venas mesaraicas turbido liquore subcineritio, ac quasi vitreo refertas. Hunc autem chylum sic ad hepar delatum ibidem ab

Roridum succum non esse sanguinali signando operationibus probatur. Eiusdem prima ratio à succi, qualitate.

Secunda ratio à via non ad Cor solum, sed alio pectore.

Tertia ratio à similitudine succi, qui inter lecur, & receptaculum reperitur eo, qui in thoracicum it tubulum.

Quarta ratio à necessitate liquari pericardij.

Quinta ratio ex paucis illius succi quantitate ad Cor ob continuam saluationem perueniente.

Chylum nutritium ad hepar ire per mesaraicas venas, experientia motum Bilsianum.

eo in cruorem commutari clarè ostendit, obseruando sanguinem citra hepar, idest in Portæ vena existentem multò magis spissum, ac turbidum esse, quàm qui hepar transgressus in Caua vena reperitur.

Deuslingio ex-  
ceptio à Bil-  
liana senten-  
tia rejicitur.

Et quamuis Deuslingio aliquod dubium faciat ille motus lymphæ, qui videtur non à glandulis ad hepar, sed ab hoc ad illas esse, sicuti, & ab artubus ad interiora, vt per ligaturas probant alij Anatomici, ac præsertim Bartholinus; item & quod non omni nutriendi facultate rorem hunc prorsus destitui, sit opus: attamen hæc illius opinio est, non fundamentum rationis (qui vellet ab huiusmodi roriferis vasis viam chylo consterni à mesenterio ad mammas, & ad vterum profectum nutriendo, & pro generatione lactis): cum ligaturarum experimentum nil certi probet in vasis, quæ contrarios succi motus sine vlla difficultate mo- liuntur, & in laniatis animantibus, in quibus omnia ob mortis pauorem inordinate fieri, supponere licet.

Huc veniant nunc, qui totam probationum vim sensibus tribuunt, rationem ex altera nihili pendentes, videantq; quantum sensatæ illic tot Virorum experientiæ, tum qualitatis, tum motus, tum viæ succi huius, ac eius continentium vasorum discrepent, ac euacillent. Nonne omnes hi oculatissimi obseruatores? nonne & omnes, perspicacissimi Anatomici, manus, oculos, & ligaturas agnouerunt, intenderunt, exercuerunt? Et quid ergo est, quod tot audiunt etiam in sensatis varietates? fallax nimium sensus est, & ni rationi obtemperet, aspersionus. Dis- cant igitur hi omnes, sentire quidem sensus; at percipere, quid sentiant, mentis hoc esse, & principis facultatis opus: videt namq; oculus al- bum, nigrum, sed hoc discernere, menti incumbit, & rationi: proinde dolentes parte aliqua dolorem non sentiunt, si mens absit, vel ægrotet.

Si noua va-  
forum subo-  
les dando sit  
quisnam eo-  
rum vsus ex  
opinionem  
Auroris statu-  
tus sit.

Equidem si nouum lactei feri affluxum, si nouam vasorum sobolem à se ipsa consistentem concedere opus sit, ingenuè fateor, me huic sen- tentiæ libentiùs subscripturum, vt quæ exprimento innixa, rationi optimè omnium neotericarum inhæret. Scilicet corpus nostrum du- plex necessariò habet effluuium, vnum quidem ab intrinseco principio, nempe à natiuo calore, qui humiditatem primogeniam, veluti lychnus oleum, viuendo absumit; alterum ab extrinseco ambientis, ventorum, ignis, solis, stellarum, motusq; calore, aut attritione, expressione, pene- tratione &c. quæ omnia semper dissoluunt, siccant, tabefaciunt, Ideo non absolum, si Natura prouidisset duplicem quoque instaurationem, vnâ scilicet substantificæ, & caloris humiditatis, nempe ex san- guine; alterâ rorefacientis, humiditatisq; adualiter, & simul quoquo modo refrigerantis qualitatibus, ex tenui, rorido, ac subfrigido succo: Quandoquidem, & videmus, duplicem quoq; nobis Naturam indi disse appetitum, famem nempe, ac sitim, per quas cibi, ac potus egestas in- dicatur; illius quidem calidi, solidiq; & alimentosi, huius autem liquidi,

tenuis,



tenuis, abluentis, ac nonnunquam refrigerantis; vt duplici quoque iam dictæ instaurationi satisfiat. Et quamuis vtrique simul, & semel vt plurimum soleamus intentioni inseruire: non deest tamen, quin aliquando seunctim, & appetatur, & impleatur vtraque, vel cibi solius, si multa in corpore subsistat humiditas, vel potus, si nimia siccitas adsit, vt in febribus accidit aliquando, & in magnis æstibus, sudoribus &c.

Quamobrè, quamuis rationabilius sit, sicuti eodem tempore cibis, potusque assumuntur vt plurimum, ac in idem vas deglutiantur, ita & per idem iter vtrunque simul ad alendas irrorandaque membra deferri, hoc est per venas: attamen nec penitus extra rationem esset, quemadmodum separatim, vt diximus, quandoque appetuntur, sumuntur, ac dispensantur, & quemadmodum variis finis amborum, varia substantia, variaque egestas constituitur; ita & varium esse iter, variaque vasa excipientia. Nec incongrueret, aut confunderet quicquam hæc varietas: quia, si detur, (vt dari necesse est), nil ad membra iuuanda naturaliter ire, nisi per attractionem, quæ à naturali, vel animalis appetitu prodeat, non mirum, per varia quoque vasa varium succum ab egentibus partibus attrahi eò vsque, donec ad radices, quæ in aluo sunt, & ab intestinis exugunt, perueniatur.

De hac autem partium, ac Cordis irrotatione suum veritati seruo locum, libenter, quoties huiusmodi Bilsianæ ramificationis publica, & authentica habeatur fides, illi me dediturus. Interim verò Antiquorum opinioni æquius subscribere ducens, nec tamen Bilsij auctoritati repugnans, (quæ à Bartholino etiam amplectenda videretur) chylum ad hepar rectè progredi, non ad Cor, manibus, pedibusque contendam; in glandulas verò solam sensiolem partem vadique corruari, aceruari, contineri, ac opportuno tempore, vt dicitur, distribui, & educi, autumabo; Contentus pro nunc admittere, varijs corporis transfluxibus varios ductus, ab Antiquis nonnunquam cæcos dictos, nonnunquam poros, nonnunquam cavitates; vt alienum non sit, eos à diligentissimo Artifice posse inueniri, describi, ac vsus adnotari, quemadmodum cæpit Afellius, auxit Pecquetus, addidit Bartholinus, vt forsan Bilsius perfecit. At quod nutritionis iter, & sanguinis propagatio, res adeo vniuersalis, & patens, per sic cæcas vias pergat, hoc incredibile puto, & nullatenus admittendum.

Sed & per venas totam chyli massam in Iecur, & à Iecore in totum corpus dispergi, verior dictæ opinatus: nam multiplicare entia præter necessitatem, paucæ signum providentiæ. Si autem per idem os, per eundem ventriculum, per eadem intestina, & vt plurimum (maximè sanitatis tempore) eadem hora, ac ad eadem membra vtriusque; refoecillationis materia deportatur, verosimilius quidem est, etiam per eosdem canaliculos eam progredi semper; maximè cum tenuissimum possit reliquum pro vehiculo inseruire, sicuti & sese inuicem contemperare; quare

Quodammodo Bilsij opinio approbatur.

Antiquorum tamen opinioni quidam subscribitur.

Totum chylum per venas in Iecur, ab hoc organo corpus dispergi, opinio verior.



quare & videmus, si mittatur sanguis, semper cum eo adesse serum? Vasa item lactea, Auditorum suorum testimonio in venas multoties sese insinuant (vel verius ab ipsis dimanant) itaut in illas eorum succus effundatur: cur ergo non in illas ingreditur primò?

## CAPVT OCTAVVM.

*Et si dentur vena lactea, & Pecqueti receptaculum, chylus tamen ad Iecur, non ad Cor traducitur.*

**A**T quid quæso, ijs visis, ac consideratis opinionum dissensionibus, iudicare licet? Equidem dictorum varietas, attestantium dissensio, ac attestationum inconstantia, multum de fide detrahunt: rerum autem novitas non sic vacillantia probationum genera pro sui propagatione exposcit; nec clarorum negatio valde credulos audientes redelit.

*Et lactem, & Receptaculū, & lacteus tubulus thoracicus adiunct.*

Hoc verò non obstante, dicendum est, huiusmodi adesse venulas albas, tum in mesenterio, tum alibi; necnon Receptaculum; glandosum nempe corpus; ac etiam ascendente ab eo canaliculum per sinistram spinæ latus supra ad sinistram venam axillarem pergentem; eaq; aliquando plena conspici albo succo, & plerumque sero, si animal adhuc vivum scindatur, vel homo adhuc calens, & subito strangulatus quatuor, vel quinque horis post pastum anatomicæ secespitæ subijciatur. Sic videtur admittere Ioannes Riolanus in suis ad Pecquetum responsionibus. Sic testatur Carolus le Noble in suis *observat. de Lact.* Sic Plempius, Galtracchius, Bilsius, aliique Authores multi. Sic novissimè mihi testatur Excellentissimus, omniq; vera laude dignissimus Hercules Marchellus, Medicus Genuensis, qui, se multis in cane vivo dissecto palàm ea ostendidisse, ad me scribit; Sicuti & præstantissimus, nec unquam satis laudatus Vir, Bartholomeus Torrinus, Medicus, & Philosophiæ primarius Lector Taurinensis, de eisdem fidem facit.

*Circa Receptaculi descriptionem varietas Authorum.*

Solummodò pro nunc alia Authorum discordia in Receptaculo designando consideratur, cum Bartholinus tres glandulas vt plurimum asserat esse; Pecquetus quoddam corpus spongiosum, membranosumq; Riolanus magnam quandam glandulam; Carolus Nobilis corpus vacuum, cellulis diuisum intus, membranis tenuissimis obuolutum, mollissimis glandulis distinctum, copiosa circumfusum adipe, in finibus, taque implicatam fibrillarum multitudine. ) Itaut quot capita, tot habeantur de eo testificationes. Nisi velimus dicere, eos Auctores simul conciliari posse hoc modo, quod Bartholinus censuerit, Receptaculum chyli propriè esse illas tres, vel plures glandulas dorso alligatas; Pecquetus & Carolus non glandulas solas, sed & membranum, ac adiposum illarum involutum; Riolanus autem magnum corpus glandosum ex varijs glandulis efformatum.

Vicun-

Utunque tamen sit, & his omnibus concessis, non sic facile negare debebunt ij duo præstantissimi Viri Pecquetus, ac Bartholinus, chylum ire ad hepar; nec alij sic statim admittere, chylum partim ad hepar per lacteas, partim verò ad Cor per insinuatam viam thoracicam ascendere: Nam illud primum negari non potest, cum clarissimum esset testimonium Galeni, Vallesij, Vesallij, Falloppij, Curtij, cæterorumq; veterum Medicorum, ac Anatomicorum illustrium, à vena Portæ plurima produci ramusculorum ora in ventriculi, tenuiumq; ac crassorum intestinorum internam sedem hiantia, vbi chylum ab ijs excipiant, ac fugant; & ea diversa ab alijs venis, quæ dictarum partium nutritioni interuiunt ( hæc enim non intro penetrant, nec hiant, sed per earum partium substantias variè insinuantur,) vt videre est in figurato, & fusè explicato Portæ venæ apud Vesallium exempla, & in configuratione verbali Galeni 4. de vsu part. 17. 19. & 20. necnon 6. de placit. Hipp., & Plat., Et vt Bilius nouissimè citatus oculis cuiusque subijcere spondet in intestinis balsamo conditis, quæ apud se habet, in Respons. ad obseruat. Barbetyj num. 5., vt notat Densingius dicto lib. de hepat. off. pag. 212. Per hæc enim oscula congruum erat putare, dum per ipsos recens supponitur, venas omnes ab earum sinibus ad Truncum versus Cor fugere, vel potius excipere, vehereq; etiam chylum posse ad hepar traduci, nil rubedine venarum obstante, quæ ab arteriarum anastomosibus iuxta per illos admissas circulationis leges foueri poterat. Præter quàm quod per Lacteas quoque ipsas in Portæ caudicem, & in hepar immediatè insinuatæ, quæ ab Acellio antea, & ab alijs postea figuratæ, ab ipsoq; Barthol. admittæ fuerant, permitttere etiam chylo transitum debebant; nil ligaturarum experimento contrahente, vt ex quo difficillimum est motum naturalem iudicare in vasis, quæ vtrinq; continuantur, & in emoriente, ac præter naturam se habente alligatis, vellicatis, ac intortis.

Secundum verò nec sic liberè admitti debebat: nam lactea vasa, præter pauca à iecore immediatè prodeuntia, esse eiusdem Portæ venæ soboles, inficiari minimè possunt, cum à venis mesaraicis plurimæ producantur, & capillorum modo (vt ex Veterum placitis, Tractatum insequendo, insinabitur) partim in glandulas insitæ finiant, partim interanea penetrent. Cætera verò, quæ alibi disponuntur, nonnè rùm Cauæ, eum ramorum eius germina esse iuste dubitari potest? quippè ea cum dictis venis coire, inseri, interaneari, omnes illorum conficiuntur Inuentores; Vt proinde meritò dicere liceat, lacteas venas cum sanguiferis eiusdem generis esse omnes. Aliter, cur illæ in has penetrant? Et quis iuste scit, nùm ibi sit illarum principium, nùm verò finis? nùm potius a venis trahant, nùm ad illas deferant? Nervi, arteriæ, vt sunt diuersi generis vasa, diuersaq; principia nanciscuntur, ita nec in se mutò penetrant, occurrunt, inseruntur, nec in venas. Sed & sciri tria tantum corporis principia ponuntur, ita tria esse illis, ac toti inferuiuentium

Nis omni-  
bus datis.  
chylus ad  
hepar, non  
ad Cor mi-  
grat.

Lacteas cum  
alijs venis  
esse eiusdè  
generis, præ-  
batur.

ductuum sola genera, est arbitrandum: nec enim rami sine trunco, nec truncus sine principio. Neque hic aliquis dicat, principium eorum esse Receptaculum: nam nec ad id omnes lacteæ continuantur, nec ab eo truncus aliquis exit. Sed & plurimas illarum esse venarum, mesaraicarum germina, tradit *Riolanus in Opusc. nou. contr. Barthol. & confirmat. Deusing. cit. Opere de chyli motu, & alibi*. Quemadmodum Hyperus, ac Regius eas inuicem confut. di. & coire in ipso pancreate arbitrantur. Si ergo plurimæ mesaraicarum sunt, reliquæ aliarum venarum germina erunt: nam eadem specie debet esse vnus speciei origo, idemq; progerminationis modus. Quæ verò pro, et quæ contra hanc positionem dubia afferri, & quomodo dissolui possint, ponitur infra capitibus 15. & 16.

Adde his, quod præter canaliculos, qui à supracitatis Auctoribus VVallæo Hymoro. Afellio &c. ponuntur à Pancreate ad lecur peruenire, alia quoq; non incelebris confluxio ab eodem emanat, à nemine, quod sciam, præterquam à Faloppio, animaduersa in sua *Anatom. pag. 17.* & his notis depicta. Aliquando reperiuntur rami venarum à Portæ trunco per hepar disseminati, qui ab extremo apice sinistræ fibræ ex hoc viscere egrediuntur, & per ligamentum, quo in illo latere hepar

Quedam venarum lecoris, & Pancreatis confluxit à Faloppio adnotat.

aliquando septo transuerso iungitur, repentes, atq; ipsi septo communicati descendunt per posteriora, ad dorsum vsque, ibiq; iunguntur sub pancreo cum quibusdam alijs venis ab eodem Portarum trunco extra hepar obortis. Ad quid autem hæc vasorum vnio, nisi pro nutrimenti, & succorum communione?

Insertio autem tubuli thoracici non in Cor, nec in Cavam sub, vel propè Cor, sed in axillarem sinistram tantum, & rariissime in dextram fieri, ab omnibus ponitur; nec vltra in venis, lac observatur, aut ipsius motus cernitur. Et sic de eo eadem viget dubietas, num scilicet ab axillari sit illius origo, & in Receptaculum terminus, num è contra: in quo definiendo, si quid exempla valeant, primum potius definiendum erit: siquidem eundem ortus modum, eundemq; ad inferiora progressum per Spinæ dextram agnoscit Arygos vena, sine pari dicta, quæ supra Cor à Cauæ dextra latere connascitur, & infra lecur, vt Faloppius aduertit, in Cauæ ramos inseritur. Quis verò dixerit, eam infra suum habere principium?

De rubi thoracici origine vel fine dubium.

Quid de lacteo succo in Receptaculo & lacteis reueto licet etc.

Quid ergo ex depicta lactei succi vbertate, per thoracicum tubulum sectionis tempore mota, arguere possumus aliud, quam spinalis medullæ, vertebrarum, nervorum ab ipsis prodeuntium, eiusdem glandosæ tubuli superfluam ex alimonia lacteam serositatem, quæ multis pro corpore vsibus possit inferuire? Et quid per sic facile latitantem furculum, quo non est minor quælibet ad pedes, & manus ducta vena, de chyli ad totius nutrimentum parandum destinari deductione concipere, vel sperare possumus? Quid quæso aliud ex reperto quoq; in lumbaribus,

scd

sed mesentericis glandulis lacteo humore arguerelicer, quàm earum pinguium, glandosarum, & membranearum partium confectum alimentum, vel in eas ab adiacentibus attractam ferofitatem? Et quod ex dictis glandulis, quæ semunciam, vel paulò plus lactei feri pro qualibet in seipfis recondere valent, de chyli traductione in corpus alendum pingere, vel cogitare quimus, cum ipse, in ventriculo confectus, in intestinisq; (fascibus seiunctis) iuncto sero, cæterisq; excrementosis humoribus, quos cum ipso ad secundum coquilinium ferri, omnibus innotuit, ad libras pondere ascendat? Et quid credulitatis ad id prohibet illa exilitas vasculorum ad Receptaculum procedentium, eorumq; in ipsum introitus, sola ratione, & imaginatione discretus, vt idem testatur Barthol. cap. 6. verbo Connexio? & ex altera tot vasorum à mesenterio in Portam, hepaticq; prouentus? Mihi quidem hic modus similis videretur eorum intellectioni, qui latas vias prætereuntes, in semitulas, & varicosos viculos se coniungunt. Nisi forsàn glisceremus, necessitatis tempore, obstructa scilicet via hepatis? Naturam posse hac semita aliquid chyli ad Cor traducere, quò animal eo meliori, quo licet, modo interim nutriatur, prout reuera ingeniosè opinatus est Riolanus in suo nouo iudicio de ven. lact. etiam si tunc nec deesset alia via per supracitatum venarum mæandrum, à Faloppio descriptum.

*Necessitatis tempore per lacteam semitam posse chyli aliquod ad Cor deduci, admititur.*

Præcipuè autem hæc conuincuntur, si vera sit à Riolani, tum Bilij Autopsia, qua ab ijs lacteas non solum supra ad subclauias, venas, sed & ad inferiora tendere, relatum est. Si enim chylus ille succus esset, & ad Cor deducendus, cur ad inferiora veheretur? & cur superius non ad Cor tantum, sed & ad mammas, & caput? & cur vaporis modo in lacteas ab intestinis pertransit, tenuissima, quamuis aliquando alba, consistentia donatus? Sed iam tempus est, vt ad dictorum enucleationem, & comprobationem deueniamus.

## CAPVT NONVM.

*Lacteas Venas, chylinè receptantes glandulas Veteribus quodammodò innotuisse, probatur.*

**H**IC itaque animaduertendum in primis nobis est, huiusmodi glandularum, lactearumq; venarum nouum non omnino esse inuentum, sed & antea, & antiquitus quodammodò innotuisse. Illud solummodò, meo iudicio, nouum, quod à Modernis Auctoribus datum est de dictis partibus, earumque proprijs officijs, ac vñbus iudicium: Etenim, si legatur Hippocrates lib. de gland. num. 3. ibi hæc habet: Glandulæ autem in intestinis maiores sunt, quam alibi in corpore, & pascuntur humectationem nimiam ex intestinis exprimentes. Habent præterea etiam renes glandulas: nam & hi multa humiditate exantiant.)

Hippocrates  
de lacteo  
glandularum  
succo, & en-  
tum venulis  
sententia.

Sed clarius, & ferè Neotericorum adiuuentionem diuinans, sub num. 1. de prædictis glandulis, de earum venulis, & albo succo mentionem facit, dicens: De glandularum naturæ sic habet. Natura ipsi spon-  
giola: sunt enim raræ, & pingues, & neque carnes sunt reliquo cor-  
pori similes, neque aliud quid simile corpori: sed friabiles sunt, &  
venulas multas habent: Si verò disseces, sanguis largus erumpit  
specie albus, & velut pisuita. Tangenti autem velut laxæ apparent,  
& si multa vi ipsas digitis compresseris, glandula humorem oleosum  
remittit, qui & ipse conteritur vt plurimum, ac disperit. Quæ sen-  
tentia, si cum grano salis ponderetur, videbimus, adunguem omnia de-  
scribi in glandulis, earumque venis genericè, quæcunque hi nostri æui  
Auctores in suis lumbaribus nouiter, & aiunt ipsi, inuentis obseruauerunt,  
tam quoad venulas ù implantatarum copiam, quàm circa album illarum  
succum, illiusque faciem euanescentiam, & oleositatem, à multis in  
impluuiio dissecto, adnotatam.

Si idem tho-  
racici tabuli  
commento-  
ratio quædam.

Sed & de tubulo thoracico, in sinistra clauiculæ parte à vena Caua  
suborto, nonnè idem Hippocrates lucem quandam *lib. de off. nat. num. 14.*  
exhibuit? Caterùm (inquit) hepatis vena in lumbis vsque ad ma-  
gnum verticulum infernè etiam verticulis se ingerit, inde sublimis  
elevatora per hepar, & per septum transversum in Cor; & hæc quidem  
rectà ad clauiculas procedit. Inde verò aliæ quidem ad collum, aliæ  
ad scapulas, aliæ deorsum reflexæ iuxta verticula, ac costas decli-  
nant, à sinistris quidem vna propè clauiculas, & dextris autem in  
quendam ipsarum locum. Cum autem Anatomici, vulgariter ex  
hac sublimi Cauæ sede nullam aliam venam: deorsum reflexam, versus  
lumbos deriuent, quàm à dextra parte eam, sine pari dicant; Hippo-  
crates autem hic aliam à clauicula sinistra eò tendentem memoret; pa-  
tet, non de alia, quàm de albo hoc sinistro tubulo posse loqui, & sic per  
Eum nò à lumbis sursum ad Subclauis, sed e contra à subclauis deorsum  
ad lumbos talem ductum commigrare: Ipsum enim venas nominare eas  
etiam, quæ album fundunt sanguinem, ex proximè anteriori citata sen-  
tentia de gland. num. 1. constat.

Estem de  
pancreate,  
glandulis, &  
earum venis  
sententia.

Si legatur itidem Galenus, is non semel magni glandosi corporis, &  
cæterarum mesenterij glandium, venularumque, ad eas efluentur distri-  
butarum meminit. *Sic 4. de usu part. cap. 19.* hæc leguntur: Primò  
namque (scilicet natura) toti mesenterio venas effecit proprias, nu-  
triendis intestinis ipsi dicata, haudquaquam ad hepar traijcientes:  
Verùm, vt Hierophilus, dicebat, in glandulosa quædam corpora de-  
sinunt hæ venæ; cum cæteræ omnes sursum ad Portas ferantur.)  
Vides hic, Lector, quomodo Galenus è viuo eas pingit venulas, quæ  
ab intestinis in Pancreas, & glandulas desinentes describere Asellius,  
Pecquetus, ac Bartholinus. *Sic lib. de diff. ven. & art. cap. 1.* hæc  
ait: Sunt autem & aliæ venæ in tenuiorum intestinorum medio me-  
senterio,

„ fenterio, quæ ad glandulas quasdam ea regione positas pertinent. )  
 „ De glandulis verò sic loquitur *lib. 5. de vsu part. cap. 2.* Magno indi-  
 „ gebat locus hic præsidio, quo vasa in ipsi distribuenda, ac discenden-  
 „ da munirentur; Cuius haud ignara Natura glandulosum quoddam  
 „ corpus fabricata, quod Pancreas appellamus, subtrauit, ac in omni-  
 „ bus circumdedit, diuisione squè repleuit, vt nullum ipsorum facile iam  
 „ findatur, aut sine fulcimento sit. ) *Et lib. 4. cap. 2.* Plurimis verò  
 „ vasorum, quæ admodum sublimia, atque erecta ad hepar porrige-  
 „ bantur, quæ mutuo coeunt, hanc ipsorum partem iniurijs magis ob-  
 „ noxiam cum exploratum haberet: corpus quoddam carnisforme in-  
 „ seruit, quas glandulas appellamus, quæ vtique, velut cunei quidam,  
 „ vasorum diuisionibus incubantes, fulcimentum ipsis tutum sugge-  
 „ runt. ) Ex quibus locis patet, Galeo notissima fuisse pancreas, glan-  
 „ desquæ alias, & venulas ad ipsas pertinentes.

Idem de Vesallio dicendum: nam *lib. 5. de corp. hum. fabr. c. 6.* in mesen-  
 „ terij centro magnum corpus glandosum esse, docet, vbi primas vasorum  
 „ distribuiones fieri, asserit, & in qualibet vasorum scissione alias glan-  
 „ das disponit, præter magnum pinguedinem ipsi mesenterio vndecunque  
 „ connatam; quarum usum esse ait, vt tutissimè vasa ad intestina dedu-  
 „ cantur, & vt dorso intestina aptissimè colligantur. Illius series hæc est:  
 „ At proinde ad mesenterij quidem centrum, vbi prima vasorum sit di-  
 „ stributio, grande corpus glandosum extruitur, insigniores, ac primas  
 „ vasorum dissektiones securè admodum suffulciens: Per reliquam verò  
 „ mesenterij sedem singulis propè vasorum ductibus Natura glandu-  
 „ lam quoque aliquam interiecit diuisionis robur simul ac firmamentum  
 „ futuram. Adeo vt simul quoque glandulis illis accedentibus, mesen-  
 „ terij membranæ vasa versus intestina tutissimè deferant, intestinaquæ  
 „ omnia dorso quam aptissimè colligent. ) Quibus vltimis verbis, sicuti  
 „ & primis illis annuere videtur nouum hoc dictum chyli Receptaculum:  
 „ nam magnum corpus glandosum, & primæ vasorum distributiones, &  
 „ dorso, ac intestinorum colligatio nil aliud, quam dicti Receptaculi sub-  
 „ stantiam, magnitudinem, vasa, situm, & connexionem, à Iunioribus  
 „ adnotata, describere videntur; cum de cæteris mesenterij glandulis ea  
 „ intelligi minimè possint. De ipsarum verò glandularum vasculis ibidem  
 „ hæc protulit verba: Quemadmodum vel illi Portæ venæ remuli  
 „ ostendunt, qui variè per omenti membranas intestinis instratas ex-  
 „ currunt, & qui in omenti, & mesenterij glandulas terminantur, ne-  
 „ que ultra incedunt, foliq; ità nutritioni famulantur. ) Sicuti & eodem  
 „ *lib. cap. 5.* hæc eadem habet: Neque etiam vasa, quamadmodum in  
 „ duodeno, secundum ieiuni, & illi longitudinem deducuntur, sed velut  
 „ ex mesenterij centro ex alto sursum tendunt, rectaque antroorsum in  
 „ intestina pertingunt, in quæ numerosa sobole arboris radicum modo  
 „ implantantur, osculis suis in internâ intestinorum sedem inhiantia. )

Ipsæ

Vesallij de  
 glandoso cor-  
 pore, & ve-  
 nulis dicta.



Iple etiam *lib. 3. cap. 6.* iam citato mæzareon à Gaza in Aristotilis interpretatione Lactis nomine donatum fuisse, a firmat, sicuti reuera apud *3. hist. anim., & 4. de part. anim.* legitur. Sed & *lib. 3. cap. 5.* à quibusdam venam Portæ lacteam appellari, testatur, eo quod succus (ita loquitur), quem defert ab intestinis iecori, lacteus sit. Id quod ex alio effectum non est, quam quod antiqui Romani, qui Dijs sæpè agnos, & alia armenta immolabant, & ferè viuientia, ac adhuc calentia exenterabant, non rarò viderint, in mesenterij glandulis, earumque venulis copiosum lacteum succum detineri, vt benè aduertit Riolanus in sua responsione ad Pecquetum, & Pecquetianos.

Falop. Mûd.  
Mercati, &  
Zacut. sen-  
sentia.

Faloppius quoque, & Mundinus nil minus silent, quam in mesenterio, & præcipuè in eius centro varias adesse glandulas. Iudovicus Mercatus *Tom. 1. lib. 1. quæst. 114.*, & Zacutus *Lusit. lib. 6. de Med. Prin. hist. histor. 6.* de mesenterio optimè huius glandosi corporis meminere, de  
 „ cuius vsu eadem amborum sententia fuit. Huius vltimi verba hæc  
 „ sunt: Hoc corpus glandosum in postrema ventriculi regione versus  
 „ spinam repertum, duodeno intestino adhæret, quod quia quandam  
 „ carnem, & diuersam naturam à mesenterio representat, Pancreas  
 „ tam Græcis, quam Latinis appellatur, cuius vtilitas est, vt ramos  
 „ venæ Portæ ventriculo, & lieni distribuendos (Mercatus addit duo-  
 „ deno) securos reddat; deinde vt ventriculo tamquam molle subster-  
 „ niculum subijciatur.)

Varij apud  
Veteres, præ-  
ter venas  
memorantur  
meatus.

Quin etiam, præter ordinarias sanguifluas venas, alia permulta adesse in corpore humano vascula ad succos deportandos, fluxiones excipiendas, & decubitus adiuuandos idonea, optimè agnouisse Veteres, potissimum Hippocratem, tam certum est, vt nil magis apud eum decantetur, quam illud Confluxio vnâ, conspiratio vna &c., sicuti & apud Galenum quamplurimos in corpore cæcos adesse ductus, inconspicuos meatus, poros, cavitates; & exinde vniuersas partes inuicem conspirare, recipere.

Idem esse.  
Antiquorum  
Pancreas cū  
cæteris glandulis,  
& nomen Recep-  
taculum am-  
bigi potest.

Ex his ergo, & alijs, quæ possent afferri, Antiquorum dictis; & ex Recentiorum Auctorum supra indigatis dissensionibus circa figuram vocati ab ipsis Receptaculi, non leue argumentum desumi potest, idem illud esse cum glandulis tum Hippocratis, tum cæterorum, & præcipuè cum pancreate dicto: Ideo non mirum, si Pecquetus, suo Receptaculo descripto, dicat, se postea quæsiuisse Antiquorum pancreas, sed non inuenisse. Bartholinus autem supra visum est, quam multiplex in glandulis suis numerandis, situandis, describendisquæ fuerit. Quare & situs, qui glandulis, & Pancreati ab allatis natu prouectis Auctoribus attribuitur, nempe post ventriculum propè Spinam; & substantia, quæ earum describitur; & magnitudo pancreatis, quæ Pecqueti sensum superfugere non debuerat; & glandularum multitudo à Bartholino posita, indignant, eandem quidem rem esse, sed tantum nomenclatura, & officio no-  
 uiter

inter ijs adscripto, & succo, in eis certis horis animaduerso, dissidentem. Sed quomodocunque sit, illud saltē constat, nouum hoc Receptaculum sub nomine glandularum ab Hippocrate, & Sequacibus mesenterio, intestinis, renibus, lumbisq; assignatarum aptē comprehendī.

*Satis enim sub nomine glandularū, & hoc comprehenditur.*

Quemadmodum, & satis probatum mihi videtur, etiā Veteribus Anatomicis, & Hippocrati ipsi cognita, & visa fuisse lactea vascula. Solummodō, cum tamquam notissimum cunctis esset, eorum alia ad Iecur deferendum chylum, à ventriculo, & intestinis exsuctum; alia verò ad Pancreatis ipsius, mesenterijquē, & intestinorum nutritionem dicata, ideoq; non curauerint, certis horis plurimos capillares canaliculos succo albo plenos, cæteros verò adhuc sanguine refertos reperiri; hanc peculiarem, ac indiuiduam distinctionem digito monstrare, & notanter circumscribere non sunt aggressi: sed omnia venarum cauula in genere, vel ad dictarum partium nutritionem continendam, seu deferendam; alia verò ad solum chylum iecori referendum nata esse, pronuntiarunt; nunquam animo concipientes, posse chyli translationem per notissimè notatum tubulum, propè Spinam hærentem, ad superiora (Iecora prætergresso) fieri, prout hi Neoterici Doctores his temporibus lata fronte proferre non horruerunt.

*Quodammodo etiam lactes Veteribus cognitar.*

Quibus quidem immortales habendas esse gratias, ex animo fateor; ut qui, iugi sua perquisitione, ac solertia horum vasculorum processus, alias inuisibiles nominatos, cunctorum oculis subiecerunt lucidissimè perspicendos, & quæ alij sub genericis cæcorum meatuum nominibus umbrabant, specifice nobis ad oculum designarunt. Summa ob id laude dignissimi, ni præcept de illorum succo, itinere, vsuè datum iudicium cum tanta, & tot Medicorum dogmatum reuolutione, & Reipublicæ Medicæ iactura, nimis mordicè tueri satagissent.

Quandoquidem, si talis de chyli semita, & hematosi detur Pecquetiana enuntiatio, micum, quot rerum inuentiones, quot paradoxa, & quot introductæ in Medicinæ praxis eliminationes succedent: Iecori enim venia data, non iecoraria, sed cordialia tantum in læsa sanguificatione remedia administranda. Et qui roboratio, ad localia medicamenta addita, dextro hypochondrio proderit, aut exquiretur? Quæ pro nutritione iuuanda iecoranorum necessitas? Quæ pro hepaticis fluxibus in aperitione deobstructionequè utilitas? Et verò si cæteræ ab ipso, & Sequacibus additæ consequentiæ addantur, miraculum est, si quicquam de Theorica Medicinæ parte intactum pacatumquè remaneat, quin mille succussionibus omnia reddantur obnoxia: Hinc enim, & à chylo, non ab alijs venis, non à sanguine lac, semen, fætum, e.usquē in vtero alitionem aucupantur. Nec de sunt, qui ex hoc sanguini etiam veniam dantes, chylo immediatè corpus, aut saltē solida membra enumerari, assueverant. Ab his vasis lachrymas, saluationē, pericardij aquam, adenum succum, vrinam, sudores, nonnulli eliciunt. Alij facultatem attracticem,

*Quæ Arti propudicia à Pecqueti, & Bartholini thesibus alienantur.*

attracticem, retentricemquè exterminantes, soli impulsioni tùm alimoniam ipsam, tùm excretiones omnes commendant. Isthinc ad perennem, & velocissimam sanguinis circulationem admittendam necessariò ducimur; à qua quot circa pulsus essentiam, causam finem; circa respirationes ideo vsum, & efficiens; circa sanguinis depurationem, partium plurium vsum, excretorios canales, spirituum essentiam, originem, ac ductum, sanguinis naturam, humorum aliorum generem, membrorum temperiem, succorum motus, ac alia multa Veterum Medicorum dogmata; quot inquam commutationes, dissensiones, confusiones, & contorsiones emanent, vix cogitari, nedum dici potest. Hoc dixisse sufficiat, nouas, ac diuersissimas totius Medicinæ Institutiones requiri; quales iam apud Gotofredum Moebium inuenies, non ob aliam rationem formatas, quam vt nouæ hæmatoseos, nouæquè de sanguinis circulatione doctrinæ cuncta adaptentur; Quasi verò non priùs de illarum veritate sit ampliùs disceptandum, sed citra controuersiam aliquam ab omnibus sint illæ acceptandæ, prioribus (quæ tamen adeo solidæ sunt), vt idiscolis, eliminatis. Non sic verò sicco pede transitur hyems. Quæ solida, diuq; radicata sunt, non cuilibet, etiam validæ concussioni cedunt.

Quid interim faciant Iuvenes, iam iam in tot ambages ideo inuoluti, vt suis interdum diffidentes ingenijs, & tot nouitatum mole perterriti, cogantur, Rationali Medicinæ Potione seposita, ad Empiricam se totos dedere, cum magno Artis dedecore, & Aegrotantium ineluctabili damno? Tot proinde passim insurgunt Medicastrî, qui, quibusdam foliis proprietarijs medicamentis hærentes, omnes vno colopodio calceant, nec ab horrore febrem, nec à bile pituitam, nec turbith ab elleboro distinguunt. Sed iam tandem ad rem descendamus.

## CAPVT DECIMVM.

*Chyli per Thoracicum tubulum traductionem nulli ex suppositis visibus inferuire posse, probatur.*

**H**isce præhabitis, iam tempus demonstrandi est, hancce nouiter insinuatam viam non esse chylo ad superiora vehendo idoneam, minusquè ad ipsum Cor; vt tandem illud certò eruatur, concludaturuè, chylum non hanc modernam, sed iam per tot sæcula calcatam hepatis viam peragrarè; succum verò in vasis lacteis contentum chylum reuerà minimè esse, sed quid aliud, vt postea dicetur. Illud autèm quadruplici in primis modo mihi probare posse, videor. Et primò, quod similis chyli traductio nulli vsui ex aduersò suppositis ritè inferuire debet, aut potest. Secundò, quod nullus datur conueniens, aut sufficiens modus illac chylum traducendi, minimèquè omnium à Pecchetto dispo-

Chylum non  
ferri per la-  
ctea ad Cor,  
quadruplici  
via proban-  
dam propo-  
nitur.

situs

fitus. Tertiò quod non sufficit dictus tubulus ad totalem illius translationem; bipartitio autem sanguificationis est incongrua, ideoquè nec danda. Quartò tandem, quod hac etiam data, frustratoria, vitæ perniciofa, & ineffabili Naturæ cognitioni deformis effet hæc actio.

Vt igitur à primò incipiam arguendi modo; Vfus, cui à Pecquetò, ac alijs talis chyli traductio dedicata est, non alius extat, quàm vt à subclauijs venis, medio recurrentis sanguinis, in Cor feratur, ibiquè à nativo illius validissimo calore mutetur in sanguinem, corpori alendo per arterias deferendum: Qui tamen vsus nullo modo admittendus est: præmissò enim, ac solemniter priùs protestato, ex supra, nimirum capite primo, ac secundo, allatis rationibus, ( quibus nec factum, nec pro virili satis fiet ), Cordi non competere sanguificandi opus, nec ab ipso posse, aut debere exerceri; itaut ex hoc capite, & ad hoc inutilis, ac frustratoria esset ad ipsum quævis chyli traductio; Dico vltèriùs, quod sic nimis vanam, ignisquè se patefaceret Natura ( quæ tamen tantoperè ab Hippocrate, Platone, Aristotele, Galenoquè audatur, prædicatur, & in sua providentia suspicitur ); vt potè quæ sic lentè, & per adeo longum circuitum, ac angustum aditum voluerit à ventriculo, & intestinis chylum excoquendum Cordi porrigere; cum saltem potuisset ( siquidem lecurerat in transitu prætermittendum ) tubulum thoracicum non ad subclauias, seu axillares venas Cordi superiores, ac laterales, sed ad Cauam infra Cor inferere, vt per ipsius foramen posset citò in eius ventriculum chylus acceptari, foleri, & concoqui: si enim ad Cor illi erat eundum, cur antea illud prætergredi? Si immixtus eò iturus requirebatur, ad quid in cruentas venas anticipatè prolabi? Si verò mixtus, cur mesaraicas, cur lecur, & cur Cauam euitare? His Bartholinus in *Defens. Vas. lact., & lymphat.* obuiam se facit, dicens, quod sic Naturæ placuit. Sed dicat mihi: quando ei Natura hoc reuelauit? aut quomodo ad aurem sic eum alloquuta est? An ipse solus, & expertissimus Naturæ interpres ei vquam à Consilijs fuit? Imò quia illud sic fieri, incongruum videtur, ideo non placere Naturæ, omniquaque scientissimæ, dicendum est. Ex hoc ergo aliam rationem excogitauit is ipse; ita scilicet factum esse, vt per longiorem, & angustiore in ductum purior reddatur chylus, sicut videmus, aquam, quò longius per subterraneos ductus abit, eò puriorem reddi; Quasi liquores in corpore nostro, non coctione, & caloris vi purificentur, sed sicuti exterius in inanimatis accidit, per filtra, arenas, ac lapides attequantur. Nos verò, qui mechanica à naturalibus, meraquè naturalia ab animi ijs longe distare, arbitramur, hæc minimè concedimus, & innati caloris vi omnia concoqui, omnia purificari in animato corpore, censemus: insinuata autem longior via nil ad coctionem simpliciter conducet, cum per vasa ex angua, frigidaquè, vt sunt lactea, propè partem corporis frigidiorè, nempe posteriora, & longè à calidis visceribus sic fieret incoctus. Sed &, si allata aliquid valerent exempla, vbi absorbentes arene, vbi

Pecqueti. ac  
Bartholini.  
vñs lacte  
tineri, affi  
gnatus per  
Aringium.

Bartholin.  
responsionis  
satis sit.

Alia Bar.  
thol. respon  
sio dicitur.

proxima emundatoria, quæ lacteis superfluentes facces acceptent?

Vfus à Ri-  
olano aliter  
resoluitur.

Riolanus, sat habens refellere iactatam à Pecqueto sanguificationem, ac supponens, non tamen concedens, per illum thoracicum tubulum chylum in axillarem venam pro parte deportari, quasi diuinando, ac instar Aruspicum coniiciendo, varios vsus dictæ chyli deductioni in prima sua responsione ad *Exper. nou.* Pecqueti assignauit; quorum primus est, vt hæc chyli substantia, sanguini addita, sit incrassatio, & quædam veluti remora ipsius, ne nimis præcipitanter fluat in ab eo admixta ipsius circulatione: Sed (remisso pro nunc ad sequentem Librum circulationes subiecto) hic primus vsus videtur abijciendus: quia, vt omnes harum Lactearum fautores vno ore prædicant, chylus, siue succus, qui per eas ducitur, est valde tenuis, & aquosus, ita ut facile omnis euanescat lactea crassities, solaquæ serositas sæpè remaneat. Adde, & per ipsosmet eadem succo tenuissimam lympham, vt aiunt, à iecore in eadem vasa, expressam, commisceri: Ergo hoc non erit sanguinem crassescere, sed imò illum attenuare, & magis fluidum reddere.

Ad primum  
digo respon-  
dēt.

Respondetur  
ad secundū.

Eadem nu-  
tritionis, &  
generationis  
materia.

Obiectio.

Tellitur.  
Generatio  
non ex recte  
mentoso, sed  
ex puriori sa-  
guine fit.

Alter vsus est, vt sic forsan diuersarum partium, ossium scilicet, medullarum &c. nutritioni chylus ille inseruiat: Sed & hic reiiciendus: vnumquodque enim nutritur eo, ex quo est: eadem namque est nutritionis, & generationis materia: Sed hæc partes ex Aristot. omnes formantur ex sanguine, ex Galeno verò partim ex sanguine partim ex semine: chylus autem acc sanguis est, nec semen: ergo nec ad nutritionem aptus. Hic obstat, & dicent, sanguinem menstruum excrementosum, & frigidiorē esse, ideoquē non inconuenire, eas partes nutriti etiam sanguine chylo admixto: Sed respondetur, factus generationem non ex excrementoso, sed ex puriori sanguine fieri: Argumento est, vt plurimum ingrauidationes sequi, cessantibus menstruis, & corpore ab ipsis expurgato, vt notant. *Hippasr. lib. de nat. pne. num. 7.*, & *Arist. 7. de bist. anim. cap. 2.* cum alioqui, si, menstruis aduenientibus, generatio incidat, morboſi fœtus gignantur; Et ob id alias in Sacris literis punitione dignus erat, & pro polluto habebatur, qui ad menstruatam mulierem accedebat. Addatur his, medullas, ossa, membranas, ac similia, vt dictum est, & Galenus docet, ex spermate fieri, quod adhuc sanguine purius est: ergo non seroso chylo inficiendus sanguis pro illorum enutritione, sed imò vterius coquendus, ac alterandus, non attenuandus, ac diluendus, sed pro ossibus incrassandus magis est, vt probe elicit *Gal. lib. 1. de natur. facul. 10.* Amplius: sanguis ex diuersis partibus tenuibus, crassis, calidis, ac frigidis gaudet, & ex quatuor humoribus constat, ita ut quælibet pars, quod sibi magis simile est, ac familiarē, eligere, trahere, & sibi agglutinare possit. Tandem inutilis est hæc admixtio post hepatis coctionem: sufficiebat enim, & satius erat, hanc tenuiorem partem simul cum reliquo in iecore concoqui, ac misceri, ita ut totum ex naturæ dispositione infra in coctione subſisteret, si ea pro corporis vtili opus erat; absque quod probè prius coqueretur

parte,

pars, & inde crudo superaddito, efficeretur crudior: huiusmodi autem frustraneos circuitus Natura sagax, non admittit. Sed & de huiusmodi vsu ablegando abundè disputabitur circa finem Libri tertij, nempe cap. 13.

Tertius vsus, à Riolano propositus, est pro generatione, & reparatione adipis per vniuersum corpus parsi; præcipuè circa cor: Verùm & hic visus abigendus est: Adeps enim, suè pinguedo non ex chylo, frigidusq; succo instauratur, ac gignitur, sed ex puriori, oleagineaque sanguinis parte; cuius signum, non pinguescere eos, qui crassis, & frigidioribus alimentis, sed qui exchimis, & copiosi alimentitij succi cibis nutriuntur; itaut adeps non ex excrementoso, sed ex superfluo vltimi alimenti consistat: vnde *Arist. lib. 2. de part. anim. cap. 5.* adipem definit esse sanguinem concoctum per bonitatem nutriendi. Nec obstat, quod otiosi, non qui exercentur validè, pinguescunt: quia dicitur, quod sicuti nimius motus non solum pinguedinis generationem impedit, sed & extenuat, ac dissoluendo pinguedinem absumit; ita nimia quies non solum non pinguefacit, sed & malum habitum, & cacochimiam parat: quare & in mediocritate stat adipis bonum. Alioqui mediocre otium eo modo pinguedinis generationi, quæ plethoræ, fauet; non scilicet quia refrigerat, sed quia parum digerit; & superflua non absumit. Insuper nec ex facili concretione, seu congelatione, illius substantiæ arguitur frigiditas: nam & oleum, & sanguis facillimè concresecunt, & citius quam pituita, ac serum, quæ à solo magno frigore congelantur; & tamen his ea omnes cauidiora esse proculdubio esse fatebuntur: Concretio enim non semper à frigiditatis excessu, sed à crassitie, & consistentiæ aptitudine nascitur (nam ab humidi euaporatione ob calorem facili, iunctis fibris, in sanguine euenit ex *Arist. cit. lib. de part. anim. cap. 4.*) cum ex altera facillimè, & olei, & adipis flammescencia, ac igneitas, suæ substantiæ temperiem arguat: Vnumquodq; autem non ex contrario, sed ex simili gignitur, aliturquè. Et sic *Arist. loc. sup. cit. scilicet cap. 5.* dicit, quod pinguedo ijs animalibus deest, quibus sanguis non adest, & quod pingue commune ignis, & aeris est. Quare non ex chylo, sed ex benè cocto sanguine gignitur, & nutritur adeps; consistitquè ex eo, quod in pulmam quidam animalis non absumitur, sed concoctionis, alimentiq; bonitate præditum est. Et sic *Gal. lib. 16. de vsu part. cap. 2.* pinguedinem gigni, ait, ex sanguinis parte pinguiore per tennes venas effusa.

Quartus vsus iuxta Riolanum est, vt ex chylo fibræ sanguinis generentur, quæ ipsius consistentiam, & remotionem adiuuant, & quarum causa facili concresecit, vt *cit. cap. 4. apud Arist.* legitur. Verùm & hic ab additione aquosioris, & tenuioris chyli non comparatur: nam, vt ibidem legimus, Sanguis, quod dilutior, eò frigidior est: qui autem terrenus, nimirum coit. cum humor euaporatur: fibræ autem illæ terræ sunt opificium.) Et inferiùs: Sanguis, fibris detractis incongelabilis

Respondetur ad tertium vsu.

Pinguedo non ex chylo sed ex sanguine gignitur aliturq;

Tollitur quædam obstitio.

Quomodo mediocre otium pinguedi fauet.

Alia obstitio soluitur

Concretio non à frigiditate, sed à crassitie, & humidi vaporatone accidit non tardè

Pingue commune ignis & aeris.

Respondetur ad quartum vsu Riolani, & rejicitur.



Sanguinis fl.  
bus ex cras-  
siori chylo in  
hepate effor-  
matur.

labilis manet: fibrarum enim natura terrena est.) Quare rationabi-  
lius est, eas non ex dilutioni, sed ex chyli crassiori parte efformari in  
hepate; non quidem quod hoc, vel ventriculus de propria substantia  
aliquid sanguini tribuat; sed quod secur ad talem substantiæ consisten-  
tiam eum reducat: Nec enim fibræ sanguini exteriori, ac per accidens,  
sed intrinsecè, & per se in sua generatione obueniunt, idquæ ab hepa-  
tis natura, quæ verè sanguinea est; & quod in se habet insitum, super-  
fluo suo immutato alimento, nempe sanguini, liberaliter impertit.

Respondetur  
ad quintum  
vsum Biola-  
m.

Quintus vsus, ab eo commemoratus est, ut sanguis crassior factus, &  
instar fermenti acidior, ad cor delatus; & inibi inhærens, veluti pro fer-  
mento inferuiat ad elaborationem sanguinis arteriosi: Sed & hic rursus  
dicere possumus, sanguinem ex illius permixtione chyli non quidem  
crassiorem, sed tenuiorem, & aquosorem euasurum esse, & ideo non  
magis cordi affigendum, quàm reliquum, fore: Sed nec aciditas, aut  
crassities addita quicquam possent coctioni prodesse; cum potius sua  
qualitate, & ineptitudine noceant: Acor enim frigiditatem arguit;  
coctio autem à calore fit. Sic & crassities magis actioni resistet; quàm  
tenuitas.

Respondetur  
ad sextum.

Sextus ibidem expressus vsus est, ut lacteus hic succus nutritioni in-  
feruiat glandularum colli, axillæ, ac faucium, sicuti inferius inguinum,  
pubis lumborum, mesenterij; ipsius: Sed iam supra hic vsus; qui cum  
secundo, & tertio coincidit reiectus est: ibi enim vidimus, non ex chylo,  
sed ex sanguine eas partes nutriri, & ex eodem pinguedinem procreari.  
Sed & cur per sinistram tantum Spinæ partem Lactes ferat, & in sini-  
stram axillarem solam intrudatur hic succus, si harum partium, quæ  
æqualiter in utraque consistunt, nutritioni deferuire deberet? mani-  
festum autem est, quantum natura æquilibrij partium Zelous sit; quæ in  
cunctis alijs distribuendis vasis, vel in medio, aut paululum procul trun-  
cum, qui utròque ramulos mittat, vel paria vasa hinc, & hinc effor-  
mauit, & ad iusticiam distribuit.

Alij duos vsus  
proponunt,  
de refellun-  
tur.

Alios alij vsus imaginati sunt, quorum vnus Pecqueti, & Bartholini  
est, ut ad mammas chylus ducatur pro generatione lactis: viam autem  
adhuc latere fatentur. Alter Caroli le Noble, ut sanguis arterialis, pi-  
tuitosior redditus, pro variarum partium frigidarum nutritione melius  
deferuiat. Et utriusque vsus inanes quoque se nobis offerunt. Pri-  
mus, quia, si mammas inferuire debuisset, non vnicus, nec in sinistram  
tantum axillarem ingrediens à Natura efformatus fuisset: nec enim sic  
facile ab vno latere in aliud sunt sanguinis, aut aliorum succorum flu-  
xiones cum potius videantur per directum eiusdem lateris, & natura-  
les, & artificiales rectè fieri, prout experimentis plurimis confirmatum  
tenet Gal. lib. de ven. sect. cap. 15. & 16. Item vel ex sanguine, vel ex  
chylo lac gignitur. Si ex sanguine, frustra chylus expetitur. Si ex  
chylo, alia inferio debet ad mammas ipsas explorari, & inueniri;  
non autem ad superiora, & in venam sanguine plenam impingi, ut  
inde

Chylum ist-  
hoc ad mam-  
mas non pro-  
ducere proba-  
tur.

Non facile  
ab vno late-  
re in aliud  
sunt fluxio-  
nes.

Si lac ex san-  
guine frustra  
chylus expet-  
itur.

inde iterum descenderet, & sanguine infectus ad mammas porrigeretur. Sed præter hæc lac ex chylo non produci, in tertio libro plene demonstrabitur. Vterius neque ad mammas dictam translationem chyli fieri, testantur armenta, brutaquæ ferè omnia, quæ mammas in abdominis fundo implantatas possident, ad quas ideo non peruenient dictæ lacteæ thoracicæ in canibus præcipuè, & alijs pecoribus inuentatæ, & experientijs facilius expositæ. Tandem ex ipsorum Inuentorum doctrina lacteus ille succus, in subclauias perueniens, non ulterius progreditur ad axillas, sed cum sanguine in Cor, coquendus, & sanguificandus, vt circulationis volunt suæ leges, quæ aliter infringere non omnino.

Secundus quoque in cassum supponitur vsus: quia frustra natura expectauisset arteriosum sanguinem a Corde omnium membrorum calidissimo attenuari, delucidari, & spiritibus infarciri, si debuisset, chylo propè Cor addito pituitosior fieri, infrigidari, & vt sic dicam conspurcari. Secundò quia, eo dato, nec debuisset lacteus tubulus in venam sanguineam, vteriolem, ac lateralem se exonerare, sed vel in arteriam, vel in arteriarum fontem Cor. Tertio quia nihilominus arteriosi sanguinis natura calidior, & spirituosissima cernitur, qualis ad sui vsum requiritur. Quarto quia ad corporis nutritionem ex Hippocratis, & Galeni doctrina non expeditur arterialis, sed venalis sanguis; Quorum auctoritati illud attestatur, quod solida, crassa, ac duplici tunica constant arteriæ, ne facile euaporent, vt innuit *Gal. lib. 6. de vsu part. 10.* Imò adeò Antiquis arteriæ ad nutritionem deferendam ineptæ videbantur, vt aliqui crederent, probarentquæ, in ijs sanguinem non contineri contra quos *Gal. libellum conscripsit.* Sed & de hoc in sequenti vberius disseretur libro.

Concludatur ergo Caput cum hoc, quod nulli excogitato vsui hæc chyli promotio esse potest; præterquàm si dicamus, in omnimoda iecoris obstructione, vel superioris Cauæ occlusionem, vel interceptionem posse naturam hoc itinerulo aliquid chyli ad Cor trahere, quò animal adhuc per pauculos dies viuere posset. Eo tamen casu, talique tempore, vel minimum assumet cibum animal, vel assumptum reuomet, aut chylosum adhuc plurima pro parte ad vnum reddet, & sic breui tabidum corpus fiet, citò finiendum: Longissimè enim abest a sanguificandi chyli opere Cor, cui per continentem diastolem, ac systolem, succum in suis ventriculis diu continere coquendum, prout coctionis natura desiderat, malè conceditur: inanis autem est cogitatio, sanguinem per continuam circulationem toties illuc redire, donec tandem concoquatur: quia si sic esset, & homo in continua agitatione esset, & interim incoctus sanguis ad corpus alendum duceretur: Sed quod magis refert, cum pueri, & rustici quibuslibet quatuor, vel quinque saltè horis cibum capient, circulatio autem ex aliquorum opinione bis in die solummodò, vel (vt verius puto, & latius in secundo monstrabitur libro) potius nullo

Et armenta, & brutis pluribus mammas in fundo abdominis.

Circulationis leges huius translationi contrariæ.

Chylom pro arterioso sanguine incrassando non expectari probatur.

Ad nutritionem corporis non arterialis, sed venalis sanguis desideratur.

In iecoris obstructione &c. aliquid chyli periuicinis ad Cor trahi conceditur.

Longissimè abest a sanguificandi chyli opere Cor.

nullo modo fiat, semper in cruditate ob nouam additam materiam sanguis maneret. Quam ob rem, si nulli vsui potest similis chyli deductio satisfacere, neque ipsam fieri, putandum.

## CAPVT VNDECIMVM.

*Quod nullo rationabili modo illuc fiat chyli traductio ad Cor, inductione probatur; Et primò non per impulsione.*

*Siue Receptaculum, & Pancreas idè sint, siue nò, nò curat Auditor.*

*Chylum ex se non mouet, probatur.*

*Nec mouetur per laetitudinem ab alio.*

*Intestina non impellunt in laetitudinem ratio prima.*

*Ratio secunda quod aliquid abiecit, vel quia grauior, vel quia agitur ab eo.*

**N**unc quod nullo modo per suppositos canales fieri possit ordinata, & naturalis chyli traductio ad superiora, siue ad Cor, probandum. Et hoc fiat à sufficienti partium enumeratione sic: Si chylus debet ab intestinis in pancreas, & ab hoc per thoracicum tubulum in axillarem venam transferri (hic verò velim adnotari, quod etiam si receptaculum Pecquetianum differat à pancreate Veterum, de eo nihilominus quoque intelliguntur omnia argumenta: nihil enim isthæc moror siue vnum, & idem, siue aliud sit; hancquè distinctionem ijs, qui Anatomiam propria exercent manu, & proprijs oculis versant, remitto), vel fiet, quod ex se chylus moueatur, vel ab alio. Non primo, nec secundo modo: ergo nec transfertur. Non, primo: quia, si ex se moueretur, id esset, vel quia viuens, vel quia mixtum naturale: Sed non est viuens: quia nullus liquor viuit, saltem animali vita ob organorum deficientiam; Nec vix mixtum naturale hic mouetur; quia sic solum ad infra moueretur, vt grauis, non autem ad superiora, vel ad latera, vt in casu requiritur: Ergo ex se non mouetur.

Non secundo: quia ad hoc requiritur, vt vel trahatur, vel pellatur, vel simul, & semel vtroque modo adigatur: Sed nullum est reperire proportionatum attrahens, vel impellens: Ergo nec sic poterit moueri. Hæc verò probabuntur, si consideremus terminum à quo, ter minum ad quem, & medium per quod: manifestum enim est, quod impellens, si adest, debet esse, vbi incipit motus, siue in termino, vnde fit progressio; attrahens verò, vbi definit, siue in termino, ad quem peruenit; vel vtrumque in medijs partibus. Cum ergo ab intestinis chylus debeat peruenire in axillares venas, fit clarum, quod impellens debet esse in intestinis, & attrahens in axillaribus, vel vtrumque in dictis vasculis laetis, vel Receptaculo: Sed nec ab illis fiet pulsio, nec ab alijs trahio, nec ab his vtrunq; Intestina non impellunt: quia quæ sunt ab aliquo per impulsum fluxiones, sunt per continuitatem cavitatis alicuius, & per determinatum vacuum, Intestinorum expulsionibus patet latus aditus, & cavitatis continuatio ad sedem: ergo non in carca oscula vasorum fiet impulsio. Secundò quidquid aliquid à se abiecit, vel quia ab eo grauiatur, vel quia molestatur, seu angitur: Intestina autem, vbi chylo exsatiata sunt, vel grauantur, seu molestantur à tota mole, & sic à totius chyli corpore se vnicò motu exonerabunt; quare non per oscula tenuia,

in quæ crassa introire nec possunt, nec debent, cum fæces è corpore pel-  
lere, non in corpus intrudere fas sit; sed per suam latam cauitatem, &  
sic per aluum: Vel molestantur, seu vellicantur ab ipsius parte, & tunc  
vel à crassiore, & fæcali, vel à tenuiori, & substantifica; Non ab hac,  
quia naturæ ipsorum familiaris est, & assimilata multum, altera verò  
dissimilis: Si verò ab illa, nec introire in oscula valet, nec debet: Ergo  
ab intestinis ipsis non pellitur chylus. Et quia posset quis dicere, ab in-  
testinis secerni fæces per aluum, & inde alimentosa per dicta forami-  
nula; his addito, nec ab intestinis posse tenuia à crassis secerni, cum gra-  
cilia nullas habeant cellulas ad selecta retinendum; crassa autem pau-  
cissimas in se habeant venularum mesentericarum, siuè lactearum exi-  
turas. Tertiò vbi partes sese exonerare, & expellere aliquid à se volunt,  
in se constringuntur, vt patet in exterioribus, & in naturalibus tum alui,  
tum lotij excretionibus, & vt ipse affirmat Pecquetus, qui *cap. 1. differt.*  
*anatom.* statuit, constrictionem à se sibi obuenire, dilatationem ab alio:  
Vbi vero partes in se constringuntur, etiam pori, & meatus in earum  
corpore insiti clauduntur: ergo non in lactearum oscilla, se restringen-  
tibus intestinis pelletur. Quarto si pars se ab aliquo grauante, aut ve-  
xante liberare vult, vbi aliquid non impediât, per commodiorem du-  
ctum se se liberabit: Commodior autem ad interaneorum vacuationem  
est via ad aluum, seu sedem ducens: Ergo illuc, non in lacteas  
pellent.

Ratio tertia.  
Vbi partes  
expellunt in  
se constringuntur.

Ratio quarta.  
Si pars se  
exonerat, per  
commodio-  
rem viam  
id facit.

Pecqueti de  
chylj motu  
sententia.

Hic verò nobis subsistendum est: Nam Pecquetus, ab omnium hu-  
cufque Medicorum placitis libenter discedens, modum, quo chylus,  
à ventriculo in intestina delapsus, in dicta vasa abeat, indagare conten-  
dens, omnem causam dictæ permeationis reflexit in pressionem factam  
à Respiratione, per quam musculorum abdominis se constringentium  
ope continenter videmus, vicissim comprimi, & eleuari abdomen sicuti,  
& à iecoris pistilli vicem gerentis succussione, prout superius diximus  
*cap. 4.* Cui plures ex Neotericis, sanguinis circulationi fauentibus, sub-  
scripsere. Quare putat, ex dicta compressione à ventriculo in intestina,  
ab his in ora lactearum, à lacteis in receptaculum, ac tandem per thora-  
cicum tubulum in axillares venas chylum exprimi; assertq; exemplum  
puerorum ludentium, qui ferentes anguillæ spoliū aqua plenum, ipso  
prius minutissimis foraminulis acu impictis circum circa peruiō reddito,  
illud postea premitantes, in tenuissimas scaturigines aquam eiāculant:  
Sed leuis nimium est hæc sententia: Neque enim benè conuenit exem-  
plum inanimati vasis alteri animato, & cui à Natura datæ sunt omnes  
facultates nutriticis famulæ, attrahitrix, retentrix, concoctrix, & expul-  
trix: siquidem idem est, hac si gressus animalium, vel aliorum eorum  
motuum causam à lapidis projectione, vrinæ excretionem à clysteris  
pulsione venaremur. Ad quod propositum *Gal. lib. an sanguis in art. sit*  
*cap. 8.* volens probare, spiritum in arterias per attractionem permeare  
hæc verba profert: Est enim hoc ad naturam multò accommodatius,

Refellitur.  
Exemplum  
inanimati va-  
sis animato  
non compe-  
tit.

Exemplo plan-  
tarum pro-  
batum, non  
moneri chy-  
lum ex com-  
pressione, ra-  
tio prima.

Diaphragma  
& musculi  
ad anum pro-  
pellunt.

Altera ad idē  
ratio ab im-  
possibilit.

Ratio tertia  
à variis simi-

„ ut ita opinemur, quàm ut per eas, tamquam per inanimata corpora  
„ ferri spiritum existimemus: viuens enim à non viuente differt, non  
„ quod mole corporis excellat, sed quod facultatis sit particeps. ) Quod  
si plantis omnibus datum est, ut alimentum à terra per suas radices  
citra impulsum, aut alium sensibilem externum motum fugant, attra-  
hant, & vsque ad cacumina ferant, ad quid in animali, in quo perfectior  
natura est, huiusmodi impellendi modum violentum, & extraneum sup-  
ponere, & imaginari? tamquam vascula in eo vita, sensu, & motu ca-  
reant, sed pro sola seruiant cavitae.

Cæterum musculi abdominis omnes superfluum, seu excremento-  
rum per aluum excernendorum gratia extant, ut bene notat *Gal. lib. 5.  
de usu part. cap. 14.* in principio. Diaphragmatis verò secundarius usus  
(primus enim ad respirationem facit), ut idem ait *cap. 15.* ad eundem  
finem est, ut scilicet simul cum musculis totum comprimendo abdomen,  
ad vnum pellantur vniuersa excrementa: propriè namque pulsio ad  
excretionem instituta est, non ad nutritionem.

Sed dato, quod in animali possit dari huiusmodi introtrudendi modus,  
tunc interrogo, an illa imaginata vasorum compressio solummodo tan-  
gat intestina, vt ab ijs in lacteas tenuior chyli succus impellatur, & sic  
consequenter à subsequente succo alius iam impulsus magis introtruda-  
tur, vsquequò in venæ axillaris sinum perueniat, indequè ad Cor; vel  
primò illic incipit compressio, & subsequitur in glandulis, & lacteis ipsis;  
vel simul in omnibus. Si primo modo, cum cavitates intestinorum conti-  
nua sit, lata, & vsque ad podicem producta, patet, quod vel totus, vel  
plurimus comprimitur chylus ad anum, non autem ad vascula, quæ vix  
sensui patent: Ex eo enim in spolio anguillæ compresso succedit aquæ  
per foraminula eiacula, quia infra occlusum, supra coactum est. Sed  
nec potest hic modus dari: quia ad compressionem stomachi, & abdo-  
minis non solum intestina, sed & mesenterium, & glandulæ simul præ-  
muntur, & ideo quantum illa pellerent, tantum hæc contraherentur.  
Secundus modus nec datur: quia simul & non successiue fit per respira-  
tionem diaphragmatis tensio, abdominis compressio, & musculorum  
motus in toto abdomine. Si tertio, iam non magis valebit compressio  
intestinorum ad impellendum in lacteas, & harum in glandulas, quàm  
ipsarum ad repellendum in intestina. Sed inquirunt, adesse valuu-  
las, quæ admittunt quidem introitum, sed non retrocessum. Respon-  
detur, quod compressio non solum retropellit, sed & impedit admissio-  
nem.

Item vel adsunt illa innumera oscula venarum à Portæ ramis emanan-  
tium, in intestinorum cavitatem hifcentia, ut dicunt Galenus, cæterique  
iam sæpè citati Vesalius, Vallesius, Fallopius &c. vel non. Si primum,  
si detur illa expressio (vt vult Pecquetus) in lacteas, quæ multò minores  
figurantur, multò magis dabitur in alias venas vi sui patentiores. Nec  
valeat dicere, has venas non esse dicatas ad recipiendum, sed potius ad

ferendum

ferendum sanguinem pro alendis intestinis, vel vt alij & Ipse, ad reducendum circulatum sanguinem in Iecur: quia respondetur, si hiant, quod sic sanguinem in cavitatem illorum euomerent, siquæ quotidie externeretur sanguis per anum, quod non accidit, nisi quibusdam paucissimis per intervalla, & præter naturam affectis: ergo signum, eas potius ad sugendum, vel referendum, quàm ad deferendum, esse productas: si autem hoc, cur non impelletur in eas? Si secundum verò, tunc falsitatis arguentur tot celeberrimi Auctores, qui clarissimè attestati sunt, à Portæ venis varias, ac propè innumerabiles venas in intestinorum sinus penetrantes, hiantesq; dispergi, quod dici non debet: quia si in ore duorum, vel trium stat omne verbum, vt sacrae literæ attestantur, vt leges fanciunt, & vt Pecquetus ipse ad rem suam perhibet *lib. de exper. non anato.* cap. 6., multò magis pluribus credendum est.

Quartò si per impulsione, & succussione fieret chyli translatio, sequeretur, quòd non minùs, imò magis multò à comestione tenuiorum ciborum fieret, & tamen è contrasieri videmus: si enim plura olera, & horarij fructus ingerantur, plura excrementa per aluum, & lubrica euacuantur, quàm si crassa alimenta assumantur. Et patet cõsequentià: quia si plus tenuioris chyli adest, plus deberet in dicta foramina introire.

Quintò si dicto modo chylus in lacteas pelleretur, idè esset circa hoc, siuè acciperentur cibi optimi, ac si prauis, & excrementosis: Sed e contra videmus, si comedantur in eadem quantitate cibi, vel optimi succi, vel minimi nutrimenti, quod in ijs pauciora multò fæcalia per anum exhibent, in his longè plura: Ergo signum, per suctionem, seu attractionem ex similitudine, aut congruentia illum distribui. Et consequentià prior probatur: quia si ex compressione impellitur, non magis resistit prauum, quàm probù: sufficit enim, esse similem corpulentia, & substantiæ modù.

Sextò si propter dictam compressionem chylus à stomacho in intestina, & ab his in lacteas pelleretur, nihil quoad stomachum interesset, an hoc, an illud cibarium assumeretur: siquidem nec proba fieret concoctio, nec homogenea substantia esset chylus, sed quod inferiori ventriculi officio esset propinquius, citius, & crudius exiret; quod remotius, tardius, & concoctius: Contrarium tamen experimur: quia chylus, quamuis ex varijs coloribus cibus, ac potibus constet (ni cruditas addit), æqualis tamen, & vnus coloris est, & cibi boni succi, facilisq; coctionis citò descendunt, ventriculumq; liberum relinquunt: prauis verò, & difficilis coctionis, & serius coquuntur, tardiusq; descendunt, vt ad sensum patet, maximè in stomacho imbecillis. Prior autem consequentià est manifesta: quia, cum continens sit causa, continens quoque daretur effectus; est autem continens compressio à respiratione, qualis à Pecqueto supponitur, & sic continens expressio succi.

Neque satisfacit ab Eodem ad id assignata solutio, quod nempe non inconuenit, cruda aliquando à ventriculo exire, vt videre licet in assumptis diureticis, purgantibusq; quæ aliquando cum eodem odore, saporeuè

Ratio quarta  
ab absurdo  
insequente.

Ratio quinta  
ab eukis cõ-  
trario.

Ratio sexta,  
ab inconue-  
nientibus.

Tollitur Pec-  
queti obiecc-  
tio.



citò exeunt, sicuti & in immodico vini, vel aquæ potu, & in esu leguminum, vuar, & aliorum in quibus cortices, & semina incocta exeunt. Nam dicitur, aliud esse, tractare de ventriculo sanas obtunde adiones, & cibis tum ob quantitatem, tum ob qualitatem coctilibus; aliud verò de ventriculo læso, de medicamentis irritantibus, violentisq; vel rebus ob copiam, aut ob earum naturam incoctilibus: Si enim de primis agatur, è ventriculo nihil exire debet; aut solet antè perfectam coctionem: (intellige tamen per pylorum: quia potest interim, dum coctio fit, per venulas à Portæ ramis in tunicas ventriculi penetrantes, ac dehiscences aliquid tenuioris, & delicatioris succi à iecore trahi, vt notat Faloppius pag. 161. quod à Gal. Vesall., & alijs Medicinæ Doctoribus desumpsit.) Si verò de secundis, clarum est, cum vis infertur naturæ, vel assumpta ob exuperantiâ, aut ob eorum naturam coctionis incapacia sunt, quod vel non tentabitur coctio, sed sola actiatio, vt in pharmacis fiet; vel non perficietur in cæteris: Argumentum verò nostrum consistit in coctione ciborum, qui vel faciliè, vel difficilè coquuntur. Ergo cum non adsit proportio, nec similitudo de ijs ad hæc, nec valet obiectio: Quæ enim proportio inter alimentum, & medicamentum? & quæ similitudo in lapidibus ad panes; innucleis ad cibos alimentosos? nec propterea tamen, quæ coctionem fugiunt (dummodò naturæ vim non inferant) ante cæterorum coctionem exhibunt.

Inter alimē-  
tum, & me-  
dicamentum  
non est pro-  
portio.

Ratio sepi-  
mo ab ineffi-  
cacia causæ.

Sed &, si expressione talis fieret chyli traductio, neque hæc opera respirationi demandanda esset, vt Pecquetus adinuenit: nam nec tanta sit musculorum thoracem, abdomenq; mouentium contractio, nec tantus diaphragmatis ad inferiora conatus in respiratione, vt posset sit pulsionis motus à lacteis concitari; maximè cum compressioni obfistant. multæ mesenterij glandulæ, & hic sit inter earum præcipuos vsus, vt docet Falop. pag. 176. Nec validæ ventris compressioni, quæ sit in excernendis sæcibus alui, & vrinæ demandari potest: quia illæ tum breuissimæ sunt, tum quibusdam rarissimæ, itaut (quicquid sit de mixtu, in quo levis, breuissq; sit compressio) semel in die tantum egeratur in plurimis, & alijs non nisi alternis diebus, ac per totam longissimam noctem in plerisque, nec egestio, nec mixtio fiat; tum diætæ excretionis natura sua succedunt secretioni, digestionique. Nec tandem arteriarum pulsationi, vt quidam, & ipse Pecquetus, annuere videtur attribuenda esset: quia primò hæc pulsatio adeò levis motus est, vt leuitas ingenij fit, huic tale opus adscribere; & secundò adeò vniuersalis, vt paucae venæ sint, quæ arteriam comitem non habeant, vnde levis compressio cum sit per totam longitudinem venarum, ac tam supra, quàm infra, & eodem tempore, non potest animo concipi succi expressio ad partem determinatam, & magis huc, quàm illuc. Ergo non posset assignari diætæ impulsio, nisi fibris; quæ tamen, vt dictum est, per propriam cavitatem, non per oscula in ipsam hiantia. Restat igitur, vt pronunciemus, chyli traductionem non impulsione, nec compressione fieri.

Experi-

## CAPVT VNDECIMVM. 39

Experimentum verò, quo vitur Pecquetus ad probandam impulsio-  
nem chyli supradictam prorsus inualidum est: dum enim dicit, quod liga-  
to mesenterio, & lacteis, detumescunt illæ versus superiora, intumescunt  
autem versus intestina, ex hoc non quidem suffocatur, vt ait ipse, sed imò  
magis probatur attractio: quid enim impellens trans ligaturam poterit  
per hanc autem non impeditur, sed magis incitatur attractio: ideo ligato  
brachio, venas & citra, & ultra intumescere, videmus. Quod autem la-  
ctæ superius detumescant, non mirum in languente, se torquente ani-  
mali hæc fieri: si enim, incisa vena, & fluente sanguine, vbi lypothimia  
accidit, sanguinem actu fluente sisti cernimus, quid de non incisa dicen-  
dum? omnia enim tunc ad principem rapiuntur partem. Idem, & de  
pulsione dicendum: magnum enim non est, in valida totius concussione,  
anxiosa ac forti expiratione, & varia ob angorem dimotione corporis,  
fieri ab intestinis chylo plenis aliquam expressionem in dicta vasa; quod  
non est dicendum de animali quieto, humiliter spirante, & naturaliter se  
habente. Pulsio igitur illa violenta est, & præter naturam.

Respondens  
ad Pecqueti  
experimenti  
consecram.

## CAPVT DVODECIMVM.

*Chyli introductio in lacteam thoracicam neque attractione fit naturaliter.*

**E**X his cum pateat, non posse fieri chyli motum neque per impulsio-  
nem, neq; per compressionem, seu expressionem, reliquum est, vt  
ponamus, eum attractione, & suctione fieri, vt hinc retrò semper à Me-  
dicis edoctum, & creditum est. Sic dixit Hippocr. lib. de carn. num. 12.  
„ Etenim venæ ex ventre, ac intestinis, in quæ cibi, ac potus colligun-  
„ tur, postquam hi fuerint calfacti, tenuissimum, ac liquidissimum tra-  
„ hunt; crassissimum autem, & sæx isthic relinquitur, computrescit, &  
„ fit stercus in inferioribus intestinis. ) Inde nu. 13. subdit. Tenuissimum  
„ verò trahunt venæ ex ventre, & intestinis, quæ supra ieiunum inte-  
„ stinum existunt, & atque hoc calfactis iam cibis. ) Sic Gal. 4. de usu  
„ part. 19. hæc habet: Condensatum est in orbem omne intestinum in-  
„ numerabili quadam multitudine orificiorum intrò peruenientium, à  
„ quibus rapitur sursum quod ex prætereunte alimento vile est. ) Sic  
„ Vesal. lib. 3. cap. 5. idem testatur propè finem dicens: Cæterum reli-  
„ quæ omnes Portæ propagines in ventriculum, & intestina digestæ  
„ duplici nomine extruuntur, partim vt illis nutrimentū subministrant,  
„ partim vt suis finibus, & oculis in ventriculum, & intestina hianti-  
„ bus confectum à ventriculo cibum ex ipso, ac intestinis exsurgant, at-  
„ que ad iecur, tanquam concoctionis officinam toti humano corpori  
„ communem deferant. ) Et rursus ibidem: Dein Portæ vena ab alijs  
„ etiam iecoris manus nuncupatur, quod iecur ea ad elaborati in ventri-  
„ culo cibi attractionem tanquam manu vtatur. ) Vt alios per multos  
idem enunciantes præteream.

Quorum at-  
trahendi mo-  
di.

Fit autem attractio (ni decipiar) quatuor modis, quorum primus est ex vi vacui; Et hoc modo per fistulam clisteris attrahitur succus, per auenam potus, per dilatationem peccoris, & follis trahitur, aer. Secundus ex similitudine substantiæ provenit, & sic magnes trahit ferrum, adamas paleam, agaricus pituitam. (Dico autem similitudinē, non identitatē; nec enim chalibis chalibē, nec ferrū attrahit ferrum, sed quod potentius est, sibi simile ad se allicit, sicuti ē contra sibi contrarium pellit.) Tertius est ex vi apprehensionis, per quam ad sui motum aliud apprehensum trahitur. Quartus verò ex necessitate suæ vitæ durationis, & alimenti eo modo, quo lychnus accensus oleum fugit, plantaque humorem a terra sumit, ut ex ijs alantur. Vno igitur istorum modorum

Nullo horū  
modorum si  
chylī per la-  
teas in axil-  
larem trac-  
tio in sanā.

neceffe est, ut chylus attrahatur per lacteas, si trahi debet: Sed nullo horum in axillarem venam per tubum thoracicum potest allici, nisi necessitati summæ tempore, quando scilicet via ordinaria icoris penitus occlusa, vel interclusa est; vel per inædiam, aut summam hæmorrhagiam dissolutis partibus venæ fuguntur vndique: Ergo nec attractione fiet per talem viam chyli traductio naturaliter. Et primò non ex vi vacui: quia si ex axillari aliunde fiat succio, ita ut & ipsa pro sui reparatione succi, aliunde debeat fugere, lata via est, per quam, vel attrahet à Caua, à qua suam sumpsit originem, & in qua sanguinis promptuarium est; vel, si hæc ab illa suxerit, eadem à tot ramis, qui sui ipsius germina sunt, & sanguine scatent, attrahet; absque quod per tenuia spiracula, & quibus valvula adsit, miserum, & aquosum allicit succum; nisi, ut diximus maxima sub sit necessitas, quæ extra nostrum casum est. Secundò

Nō ex simi-  
litudine su-  
bstantiæ.

non ex similitudine substantiæ: quæ enim similitudo venæ, quæ membranosum corpus est sanguinem natura sua continens, conseruans, perficiens, cum chylo considerari potest? quæ similitudo solidi cum liquore, continentis cum contento, agentis cum passio? Tertio non ex apprehensione: quia quæ fluunt tenuia, apprehendi non possunt: apprehenduntur enim, quæ corpulenta sunt, quæ verò tenuiter fluunt, præterfluunt apprehendentem. Quarto nec ex alimenti necessitate: quia

Non ex ne-  
cessitate ali-  
menti.

vena axillaris propè Cavam est, qua sanguine plena, (ut in homine sano est) semper poterit succum sibi attrahere similiorem, nempe sanguinem; vel si fieret circulatio, ut Pecquetus sentit, ipsi idem ab alijs suggereretur sanguis. Quod si, ut diximus, venæ inanitæ sint, ut in copiosissima sanguinis missione, vel eiusdem immodico fluxu; vel si nil Cava à Iecore obstructo suggeratur, tunc quidem aliquid inde attrahi poterit; sed casus hic extra nostrum propositum ordinariæ cibrationis in homine salubriter degente cadit. De hoc enim salubri statu intelligimus, cum nil chyli per talem semitam ad Cor deduci, pronunciamus.

Eadem de  
Receptaculo  
vigent.

Idem de Receptaculo dicendum: ad quid enim ipsum trahere, dicendum est, cum corpus glandosum aptum potius ad recipiendum sit, quam ad trahendum? imbecillitæ namque huiusmodi partes sunt, & excrementitij fluxionibus nimis obnoxia, ut ex Hippocrate & Galieno habemus. Et dato,

## CAPVT DVODECIMVM. 61

dato, quod possit ob sui alimoniam tradere, cum possit succum coctum à lecore, & Caua sugere, ad quid ab intestinis chylum incoctum? Exsugat autem, quantum ei libet: at vbi plus exfuxerit, quæ pars ipsum, nisi vel renes, vel lecur sit, subleuabit? An putandum, quod à se superflua pulsurum sit? Id verò partis spongiosa, mollis, & hebes natura excusa. De compressione autem, quantum, quid, & quomodo valeat, fat supra dictum est cap. precedenti.

Igitur cum vniuersum corpus à parte post partem sanguinem in sui alimoniam à lecore, quod huic succo præsidet, quærat, & ipso consentiente trahat, sit, vt ipsum per suos destinatos canales à ventriculo, & intestinis attractrice, qua maximè pollet, facultate chylosum succum alliciat, qui in lecur assumptus, sanguis fit, & corpori instaurando deseruit,

Vidit autem Pecquetus, & ipse, attractionem chyli in lacteas non dari thoracicas, & ideo ad pulsiorem se extorserat: sed inane est diffugium; quia minus ipsa datur, vt in præcedenti capite dictum est.

Contorquet hic se Bartholinus, & dubius, an tractione, vel pulsione fiat dicta chyli traductio, respondet, eodem modo fieri, quo alij putarunt, per pancreas ire ad lecur. Sed vana est hæc responsio: quia nulla datur proportio: hic enim lecur est, quod à Natura inter præcipuas corporis partes fabrefactum, vberimq; natiuo calore donatum, attrahendi magno pollet efficacia; & hoc aptè perficit per proprios canales, qui & ipsi varijs fibris gaudentes, natiuoq; spiritu affluentes, & tractionem, & suctionem prolequuntur, non omnium indifferenter, sed sibi familiarium, & magis proportionatarum chyli partium; Id quod non more sanguisugarum, se dilatando, venæ assequuntur, sed suis, vt dixi, fibris, vt plantæ à terra, succum sibi amicum immotæ feræ eleuant, & sursum ferunt: At glandulæ omnes ad valdè trahendum ineptæ, tubulus verò lacteus nulli visceri inferitur, sed in alias radicatur venas, quæ magis axillis, & lacertis communicant, quàm Cordi, ad quod vt perueniant, ipsi retrogrediendum est ad suam originem.

Quidam forsan ad Cordis tractionem confugiet: sed malè, cum huic viæ, ductusue ad attractionem latissimi sint venæ, ac arteriæ, non lactei riui, qui nec ipsi inferuntur, nec nisi per indirectum, seu transuersum communicant: Ad quid ergo ab his trahat, si potest ab illis, & recta, & affluenter? Nunc igitur ad alia progrediendum.

## CAPVT DECIMVM TERTIVM.

*Chylus in totum per thoracicum tubulum ad Cor ire non potest: Dato autem, quod pro parte, multa absurda sequuntur.*

**D**Ato autem, & non concesso, quod illac posset chylus ad Cor meare, tunc quæro, an totus ducatur, an verò pro parte. Totum dixere Pecquetus, ac Bartholinus, iecori omnino hæmorrhoidum subripientes:

Alij

Verus chyli trahendi modus à iecore.

Bartholini responsio inutilis.

Nulla proportio tractionis lecoris, cum pancreatis, & thoracici tubuli actione

Totum non  
illuc progre-  
di chyli pro-  
batu.

20.

220 5

Alij verò, vt Carolus le Noble Hig moris, Bartholinus in principio, ad alij partem solum tenuiorem per lacteas ad Cor commeari, crassio rem autem ad Iecur, opinati sunt; à quibus non videtur multum dissentire Riolanus; solummodò negans, ob sanguificationem ad Cor ire: Sed nec totus, nec pro parte it, aut debet per lacteas ire: Ergo nec per eas ibit. Quod non totus, probatur ex euidencia rei: quomodo enim sufficere potest vnicus tubulus, & tria vel quatuor foraminula, in axillarem penetrantia, succum illum, qui ab inuicineris ferè venularum osculis, in intestina, & stomachum penetrantibus, excipitur, capere, & ipsi aditum præbere? Respondebunt, quod interim firmatur reliquum in chyli Receptaculo, à quo paulatim postmodum ad superiora repit: At, hoc dato, num illud Receptaculum capax erit totius chyli, qui ventriculum implet? Equidem huiusmodi capacitas respectu illius æmulator meo iudicio eam proportionem, quæ inter murem, & agnum cognoscitur. Iterum respondebunt, quod multis vicibus supplebitur id, quod vnica vice fieri non potest. Ego verò dico, numquid ergo interim, dum Receptaculum vacuatur, chylus in ventriculo moratur, an in intestinis? Si in ventriculo, quomodo hinc ad Receptaculum peruenierit, si nulli meatuli lactei hinc ad illud aperiuntur? Si in intestinis, quomodo tam diu in ipsis cunctabitur chylus, quin ad anum descendat, si præter illorum peristalticum motum, qui contentorum motui dat vitam, cavitatis hic lata est, & viata? Quomodo ergo hæc improprio poterit compensari, nisi dixeris, quod, dum ille tubulus ad superiora vehit, venæ mesentericæ otiantur, vel dum ille, velociter transuehit, hæc omnes commodissime vel sugunt, vel, vt ait Pecquetus, expressum ab intestinis recipiunt? vel non omnes hæc venule, sed tot solum, quot tubulum illum æquant, attrahunt, vel assument? At quis spiritus adeo oculatus rebus his præsidet, vt dum hic mouetur, illic otium adsit; dum hic velocitas, ibi segnities; dum hic tractio, illic retentio subsit? Quæ æqualitas sic ingressi ad egressum, pulsus ad receptum, attracti ad extractum seruabitur? Nonne vna, eademquæ facultas est, quæ cunctis præest, & membra gubernat? Nonne idem succus, idem illius motus, & idem finis, nempe sanguificatio, & alitio? Absit, quod in Naturæ regimine similis improprio, & similia absurda sequantur. Non totus ergo chylus illuc progredietur, sed pars tantum.

Quod nec  
pars chyli li-  
luc progre-  
diatur. In-  
stantia pri-  
ma.

Nunc autem sic insto: An qui per iecur transit, incoctus seruabitur, an verò coquetur? si incoctus, cur tot venularum ambagibus iecur Natura dotauit, vt adhuc hominem, nisi imaginatione, lateat via, qua hinc in Capam veham exeat succus? Et cur, si chylo solum vehendo debebat inservire iecur, illud ex sanguine sic rubicundum Natura formauit, non autem album, veluti ponuntur esse chyli ferri hi noui ductus? Et cur ab eo venam adeo magnam, vt Cava est, produxit, quæ sine vlla intercapedine, sinequæ vllò retenticulo deorsum ad omnia membra abitura, vergit, & sursum alio eandem, antequam Cor ingrediatur, ad septum, &


pericar-

## CAPVT DECIMVM TERTIVM. 63

pericardium ramos emittit? Quis retinebit, ne tunc pars supra trahatur, pars infra labatur? aut si Cor trahit, cur non à Caua inferiori, quæ continua, & eiusdem structuræ, ac latitudinis est, sed tantum à iecore trahet? Si autem hoc impellit, cur non in Septum simul, & aliò, quàm ad Cor propellet? Et si infra abibit, ac aliò, præterquàm ad Cor, ascendet, quam gratiam incoctus hic succus membris, & corpori alendo præbebit? Si autem apprimè coctus, & alendo idoneus à iecore sanguis exit, vt Cordi labor coctionis leuetur, cur alter incoctus chylus per aliam semitam ad ipsum onerandum, & molestandum abibit? Manifestum enim, quod nec in Receptaculo, nec in thoracico tubulo coquetur, cum ex illorum Auctorum mente semper inibi albus perseveret, & ocissimè moueatur.

Sed supponamus per impossibile, similem chyli partitionem fieri, Intraurica secundum. minis naturæ legibus: tunc vel chylus vterque, & per lacteas, & per Iecur excurrens, simul ad Cor peruenit, vel non. Si non, quis prior ad ipsum accedet? an qui per lacteas, an qui per Iecur? Per lacteas dicent: quia per minores gyros elabitur, & tempus in illius coctione non conteritur. Si hic prius; ergo vel simul cum sanguine venali, & sic sanguis eo conspurcabitur, refrigerabitur, attenuabiturquè, & in Cor ingressus nouiter coquetur, vt coquatur chylus; Vel solus, (quod tamen est impossibile, cum debeat transire, ac recipi in axillarem venam, in Cauam, & Cor, in quibus perpetuò sanguinis vberitas reperitur) ob sanguinis tunc ad alias partes meatum, & tunc vel Cor ipsum, quod calidissimum est, ex improporcionado obiectione pateretur, vel, si succum Cordi cedere conueniret, saltem ex breuissima mora incoctus hic remaneret: nam (ex ipsorum Auctorum positionibus), si per diastolem introducitur, per systolem expellitur, & sic nullam, vel leuissimam alterationem suscipiet. Si verò simul vterque ad Cor peruenit, id per contrarias assurgentur vias, nimirum qui per lacteas decurrit, ab axillari vena ad Cauam, ab hac ad Cor descendendo; qui autem per Iecur, ab eodem ad Cauam, ab hac ad Cor ascendendo. Obuiam ergo sibi mutò euntes, & Cor confundent, & coctionem turbabunt; præterquàm quod vnus alteri potest esse impedimento, & multitudine simul iuncta, Cor obturare. Nec à ratione alienum est, simul & semel contrarios succi motus fieri non posse. Et sic voluatur res, vt volunt, nil, nisi inconuenientia, absurda, & pericula, obuiam fiet, & in lubrico semper vita nostra, salusquè manebit.

Ergo probatum remanet, chylum per thoracicum canalem ad Cor non ire. Ergo per consequens ad Iecur ibit, ibiq; in sanguinem mutabitur, prout hucusque creditum est.





*Quis vsus dicto Receptaculo fuerit à Veteribus attributus, quæ circa ipsum sit opinio Auctoris, quidquæ sit lacteus in eo consensus liquor.*

**V**ana verò nimis (dicent) ratio est, quæ sensui aduersatur. In lacteo tubulo, in Receptaculo dicto, & in mesentericis venis succus lacteus per sepe inuenitur, & in viuo dissecto animali sursum per thoracem abit, & si comprimatur, in venas subclauias tenuissimè scaturiens cernitur: quid ergo negatur posse illuc ire? Sed dicant mihi: quis eis revelauit, dictum succum esse chylum? quis illum degustauit? quis eum cum chylo in ventriculo existente comparauit, & eundem esse asseruit? quid illud est, quod sic facillè euanescit? quid, quod, pleno existente adhuc ventriculo, talis in his vasibus liquor inuenitur? quid, quod non in omnibus, sed in quibusdam tantum? quid, quod etiam post perfectas omnes concoctiones, adhuc in illis dictus perseverat succus? quid, quod nunc serum, nunc lac euandidum, nunc oleagineum succum se se contenta in his vasibus præferunt? quid tandem, quod in lacteis mesentericis diutius dictus liquor albus post mortem perdurat, quam in thorace? Quod simile est, non est idem, & quæ assimilantur, eadem esse, non sic facillè pronuncjandum: multa siquidem videntur esse, quæ re vera non sunt. Quicquid lucet, aurum ne dicito. Sæpè etiam Artifices fallit rerum similitudo. Non solus chylus in corpore humano albus saccus est: nam & lac, & adeps, & medullaris liquor, & pituita, & semen, & glandularum expressus succus alba sunt, & quandam possunt chyli substantiam æmulari; chylus tamen non sunt. Ille, cum in hominis natura succus sit adhuc incoctus, & natiuo calore imperfectus, ac spirituum inops, euanescere, ac dissolui facillè non potest: hoc enim eorum proprium est, quæ calida, habitiosa, & spiritali facultate sunt prædita. huiusmodi ros est, & vltimi alimenti superfluitas quædam, quæ in cadaueribus euanescent. Cætera, sanguis, lac, chylus, serum, alijquæ natiui humores facillè etiam, nisi è corpore pellantur, & exeant, in mortuo corpore dissinguntur. Erit ergo, & in ventriculo, & in intestinis, & in mesaraicis quibusdam venis, mortuo etiam animali, chylus, si certis post cibum horis occidatur; & facillè cognoscetur, & non sic citò in auras abibit: at quod in Receptaculi cavitatibus, & thoracico tubulo chylus adsit, non sic facillè concesserim. Nec inconsultò dixi Receptaculi cavitatibus: quia si de venis, quæ per ipsum transeunt, à lecore ad intestina pergentibus, loquamur, de ijs non ambigo, quin chylo quandoque exundent, vt ad lecur inde feratur: Sed si de venulis in ipsius substantiam oblitteratis, de què illius sinubus sermo habeatur, chylum non contingent, sed sibi congenitum, & familiarem album succum, vt supra ex Hipp. descripsimus; & hunc modò vberiore, modò parciorè, modò succu-

Quod simile,  
nō est idem.

Multa chyli  
præferunt,  
quæ chylus  
non sunt.

Sanguis, lac,  
chylus non  
sic facillè in  
aerem abibit.

Receptaculi  
venulis, ac  
sinibus non  
chylum, sed  
ingenitum  
succum con-  
tinent.

# CAPVT DECIMVMQVARTVM. 65

fucculentum, modò inanem; prout vel benè, vel malè animal pascitur, & vel sana, vel agra qualitate præditum est.

Idem de thoracico tubulo dicendum, qui & ipse glandulis multis, & substantia membranosa alba, ac pingui constat, vt infra melius dicetur, cum priùs dixerò, seu repetiero, quid de horum omnium vsu iuxta veterum dogmata sit sciendum. Et primò de Receptaculo, siuè vnicum corpus habeatur cum Galeno, Vesallio, Faloppio, Mercato, Zacuto, Riolano, le Noble &c.; siuè tres dictæ glandulæ lumbarès cum Bartholino; cuiusmodi vsui d. catur à natura fuerit, si considerentur omnium supracitatorum Authorum sententiæ, definiendum est, non quidem ad chylum recipiendum; sed illud quidem primò propterea à natura conditum esse, vt vasorum à lecore ad ventriculum, lienem, ac intestina repentium, deductioni, securitati, sulcimentoque inferiret; ne scilicet in motibus disrumpèrentur, è loco dimouerentur, vel à mole intestinorum, aut spinæ duritiæ comprimerentur. Secundò, vt instar puluinaris cuiusdam, ventriculo, ne à dorsi ossibus lædatur; inferiret. Tertio vt proligamentò intestinorum cum spinæ vertebriis esset. Ijs r. os quartum, & meliorem ex Hippocrate usum addere possumus, vt nempe, humiditatis, quæ in illa regione ab intestinis, ventriculo, iecore, ac vertebriis copiosa potest disfluere, & redundare, sit veluti depositarium, ex quo siccitatis tempore, gratiosæ retributionis merito, vniuersis spinæ articulis, pro ferendis laboribus, humiditate leni, vntuosaquæ, quædã instauratio, & alleuatio succedat. Quem usum glandulis omnibus præcipuum esse, statuit Hippocrates *cit. lib. de gland. nu. 2.* his verbis: „Cæterum glandulæ in corpore sunt plures, & maiores in cauis ipsius „partibus, quàm in articulis, & quæcunque in alijs humidis, ac sanguinolentis locis consistunt, atque illæ quidem, vt quod superne in „cauis partes inluit, suscipientes, in se trahant; hæc verò vt rursus „nascentem præ laboribus humiditatem in articulis, si quam articuli „remittant, eius multitudinem susceperint, & sic nimia humiditatio „in corpore non ineest: Nam si etiam quid gignatur humiditatis, non „statim nimia humiditatio inde successerit: reflectitur enim, & consumitur, tum multa, tum modica in ipsas glandulas, atque sic reliqui „corporis redundantiam glandulæ sibi lucrifaciunt, & alimentum hoc „est ipsis coalescens: quare, vbi carnosæ partes sunt, & humidæ ibi „etiam glandulæ.) Id quod *nu. 3., & 4.* etiam exemplis confirmat, & probè adaptat mesenterij, ac rerum glandulis, vt supra in octauo capite dictum est; Sicuti, & *num. 6.* hæc protulit: Porro intestina multam satietatem ex cibis, ac potibus habent, & præterea consumitur „in glandulas similiter, velut superior.) Et hunc esse ipsius verum usum, ex hoc conijcio, quod vt plurimum, & qualibet hora, etiam à passu distantissima, in eo multa serositas, (quæ lactea, & crassiuscula cernitur), vt aliqui Lactearum testantur inventores, & Clarissimi Torini confirmat experimentum; affluit. Eam autem, rationabile est, ex

Receptaculi  
vsus ex Gal.  
& cæteris.

Alter vsus e  
Hipp. est hu-  
miditatem  
exugere, &  
impascere.

Dicus com-  
probatur vsus

Plurimum  
glandularum  
vfus hume-  
ditatis.

intestinis per plures porulos, à iecore, & ventriculo per vasa lymphatica à Bartholino dicta, à vertebribus per thoracicum tubulum, eiusque germina exprimi; itaut omnium contiguarum partium serositatis à nutritione residuæ, vel à conatibus, & laboribus pressæ, sit quoddam veluti promptuarium, seu lacuna; ex qua per meatulos in renes insertos eam à renibus attrahi, & in vrinarios meatus, vbi superabundat, deponi; sicuti e contra, vbi corpus resiccatum sit, tum dictos vertebratum articulos, tum iecur, tum intestina, tum cæteras ab ea humiditate leniri partes, ac humectari, credendum est: Ad hoc enim præcipue multas corporis glandulas ab Opifice summo procreatas esse tum in faucibus, tum in larynge, tum in vesicæ collo, tum propè seminaria vasa, tum propè aliquas articulationes, testantur præter Galenum, & Vesallium, *Mercatus tom. 1. lib. 1. part. 4. art. 6. quæst. 124.*, & *Zacutus Lusitanus lib. 6. de Med. Pr. hist. sect. 4. tex. de glandulis*; Quæ proinde omnium partium ad humiditatem, ac fluxiones recipiendas facillimæ, promptissimæ, & sic debillissimæ censentur, & ex Hippocratis voto, tum à *Gal. lib. 2. de sem.*, ac alibi, tum à cæteris Naturalibus, & Anatomicis prædicantur. Imò ad id destinatas esse omenti, & mesenterij glandulas, affirmat *Vesall. lib. 3. cap. 4.*

Est in eo  
sepetum est  
sui alimentis  
superfluum.

Nec ab hac opinione me remouet lacteus succus, qui ex ipso quandoque; maximè si scindatur penitiùs, & violenter prematur, exprimitur: illud namque sui alimentis residuum est: Vnumquodque enim membrum sanguinem, ex quo alitur, in succum suæ substantiæ simillimum conuertere, sciunt omnes, qui nutritiæ facultatis gnari putantur; itaut auctoritates pro hoc adducere, superfluum mihi videatur; Ideoque mirari non debebant nouissimi hi Anatomici, huiusmodi glandosum, pingue, & membranofum impluuiam albo quandoque succo in vasculis, ad suam nutritionem dicatis abundare, ac inde in inedijs carere, cum alioqui aquositas in suas cauitates recondatur: ita enim supra cap. 8. fuit à nobis ex Hippocr. sententia monstratum; & experientia ipsa id in cæteris glandulis, præcipue autem mammarum, & thymi apprimè confirmat, etiam in puerulis recens natis, quæ si præmantur, lacteum succum educunt.

## CAPVT DECIMVM QVINTVM.

*Quid de lacteis, tum mesentericis, tum thoracicis, deque earum lacteo succo sit tenendum.*

est  
in

**N**VNC de lacteis quærere tempestiuum est, pro quo sciendum, venas eas, quæ ab intestinis in ramos mesentericos, & in Portæ venam abeunt, duplici aliàs ab Auctoribus officio dicatos fuisse; partim videlicet, vt ab ijs, & ventriculo ad iecur chylum exugerent; partim verò, vt ab hoc ad illa commodum alimentum deducerent; Quarum  
disc.

# CAPVT DECIMVMQVINTVM. 67

differentia in hoc sita est, quod quæ chylo vehendo sunt, adeo, & in ventriculum, & in intestina insinuantur, vt ea omnino penetrent, & in eorum cavitatem hiantibus oscillis incumbant; quæ verò eorum alitioni inferuiunt, non adeò se se intrudunt, sed per eorum tunicas diuagantes, eas miris modis ambiunt, amplexantur, & fouent.

Dicendum ergo, quod & vascula lactea (: nam, & hæc venæ sunt, vt iam diximus), partim à ramis mesentericis producuntur, ac per glandulas, seu Receptaculum transeuntia, in earum substantias intruduntur, ac finiunt; (quorum alia à parte superiore, alia ab inferiore, alia à lateribus deueniunt); partim, vel à lecore, vel à Portæ vena procedentia, & per dictas glandulas penetrantia, feruntur in intestinorum sinuositates. Quæ vtrique parti, lecori scilicet, & intestinis communicant, arbitrandum est, ad lecur chylum deferre; quæ verò vni earum solummodo inhærent, & in glandulas, membranas, ac pinguedines varijs modis disperguntur, & obliterantur, ponendum est, earum alitioni à natura dicata fuisse. Quæ si lacteo succo in benè pasto Viro quandoque referta videantur, non mirum: proprium enim partium nutritarum esto sanguinem in substantiam sibi similem transmutare, sicuti cap. antecedenti posuimus. Ideo cum mesenterium glandulis, ac pinguedine vndique exundet, duplicique constat membrana, meritò in lacteum, albumq; succum, sanguinem, in suis venulis exilibus consistentem, commutat, vt in sui nutritionem agglutinetur, vti supra etiam de glandulis ipsis, & suis cavitatibus tactum est.

Exemplum pro hoc sit omentum, cuius si obseruentur capillaria vascula hora tertiæ coctionis peractæ, simili lacteo, pinguiq; sanguine plena conspiciuntur, & ab eo dulci, pinguiq; succo vterus pregnant, & mammæ ditantur ex Hippocr. lib. de nat. pne. nu. 21. Sic & mammarum venulæ, quæ in glandulosa, & pingua corpora impinguntur, non absterili liquore etiam in Viris, infantibus, & non lactantibus mulieribus imbuuntur. Sic, & in thymi vasis in infantibus, & embrionibus idem obseruare licet; sicuti, & de cæterarum glandium venulis genericè pronunciauit Hippocr. quas nonnulli ad lymphaticas modo dictas transferunt.

Quæ igitur in asseueratione Pecqueti, & Bartholini venulæ lacteæ in glandulas, & Receptaculum induntur, nec vltra ad lecur transmigrant, iure mihi videntur inter eas esse, quæ pro dictarum partium enutritione à Galeno, & à Vesallio disponuntur, vt supra cap. 8. citatum fuit, cui & illud maximè attestatur, quod eas capillares, & instar aranearum, & vix visibiles fibrillarum tenues, per mesenterium, & glandulas excurrere, intròq; in glandium corpora insinuari, iidem tradunt: facilius enim immutat in his exilibus venis à nutritis partibus sanguis, quàm in magnis, tum quia in minori quanto minor resistentia, in maiori maior datur; tum quia tunicæ exilitas partium virtuti penetratio- nem facilem reddit; maximè tum, & venarum naturæ conueniat, quæ

Diuisio venularum lactearum.

Cur lacteo succo hæ venulæ sint refertæ, & quod illæ sit.

Quod lacteo succo hæ venulæ si sanguinis assimilitati ex enutritio- ne superflui

Ratio prima

Cur facillius in his venulis albefcat sanguis, quàm in maioribus.

fermatice sunt, album gignere succum, *Gal. lib. 1. de sem. cap. 11. & 13.*

Ratio secun-  
da.

Facit etiam, quod facillimè euanesceat dictum succum, scribunt iidem Lactearum Auctores; quod signum est, dictam substantiam spirituosam, ac oleosam esse, quæ ideo vel ex dissolutione absumitur in inedijs, ac laboribus, vel disperit in nece, quemadmodum in carnosissimis partibus occisorum deperire, videmus, cum spiritu alimentosum succum; Id quod de chylo neutiquam cogitandum est, cum is sit substantia subfrigida, aquosa, & sic ad exolutionem inepta, ut patet ex eius substantiæ qualitate.

Ratio tertia.

Facit quoque, quod non in omnibus dictæ venulæ albo succo repletæ aspiciuntur: nam in vno ex duobus, quos Bartholinus eadem hora passos, & strangulatos publicè pro experimento secuit, *cap. 5. de lact. thorac.* ne chyli quidem vestigium, siue in Receptaculo, siue in lacteis potuit inuenire; quod confirmat in alio cadauere strangulato accidisse *cap. 14.* Si enim chylus is est, in vtroque, & esse, & æquè videri debebat.

Ratio quarta.

Item facit, quod pleno adhuc existente ventriculo, & nondum ad intestina descenso (prout in multis quarta post cibum hora accidit), huiusmodi vasa albo succo turgentia conspiciuntur, ut apud dictum Bartholinum legitur dicto lib. *cap. 14.* Imò, & *cap. 16.* speciatim ait, se id obseruasse in canibus dissectis, in quibus ventriculus adhuc alimentis, „ crassis scatebat. Vbi, & statim assumpto cibo idem apparere, ait „ his verbis. In thoracica lactea statim à pastu subtilioris cibi chylum „ reperiri, certum est) quamuis *cap. 16.* sibi inconstans, dicat, tunc ibi liquorem vix reperiri. Et ex altera etiam septima post cibum, & quacunque hora, talis aliquando succus in ijs reperitur; ut dicit idem met eodem *cap. 16.* Si ergo adhuc in stomacho chylus est, quomodo potuit ex intestinis, in quæ lacteæ implantantur exugri? Et statim ingestio cibo, quæ chyli forma, quæ illius recessio potest considerari? Vel si iam distributiones factæ sunt (quod septima, & vteriori post pastum hora, nisi imbecillimus stomachus sit, supponendum) cur adhuc chylus in primis vijs moratur.

Concluditur  
quod sit lac-  
teus succus  
in ijs venu-  
lis contentus.

Erit ergo is albus succus vltimi, & optimi earum partium nutrimenti superfluitas, quæ in dictis suismet vasculis peculiaribus asseruatur, ut in egestatibus pro alimento ijs inferuiat: Etenim vnaquæque pars, quod sibi à coctione superest, in proximis, & sibi in suis vasis conseruat, & nisi ab alijs naturæ instinctu sibi eripiat partibus, (ut ventriculo, intestinis, iecori, & cordi pro totius enutritione accidit), eo potitur, & gaudet, vsquequò vel in suam substantiam conuertat, vel superfluitatis pertæsa, per proxima oscula excernat: Vnde videmus, mammae, lac, testes semen, ossa medullam in sibi familiaribus vasis retinere, & in ieiunijs depasci; in nimietate turgere, ac effundere; & ijs priuata, alium pro deperdito succum ex proximis communibus canaliculis quærere, attrahere, coquere, & reponere. Ea verò omnia intelliguntur, ut in principio capitis distinximus, de venulis ijs, quæ  
in

in glandulas ipsas, & mesenterij pinguedinem, ac membranas obliterant: Alioqui enim quæ iter suum à iccore, vel Portæ trunco profectantur in intestinorum cavitatem vsque, eas chylum, saltem tenuissimum, adferre posse, ac solere, non inficior.

Quod si cum Riolano, Afellio, & alijs contendatur, à dicto Receptaculo multiplices meatus inferi in Portam, ac Iecur, iterum, vt dictum est, distinguere debemus, quod vel continuantur cum ijs vasis, quæ ab intestinis veniunt, vel in dictum Receptaculum finiuntur. Si primum, clarum est, eos ex ijs esse, qui chylum sugunt, & euehunt ferofiore. Si secundum, dicendum, ex ijs esse, qui ipsi, & mesenterio alimentum deportant, scilicet serum, seu lymphum in cavitates illas expriment.

Hic verò me aliquis interrogabit: cur ergo in alijs mesentericis venis non succus albus, sed sanguis conspicitur? Respondeo primò, si illæ sint, quæ pronutritioe earum partium sanguinem ferunt, crassiores, maioreſq; multo lacteis esse, ideoq; non posse sanguinem sic facile à partibus commutari, vt in capillaribus, & tenuissimis sit: si verò ex illis sint, quæ à ramis Portæ in cavitates intestinorum dehiscere conspiciuntur, & tempore distributionis chyli considerentur, facile obseruabuntur in suis principijs, hoc est propè intestina, albesere, quò verò magis ad Portam accedunt, eo semper rubicundorem contentum in ijs succum apparere; idquæ ex permixtione sanguinis semper in ijs aliquantulum, ne concidant, contenti, cum chylo; & ex aliquali coctione, seu permutatione, quæ ab ipsismet sanguifluis fit venis: Venis enim inesse quandam, etsi imperfectam, virtutem sanguificandi testatur Gal. lib. 1. de nat. facul. 2. & 4. Non enim mihi placet ea opinio ponens, chylum per lacteas in receptaculum colligi, ac inde ab alijs venis ad Iecur attrahi: hæc namque Naturæ opera inanis, & frustatoria videretur; quæ enim à dicto receptaculo gratia, & melior qualitas chylo dabitur? & ad quid multiplicare entia sine necessitate? & cur vias parulas deferens in dictas semitulas natura se conijciat? Respondeo secundò id eis ex comitibus arterijs aduenire, à quibus per mutuas anastomoses sanguinem tenuiorem, & recipiunt, & vicissim reddunt; quod lacteis forsan ob arteriaci comitatus carentiam non datur; Et hæc Deutingerij expressio est non inuicem similis.

De thoracico tubulo, eadem, quæ de receptaculo, ferenda sententia est, illum nimirum à natura destinatum esse pro excipienda superflua humiditate, à vertebra in laboribus; & conatibus expressa, & à nutritione eiusdem medullæ, vertebrarum, & nervorum spinæ residua; illum verò succum lacteum sibi à sua nutritione superesse, asseruari, & potius dissolui, vel nimium siccatis vicissim reddi contigujs articulationibus: corpus enim album, ac membraceum est, multisq; parvis glandulis, & pinguedine per totam spinam instructum, & exilibus suis osculis partim à receptaculo, cui contiguus, & annexus est; partim

Cut in alijs  
venis mesen-  
tericis san-  
guis conspi-  
ciatur.

Quis thora-  
cici tubuli  
vires, & suc-  
cus.



ab Axillari, cui quoque inferitur; partim Aorta, cui incumbit, partim à ramis venæ sine pari, cui lateralis extat, pro sua alitione succum trahit, & nimium serum in Receptaculum deponit, vel alternatim ab eo recipit, cæteris humectandis partibus, & refrigerandis communicandum.

Cet hic tubulus, ut plurimum vnicus, & sinister.

Nec fuit sine misterio hic lacteus furculus, ut plurimum vnicus, inter spinam, & æsophagum excurrens, perq; sinistram spinæ partem conscendens à natura productus, cum sic inferuiat pro æquandis partibus: nam per dexteram excurrit vena sine pari à caua, vbi Cor transcendit, producta, & infra ad alendas pectoris costas omnes descendens, ut notat *Vesall. lib. 3. de corp. hum. Fabr. cap. 9.* Quæ quidem vena sine pari, ut benè notat *Falop. pag. 120. & 121.* per ramulos cum emulgentibus, & inferiis cum alijs ramulis à caua productis inferiore, & circa lumbos, vel circa vltimam lumborum vertebram cum alijs ab eadem progenitis connectitur. Ideo nec mirandum, hanc lacteam thoracicā à caua sub iugularibus, & in axillares abeuntæ venæ sine pari lateralem produci, indeq; descendentem in lumbares glandulas inferi, ut æqualitas inter latera seruetur.

Probatur tubuli vsus ascriptus.

Ad huiusmodi verò vsus destinatum hunc tubulum, esse, illud significat, quod non mote cæterarum venarum laevis est, & cauus, sed imò pluribus anfractibus, & diuicationibus intus intertextus, quod propriè non ad vehendum, sed ad conseruandum magis facere videtur; Sicuti, & ad dealbandum, ferofumq; reddendum huiusmodi succum, faciunt multæ minutæ glandulæ; & pinguedinis exorsus ipsi connati, ut experientia Caroli le Noble, in Riolani libro impressa, comprobatur, cuius verba sunt hæc: Producti ex eius (scilicet receptaculi) parte superiore duo canales thoracici longius protendebantur, quorum dexter crassitie pennam anseris æquabat, sinister verò exilior longè erat. Ambo minutis glandulis, & pinguedine abundabant, & in multos flexus, sinuososque anfractus, in quibus videbantur vna coire, variè contorti, tandem adeo perfectè post medium sui curricula spatium inuicem iungebantur, ut ex duobus, vnus &c.

#### CAP. V. DE GIMVMSEXTVM.

*Tolluntur contraria obiectiones multa.*

ET hæc verisimilior erat de dictis partibus, seu canalibus, & eorum contentis, ferenda sententia; non autem, ad pauca respiciendo, ab antiquissima euentissimāq; omnium, tum Philosophorum, tum Medicorum opinione re recedendum; Omnibus namque confirmatissimum erat, iter chyli esse per venam Portæ in Iecur, ut inibi sanguis factus per hoc in cauam, consequenterq; in Cor (ut Aristoteles), & ad cæteras partes omnes, (ut Galenus opinatur), iuxta cuiuslibet indi-

indigentiam pro nutritione liberaliter deferatur.

Neque negare possunt, dictas venas lacteas, mesenterij ipsius, & glandum nutritioni dicatas, partim à Portæ, partim à Cauæ ramis dimanare, ab ijsquē sanguinem recipere, qui alimento ipsarum, & partium dictarum dicatus, lacteus fiat, eo quod molliores, tenuioresque sint, & ideo ab ijs degenerare videantur: quia id hæ habent à mollitie, & pinguisitate partis, cui inserviunt: aliæ enim similes in alijs adiposiss, glandulosissquē membris videntur, quas tamen à cæteris venis germinari, certum est. Et, si *Galeno 4. de vsu part. 13. & Curtio pag. 131.* creditur, non sunt dissimiles eæ, quæ in iecoris substantia exillimæ, & tenerissimæ inueniuntur. Cui, & alia additur causa, scilicet exiguitas ipsarum, quæ ideo, & tunicarum tenuitatem necessariò exposcit, ut exacta proportio inter maiores, minores, & minimas seruetur venas.

Prima obiectio ponitur, ac tollitur.

Rursus, nec hoc concedere ijs dñum videri debet, eo quia succum ab aliarum venarum sanguine dissimilem contineant: nec enim nouum est, quod ab eodem trunco ramuli emanent, sicuti ad diuersa munia dicati, ita & variò, dissimilique succo plenæ: Siquidem ab eodem Portæ trunco, & germinibus videmus venas ad chyli melleam bilem ducentes; alias ad splenem, & hæmorrhoides crassum, melancholicumque succum deferentes; alias sanguinem ad nutritionem partium porrigentes; alias chylum à ventre sugentes; & eas omnes suo familiari humore per tempora esse refertas; Sicuti, & de causæ propaginibus idem dicere possumus: nam ab ijs deriuantur (quorundam opinione) vteretres, quæ urinam ad vesicam traducunt; spermaticæ, quæ semen, mammariæ, quæ lac, & aliæ in alias corporis glandulas insertæ, quæ succum lacti similem, vel serosum in se continent: Vnaquæque enim pars, ut sæpè dictum est, & repetere iuuat, ad se delatum, vel attractum alimentum in liquorem sibi similem conuertit; omneque, quod alterat, in suam naturam illud, quod ab eo alteratur, pro suo posse transmutat, ait *Gal. 1. de sem. 12.* Et idcirco non mirum, si eadem propagines vasorum diuersum succum pro diuersitate partium, quibus inseruntur, continent, nisi ex ijs sint, quæ solummodò per partem transeuntes, & magnæ, nil ab ea immutantur.

Secunda obiectio ponitur, ac tollitur.

Tertiò neque illi officit assertioni, quod hæ venulæ, vel earum aliquæ imò plures videantur ab intestinis deuenire: quia respondetur, tot, tantasque esse illorum circuitiones, & modò fursùm, modò deorsum gyros, ut tanti non sit, venas intestinorum nutritioni destinatas in mesenterium quoque, quod inuolutiones hæc vndiqueque vnit, alligat, implet, ac fouet, redire, introire, ac milleformiter insinuari: Nec enim hæ solæ sunt, aut videntur in corpore venarum rediciones, Meandri, & inuoluera.

Obiectio tertia ponitur, & soluitur.

Quartò nec repugnat quicquam, quod solummodò in benè pallis obseruentur huiusmodi lactearum turgentia, non autem in inedia oppressis, in quibus tantummodò serosus aliquis humor reperitur (vel etià ipsæ

Obiectio quarta ponitur, & dissoluitur.

ipsæ disparent venæ), vt obseruauit primò Pecquetus in cane macilentio, ac famelico viuo dissecto, & Carolus le Noble in muliere pariter per totam diem ieiuna, strangulata, & adhuc fumante aperta; quod videtur indicare, substantiam illam chylosam fuisse, & ad cor ideo iam conuolasse totam: quia respondetur inutilem esse hanc obiectionem; ex vna enim clarum est, quod in famelicis, addo & in gracilibus, & atrophis, primò omnium absumuntur, demacrantur, inanianturq; debiliora membra, quales sunt glandolæ partes, & pinguis, ac facile euanesceus liquor; serum verò, vt alijioni ineptum, superest: ita enim, & obseruamus de lacte, ac semine, in proprijs eorum receptaculis, de què rore in cæteris partibus. Ex altera autem inconcludens est allata experientia, cui altera è diametro opponitur; nimirum aliquando etià in benè pascis, & obesis, succi prædicti non adesse in dictis lacteis vllum vestigium, vt obseruauit in Viro vndique sano, & obeso Bartholinus cap. 5. de lact. thorac. & in alio simili cap. 14. Quid igitur aliud citè deducetur ex his, quam similem succum esse quid superflui, quod citò absumitur, & quod adest, & abest citra læsionem aliquam subiecti?

Obiectio supra affertur, & aufertur.

Quintò nec obstat altera experientia, quod in viujs dissectis, vsque quò mouetur diaphragma; ex ligatura, citra Receptaculum indita, videatur chylus in lacteis, quæ inter ipsam, & intestina sunt, turgere, & ab intestinis ipsis fluere: respondetur enim, quod, cum duplicia vasa sint, quæ in glandulas recipiuntur, scilicet quædam, quæ ab intestinis fugunt, & in Portæ ramos, per dictas glandulas transeunt, se se deferunt; quædam verò, quæ tùm à Cauæ, tùm à Portæ venis in ipsarum glandularum substantiam inferuntur, & inibi finiunt, vt iam supra insinuauimus; primæ quidem fugant ab intestinis, vel ab ijs, si vera sunt, quæ ait Pecquetus, impelletur ab Anatomes feritatem in eas; Secundæ, de quibus sermo noster, est, nequaquam; cum earum ora in intestina non penetrent. Imò has venas, quæ mesentericæ, & glandoso corpori ad eorum nutritionem inferuntur, non ab intestinorum cauitate, sed ab alijs supranarratis venis attrahere sibi familiarem succum, illud suadet, ac probat, quod, si aliter esset, in embryone non nutrerentur illæ partes, sed atrophia laborarent; Et hæc consequentia patet; quia saltem primis mensibus nil à fatu per os fugitur; ergo nec in cauitatem intestinorum, quicquam descendet, & sic nec in lacteis: tunc enim omne alimentum fatui per vmbilicalem venam, quæ recta in Iecur abit, suppeditatur: necessariò ergo ab hepatis venis debebunt nutriri. Quod si quis dicat, posse haberi nutrimentum tunc à vena Caua per Lactæas superiores, non abnuam, sed hoc non quadrat illorù positioni, qui fatentur ob valvulas, quæ in ingressu tubuli lactei, in axillarem venam, ac in ipsius tubuli progressu reperiuntur, benè quidè ab infra supra, non autem à supra infra permeare succos. Sic docet etiam (& si m alè) Bartholinus lib. de lact. thorac. Et quid quod in dictis fatibus ipsæ etiam venulæ mesentericæ plenæ albo succo conspiciuntur?

## CAPVT DECIMVM SEPTIMVM. 73

tur? nūc chyliū dicent? unde ille, si nil in ventriculum fugitur? Manifestum ergo, quod superfluitas vltimæ alimonie, vt & in mammis, lac illud erit.

## CAPVT DECIMVM SEPTIMVM.

*Respondetur ad experientia contraria.*

**H**isce omnibus obuiam veniunt prædicti Auctores, eorumque Affecle varijs suis experimentis nouis, quæ pro demonstrationibus habent, ac venditant; cum tamen reuera omnisfatiam nutent, & elabuntur.

Primum est, quod vascula, quæ videbantur à Iacore in Receptaculum meare, non chylum, non sanguinem, sed puram lympham exprimunt, ex quo lymphatica ea Bartholinus nominauit. Item, quod non à Receptaculo ad Iecur, sed à Iecore in Receptaculum se se exonerant, vt inde per tubulum thoracicum in Cor, cum chylo ipso lymphâ procedat. Illud confirmat propria euidetia liquoris puri, & lucidi; hoc patet ex ligatura inter receptaculum, & Iecur apposita, per quam videri, ait Bartholinus, dicta vasa propè Iecur turgere, & propè receptaculum inaniri.

Primum experimentum, quod alba vasa inter Iecur, & Receptaculum, lympham ab illis in hoc suggerant.

Vtrumque autem caret subsistentia; Et primum, quia ex ipsomet Bartholino dictus liquor euariat; nam in lib. de lact. thorac. cap. 16. dixit, esse eiusdem qualitatis (imò prorsus eiusdem substantiæ) cuius is, qui in receptaculo habetur; & in Defens. vas. lact. & lymphat. dixit, ab aliquibus igni expositum, in gelatinam, quandamque crassam, ac lentam substantiam conuersum esse (limpida autem aqua incrassari non solet); & vltcrius, quod idem est, ex eodem Authore, vtriusque succi iter, nempe per tubulum thoracicum in subclauias venas; Secundum autem non concludit; primò, quia eiusmodi experientie in corpore dilaniato, vbique angustiato, dolente, & se contorquente, fallacissimæ sunt, & illos turgores, vt à natura irritata, & præter ordinem affecta emanantes, potius præpostero, quàm naturali modo fieri, est arbitrandum; (videmus enim, ventriculum affectum nauseare multoties, & euomere; intestina in iliis ad ventriculum faeces mittere, & in euictis à morbo decubitus in Iecur, Cor, aut Cerebrum fieri; sicuti, & in timoribus profundi sudores, ventris deiectiones, & vrinæ fluxus etiam in sanis contingere). Et sic malè à motibus, & fluxibus, qui in animali sic languido, & extorto obseruantur, ad motus sanorum trahitur argumentum. Secundò quia, etiam si valeret argumentum, nec sic posset certò concludi, per dicta vasa succum ab hepate derivari, sed potius ad ipsum ire; exemplo ligaturarum, quæ in exercenda phlebotomia sunt in brachijs, ac tibijs, per quas videmus, venas, quæ infra ligaturam sunt, versus manus, ac pedes turgere; Et tamen clarum est, has venas, & originem, & sanguinem à superioribus recipere venis; causa verò est, quod liga-

Eiusdem insubsistentia monstratur.

Experimenta in corpore dilaniato, & vndique angustiato fallacissima sunt.

tura, saltem dum sit, vel non nimis stricta languet, solitam adiuvat expressionem, ut in sequenti videbitur libro: quare sic etiam potius conuinceretur, succum naturaliter à receptaculo in lecur commicare, & chylum deferre (quicquid enim de circulatione sanguinis dicitur, per quam volunt Harueiani, à phlebotomia sanguinem venire à venis extremarum partium, in hasq; ab arterijs, videbitur eodem 2. libro vatum). Tertiò quando nec hæc datur exceptio, non sic tamen tolleretur, quin per eadem vasa lecur traheret chylum, cum videamus, ut plurius docuit Gal., per eadem vasa, per quæ bonum trahitur nòxia pelli, idemq; vas, & tractioni, & pulsioni inservire.

Secundum  
Experimentũ  
quod lacteus  
succus à tu-  
bulo thora-  
cico ascen-  
dat in Cor.

Ratio prima.

Ratio secun-  
da.

Ratio tertia.

Ratio quarta.

Ratio quinta.

Ratio sexta.

Ratio Septi-  
ma.

Conferatur  
Experimentũ  
supradictum

Aliud experimentum est de lacteo succo, qui in tubulo thoracico reperitur, quod ascendat, exonereturq; in venas subclauias, seu axillares, & ab his in Cor, non autem ad iugulares, nec ad brachia migret. Es huius validatio consistit primò in necessarijs legibus circulationis, per quas, ut ipsi aiunt, sanguis ab his venis, sicuti, & ab alijs omnibus, in Cor procedit, ut inde per arterias in totum feratur, & hinc denuò in venas, continuata circulatione, redeat. Secundò in valvulis, quæ in sinibus dicti tubuli, & in ingressu axillatum, & ad radices iugularium internarum observantur, per quas impediri, inquit, descensum liquoris ab axillari in dictum tubulum, ab hocq; in lumbare receptaculum; ascensum ad caput; & ad brachia vocatum: unde necessariò ad Cavam, & Cor illi eundem est. Tertiò in fistula, mortuo animali, dicto tubulo indita, ex qua inquit insufflari aerem in axillarem venato, & in dextram cordis aurem; contra verò nullo conatu posse infra in receptaculum introspirandum efflari. Quantò si comprimitur abdomen, succus lacteus in thoracicum tubulum exprimitur; si verò collum, & artus, nisi sanguis, deorsum abit. Quintò si findatur dictus tubulus, succum supra ascendere, nunquam descendere, videtur. Sexto per Pecquetum visus est lacteus succus in fissa Caua propè Cor à sanguine seiunctus. Septimo ligato canali thoracico in pectore, ille versus superiora flauescit, versus inferiora exturgit.

Sed & hæc omnia experimenta inconcludentia, eorumq; conceptas illusiones fallacissimas esse, constabit illicò. Et primum non obstat expipomet Bartholino, qui lib. de lact. thorac. cap. 13., ut probaret chylum ab inferioribus ad superiora repere, attulit historiam Diui Pauli decollati, e cuius vulnere lac prodixisse dicit ob dicti chyli redundantiã (= quàm tamen perperam hoc adstruxerit, à Pallierio lib. de lact. vera gen. cap. 18. tangitur); ergo ad iugulares per eum ibit. Item ab his tubulis chylum in mammãs pro lacte gignendo procedere dixit cap. 18. idem Bartholinus (cui malè, ut à nobis lib. 3. cap. 1. huius operis monstrabitur); si autem in mammãs, ergo, & ad thoracicos riuulos; ergo non in cor. Item, & in missione sanguinis aliquando serum lacteum, & aliquando aliquid lacteisanguinis observari, tradidit eod. cap. 13. in puella Hafniensi, et si hoc postea, sicut, & alia retractauit cit. lib. de sens. pag. 127., & 128.

Circula-

# CAPVT DECIMVM SEPTIMVM. 75

Circulationis autem leges, Veteribus ignotæ, mihi verò, & plerisque Medicis suspexit, experimentisque, à dilaniatis, & emorionibus animalibus sumptis, innotuit, potius res chimericæ est, ac imaginaria, quam in re subsistens; & illis securiora experimenta, à sanis, videntibus; hominibus sumpta, aduersantur; & aliæ rationes leges illas rescilire commodè possunt. Ali enim corpus nostrum non quidem arterioso, sed venoso sanguine, & ab arterijs in venas difficilius, ab his autem in illas per anastomoses facillimè sanguinem insumi; illarum continuus motus, spirituum agitatio, calorq; euidentior; harum verò quies, & in calore tepiditas; tum vtrarumq; originis modi, & vasorum substantiæ diuersitas; tum, & Antiquorum Medicinæ Procerum auctoritas, attestantur eximè, vt latius in sequenti libro differetur.

Respondetur ad primam rationem.

Alli corpus non arteriosum sed venoso sanguine, rationes assignantur.

Tacite eundem censuram respondentur.

Neque aliquis arripiat occasionem me carpendi ex eo, quod in Con-  
futatione opinionis Felinianæ circa saphenæ sectionem, ipsum Aucto-  
rem diuam circulationem negantem impugnauerim: Nam si benè mea  
ibi scripta legantur, non in eo obstiti, quod circulationem neget, sed in  
negandi modo; utq; ostenderem, ipsum non benè obiectionem soluisse;  
Nec Harueianam circulationem amplectendam esse; sed benè excus-  
sum sanguinis ab infra supra, ab extra intra, à mammis ad vterum, ab  
hoc ad epigastrium, & in omnibus e contra dari in natura tum ægro-  
tante, tum sana, perhibui; probans exinde, per saphenæ sectionem  
citra violentiam ullam deriuari, & euacuari ab vtero.

Secunda ratio, à valvulis sumpta, nihili valet: nam valvulæ à natura  
efformatæ sunt, ne à violentis motibus sanguis, vel alij succi præter eius  
voluntatem fluant, resurgant; non autem, vt se ipsam impediant, quo-  
minùs, quò voluerit, possit, & sanguinem, & cæteros succos impellere  
citra ipsarum resistentiam: Irrationabile namque est putare, quod Na-  
tura valvulas ne sciat suis loco, & tempore claudere, aperire, & sangui-  
nem ab infra supra, à supra infra, & ad latera, prout ei libuerit, appel-  
lere; quæ alioqui per ossa ipsa semitam sibi parat.

Respondetur ad secundam rationem.

Tertium experimentum idem est imbecillimum: nam alia est via  
vento, seu aeri, alia liquori sufficiens: ad illum enim quælibet, etiam  
visum latens porositas satis est, ad hunc non satis. Item alia est violentiæ,  
alia naturæ, operatio: per eam enim truditur, & humor, & aer; quò  
natura non trudet, nisi aliunde impedita, aliòq; coacta. Sic si insuffletur,  
aut clysterizetur sedes, turgebunt superiora intestina, & ventricu-  
lus; cum tamen naturæ naturalis additus sit e contra, scilicet à ventri-  
culo, & superioribus ad sedem. Si insuffletur pectus, vel per catheterem  
indatur humor, vesica statim, & humore distenditur, cum naturæ excre-  
tio opposito modo se habeat. Sic si inter pellem, & carnem in feris  
fistula indatur, & suffletur, totus inflabitur ambitus, & tamen corpori  
rectè se habenti hic non est sanguinem, aut humores transmittendi me-  
tus, non hac iter visitur. E contra viæ adfunt naturæ faciles, quæ nobis  
impenetrabiles apparent. Sic si spiritus, & liquor in os intrudatur,

A4. tertiam dicitur, aliam viam aeri, aliam liquori dari. Alia violentiæ, alia naturæ operatio est.

Via naturæ facilis nobis impenetrabiles appa-  
rent.



ventriculus quidem implebitur, ad secur autem, Cor, cerebrum nil vi pertransibit; cum tamen naturæ viacula pateant per venas, arterias, & nervos in secur, Cor, cerebrum, Lienem &c. Sic in cartilagines, & ossa ipsa nutritius penetrat humor; quod arti neutiquam concedetur. In summa vis, & natura opposita sunt. Ex eo ergo, quod insufflatus ventus, vel etiam liquor per axillarem in Cordis sinum dextrum impellatur, non potest deduci, eam chyli, ac sanguinis viam naturalem, ac ordinariam esse. Et cur non æque concluder, à Corde, vel, vt verius loquar, à Caua, & subclauia sanguinem in tubulum illum lacteum, vt in venam sine pari ex alio latere, si non per vim, natura ipsa prodire?

Hic se exprimit Bartholinus *d. lib. Defens. pag. 124.*, nesciens vi dere, quomodo, si liquor, vel flatus, per fistulam immisus in lacteam thoracicam, potest inoffenso pede ad Cor pertingere, non possit eodem chyli penetrare: Sed, præter iam allatam rationem, respondetur, his partibus vacuis, & ab externo instrumento dilatatis, hæc posse fieri, quæ non fiunt, his plenis existentibus, & ab intrinseca facultate in naturali suo positu rectis: corpore autem sano, vena axillaris plena est; & à Caua recipit facillimè, si quid sibi deest; & valvula illa, ostiolis tubi lactei superposita, à præexistente sanguine clausa sistitur: cur ergo non sic interdicitur chylo (si is est) illac accessus ad Cor?

Responde-  
ret ad quar-  
tam rationem.

Quartum experimentum nullius quoque valoris est; primò quia, compresso abdomine, comprimuntur glandulæ, ac pinguedines mesenterij similes, & sic necesse est, vt in ijs existens sensus, vel lacteus succus in canales, vicinos, ac in eas insitos exprimatur: si autem, vel collum, vel pectus prematur, non comprimitur lacteus tubulus, qui clauiculas non pertransit, qui à Spina retrò, à costis antè clauditur; & sic nec potest in eo existens succus deorsum trahi. Addatur, quod, dato etiam, per compressionem non posse lacteum succum exprimi propter valvulas, non ob id conuincitur, succum illum futurum fluere naturaliter, cum possit ibi ob alitionem quiescere, vel etiam infra moueri, natura, vbi opus est, vt distensus, valvulas aperiente. Sed, quod maius est, huic experimento è diametro opponitur aliud Caroli le Noble, qui, discisso Receptaculo, vbi, per ipsam, etiam tubulum exinaniri; non ergo verum, quod deorsum non possit liquor ille tubi lactei descendere.

Experimen-  
tum huic ex-  
perimento  
oppositum

Responde-  
ret ad quin-  
tum.  
In deliquijs  
omnia ad  
Cor abeunt.

Quintum nec magis verget: nam in deliquijs, & cordis passionibus omnia sursum abeunt ad Cor: interdico ergo ei iunere perligaturam, non mirandum, si per inditè vulnus ab inferioribus succus ille ascenden- do, exeat, quod non fiet in corpore naturaliter se habente, in quo omnia seorsum naturam, & quiescunt, & moventur.

Responde-  
ret ad sextum.

Sextum omnino incredibile. Dispeream, si vnquam, secta Caua (ni sanguini intercludatur iter, vel ni prius totus effundatur) videre liceat, lacteum succum in sano homine à cruore seorsum, nec, si viderem aliud, quàm fallaciam circulatoriam crederem. Sed iam huic renunciare experimento, cum dicant, lacteum succum, vbi in axillarem decidit

## CAPVT DECIMVM SEPTIMVM. 77

venam, simul sanguini misceri, nec posse distingui; sic referente Iohanne Rioli, in suo Opere contra Pecquetum, & Pecquetianos.

Septimo eadem quadrat responsio, quæ supra data est primo experimento, & quinto, nempe quemlibet spirituofum succum patiente corde, versus illud concurrere; per ligaturas fluere non solum citrò, sed & trans originem; nec posse benè argui à violenta, & præternaturali operatione, vt est quæ sauciato animali accidit, ad naturalem, & spontaneam, quæ sano homini contingit.

Respondetur ad septimum.

A violenta ad naturalem actionem bene arguitur.

## CAPVT DECIMVM OCTAVVM.

*Adducitur Excellentissimi Torrini nuperrimum experimentum, & illud in propria sententia confirmationem trahitur.*

**S**ED omnium hucusque adductorum experimentorum euidentissimum illud sanè esse videtur, quod anno proximè elapso Taurini pluries produxisse fatetur Excellentissimus Bartholomeus Torrinus, per quod omnium oculis obiecit purum lac, seu chylum in Cordis dextrum ventriculum e thoracico tubulo per Cauam ingressum; vt propterea amplius dubitandum non sit, quin illa condecens sit chyli semita, prout tradiderat cum Bartholino Pecquetus; Cuius exercitij, verè sagacissimi, vt summa sinceritas, & simul energia melius intelligatur, mihi libet proprijs Illius verbis, sed è vernaculo in latinum idioma translatis, historiam, prout iacet in familiaribus suis ad Excellentissimam Marchellam datis, hic referre. Chyli ( inquit ) via ( sublato dubio, quod aliqua eius portio per mesaraicas vnà cum circulato sanguine ad lecur incedat, quod quidem non omninò inuerrisimile est ) patet ad Cor. Et ego in plusquam centum, quos secui, canibus illius progressum hoc modo intuitus sum: Exeunt lacteæ capillares, mirabilibus, & innumerabilibus intertextibus ditatæ, ab intestinis, illincq; in crassiores diductæ truncos, inmittuntur in magnam glandulam centrimenterij immediatè receptaculo hærentis in medio renum. Hinc plurimi ramusculi liquorem illum transmittunt in dictum receptaculum, sæpè à me repertum tribus purissimi lactis vncijs refertum. Via à receptaculo ad subclauias adeo nota est, vt nil magis. In his clarissima est lactearum insertio vna cum valvulis ad oscula intus positis, iam à Pecqueto notatis. Ab his equidem alia via non cernitur ad Cor, quàm Caua, per quam chylus simul cum circulato sanguine recta ad illud incedit. Sed, vt quilibet alterius viæ scrupulus adimatur, sic facio: Quemlibet canem, & qualibet hora post prandium ( quod parùm refert, dummodò vigesima quartam ieiunij horam non attingat ), dissecō, statimquè, minimè communia à proprijs tegumenta ieiungens, nè in laniena paucus ille chylus, qui inibi semper adest, raptim ad Cor conuolet totus, vt & alijs, & mihi contigit, quando

quando volui, vt sic dicam, prius decorticare, quàm scindere, id quod suafit, illa sola hora determinata chylum obseruari; Hinc sub clauiculas me conféro ad Spinæ, Aortæquæ finiftram, vbi fubafpicitur à folâ pleura canalis thoracicus inteftus. Sciffum illum leuiter, celetterquæ à pleuræ latere, ligatura constringo, eò tamen, vt poffit vinculum pro arbitrio laxari, quod commodè obtinetur ferreo inftrumento, ftudiosè fieri curato. Certior inde factus, non poffe chylum interim in venam fubclauiam introire, fcindo in ventre inferiore Cauam, Aortamquæ fubtus Renes ad hoc, vt totas ex vtrifque venis exeat fanguis. Ijs exanguibus redditis, Cauam immediatè infra Cor alligo, indeq; vinculum, thoracico appofitum foluo, vt chylus furfum valeat confcendere; Leuiquæ facta receptaculi compreffione, ficuti, & pertotum tubulum, totum illinc chylum in fubclauiam exire curo. Hoc perafio, dextrum Cordis ventriculum abfcindo, & ecce puri chyli inde copia egreditur.]

Septem in  
hac facti fe-  
ste ponde-  
rentur.

Hæc tota facti feries eft: circa quam tamen nonnulla mihi prælibanda, & ponderanda funt. Et primum, quod ibi nulla alia probatio, nulla alia coniectura producit, fuccum illum ab inteftinis in receptaculum progredi, quàm fimilitudo lacæarum venularum, quæ ab inteftinis in pancreas defcunt, cum ijs, quæ à pancreate in lumbare receptaculum implantantur. Secundum, quod fuccus in receptaculo inuentus lac puriffimum æmuletur, & eft. Tertium, quod quauis hora fecetur canis, dummodò viginti quatuor à pafu horas ieiunium non excedat, fuccus ille in receptaculo reperitur. Quartum, quod, vt ad Cor eat, compreffione, non in receptaculo tantum, fed & per tubum ipfum veluti manuducendus eft. Quintum, venas vtrafque prius reddi exanguës, & per confequens cor ipfum. Sextum, alligandam effe Cauam, propè, fed infra Cor. Et feptimum, ex Corde lac, feu chylum non commutatam in fanguinem, fed purum egredi.

Ex ijs rotidè  
ad propriam  
fententiam  
fifimandam  
eliciuntur.

His præponderatis, nonnulla, quæ ad noftram firmandam fententiam fummè faciunt, facile eft elicere. Et à primo quidem, non magis inde liquere, vtrum fuccus ille albus ab inteftinis in receptaculum tranfeat, quàm hinc illuc communicetur. imò potius vltimum fuaderi poffet: ij enim intertextus moram potius, quàm tranfitum, vel meatum, indicant. trunci præterea illi originem in pancreate portendunt, non in receptaculo; quo etiam, vel carent, vel longè alio homines potiuntur. Exiguitas quoque, & innumerabilitas ramufculorum potius irrorationem, nutritionemq; propriam, quàm publicum iter, oftendunt. Nifi forfan à neceffitate fuffima Natura ducta, ab his tenuiffimis viaculis aliquid trahere fatageret; quod in repentinis, & magnis diffolutionibus, & excretionibus immodicis, vel extremis poffe fieri, non eft ambigendū.

A fecundo, euident probatio, fuccum illum non effe chylum, eft, quod fit veluti lac puriffimum: Eft enim hoc in vberibus, in thymo, in omento, in glandulis alijs, alimenti proprii laudabile fupèrfium; nec

## CAPVT DECIMVM OCTAVVM. 72

in his omnibus, vtcunque sit, à ventriculo discedens colligitur, vt ad Cor sanguificandum ascendat, cum trans Cordis viam partes illæ sitæ reperiantur, & in ijs ille succus asseruetur continuè: Ergo de illo idem dicendum succo, qui in Laetibus reperitur.

A tertio verò deducitur, quod succus ille, ni laniena fiat, non est ad Cor iturus; Et hæc consequentia clara est: quia à sano ventriculo in quinque saltem horarum spatio coëctio peragitur; traductio inde raptim, & hora vna, vel altera completur, vt conijcitur ex noui cibi appetentia in pluribus: ergo ad hunc finem si in tales cauitates, ac meatus conijcitur, non est, vt ad viginti quatuor horas ibi asseruetur. Igitur aliquid necesse est esse, illis regionibus lacteis familiare. Nec hæc effugietur obiectio ex eo quod, animali dissecto, nisi tubus ille alligetur promptè, is ad superiora succus faciliè labitur: respondetur enim, tunc hoc ex sanguinis effusione, & Cordis angore prouenire: accidit namque, vt inanita vasa, & veluti famescens Cor vndique ad se quencunque aggregent succum, non tangendum forsan, si plena, & apto cruore donata degunt, vt quando sanum, & opportunè cibatum est corpus, in quo ad 24. horas is asseruatur.

A quarto elicitur, non esse illi succo talem viam familiarem, ac assuetam pro transitu ad superiora; cum egeat, vt veluti manu ducatur, & cogatur vsque ad subclauias venas; alioqui ex se ipso, vinculo soluto, euolaret, vt ante ligaturam fieri pretenditur, nec vlla pressione esset opus.

A quinto item desumitur, detegiturq; summa quædam necessitas tum in Corde, tum in venis omnibus vndecunque trahendi, nullo ad substantiæ degenerem naturam habito respectu, vt euenit famelico, qui cibi varietatem, vilitatemq; & sitibundo, qui alienigenam potus qualitatem minimè curat, multòquè minus si parùm ab assueto degenerent, vt à sanguine lac: proprium enim viuientis cauitatis est succum aliquem trahere, ne ex vacuitate concidere cogatur, maximèq; vbi vis naturalis viget, vt in laniato, cui nullus associetur præter naturam affectus: hæc autem omnia cessant, si naturali modo plena sint, quæ plena esse debent.

A sexto arguitur insuper, ex ligatura illa, Cauæ indita, cogi Cor, si viuere habet, vt à transuersis attrahat, cum ei naturalis via denegetur ex Iecore; quem admodum ventriculo vsuuenit, qui, vbi cibo fraudatur, à venis ijs, ad quas alimentum ille transmittere, vel veriùs præparatum permittere solebat, succum aliquem, & aliquando prauum, sugere cogitur; vnde vel appetitus sedatio, vel etiam fastidia exurgunt ijs, quibus hora solita cibandi per tempus considerabile contenditur. De cætero, vbi naturalia, directæ, & consueta suppetunt, quod aliena, indirecta, & insueta appetantur, quærantur, trahantur, inconsulti iudicii est, & à Naturæ sagacitate abhorrens.

A septimo tandem deprehenditur, quod in principio contendebatur, nimirum Cordi nullam sanguificandi vim aliam inesse, quàm eam, per quam iam factum sanguinem spirituosum magis, tenuiorem, calidior-

rem,

rem, ac viuidiorem reddere est potis: Alioqui non sic purum lac, in se ob necessitatem attractum, persisteret, quin aliqua saltem rubedine tingeretur.

Summa eorum, quæ ab experimento hoc deducuntur.

Ad quæ Auctoris exte-  
ndatur, & restringatur  
applicatio.

Ex his ergo, vt summarim colligam omnia, aptè deducitur, vel lacteū illum succum, qui tunc rapim confugit ad Cor, chylum non esse, sed earum partium superabundantem nutritioni succum; vel eam quidem viam chylo; (si modò chylus ille est) ad Cor traducendo non esse naturalem, & consuetam; sed tunc forsan summæ necessitatis violentia ductum, aliquid inde venari angustiatum, & ob angustiam deficiens Cor, vt longiusculam vitam, quamuis miseram, & cadentem, adhuc trahat, prout iam superius cap. 8. 10. & 12. ex Rioloano concessimus, esse posse: Nostra enim argumenta, nostraquæ contentio de solito chyli itinere pro sanguificatione, & nutritione naturali propaganda, fuit: quicquid autem ad aliquem alium totius corporis vsum, non per subclauias tantum, sed per vniuersam hominis compagem sit, vt vellet Bilsius, siuè vt prorefrigerio, siuè vt pro humectatione, & irratione inseruiat; & quicquid, extrema cogente necessitate fiat, id a nostro cadit intento, ad solam pro nunc officinam, motum, vsumuè sanguinis prostituto.

## CAPVT DECIMVM NONVM.

*Tolluntur Bartholini oppositiones de lactearum succo.*

Prima Barthol. oppositio.

Soluitur;

Nutritimenti vberitas quocunque tempore appareat potest.

**N**Vnc ad cætera dissoluenda, quæ contra sententiam nostram de Lacteis, deque earum succo adhuc aliquid facere videntur, accedamus. Soluendæ igitur sunt in primis rationes, quæ à Bartholino opponuntur in pag. 180. contra Harueium; quibusquæ videtur contendere, succum illum in lacteis, glandibusque repertum, non esse superfluum nutrimenti; tùm quæ pag. 182. per Ipsum probare nituntur, illum succum esse chylum, qui deferretur ad thoracicam lacteam. Et pro prima opponit, quod, si ab vberiore nutricatu superesset albus ille succus, vel appareret solùm finita distributione, vel semper, & in quolibet appareret; quod vtrunq; videtur experientiæ repugnare. Respondeo, neutrum horum esse necessarium, aut in talibus perpetuum. Non primum: quia vberius nutrimentum quacunque hora apparere potest, vt lac in mammis, semen in testium vasculis, sanguis in Corde, hepate &c. non secundum: quia si in inedia seruatur animal, vel in adipem superfuitas abit, illud superfluum omnium primò consumitur. Et hæc ratio est, cur in famelico, & in alio præpingui non fuerit dictus lacteus liquor ab eo inuentus. Quod si inistatur, solùm finita nutritione, ei apparendum esse, etiam hoc concessio, potest nostra positio sustineri: nam cum cibo assumitur, tunc finita est distributio, in vniuersas partes, & ideo ad alium cibum assumendum pro futuro alimento ventriculus incitatur: dum autem in ventriculo sit coctio, in cæteris quoque partibus sit, & ea finita,

## CAPVT DECIMVM NONVM. 81

finita, ad nouum attrahendum succum infurgunt; Et sic patet, quod tunc statim assumpto cibo, tunc finita chyli coctione, nutrimenta vbertas potest in partibus reperiri.

Sequitur; in vniuerso corpore concoctio peragitur: Cur ergo in solo abdomine magis, in thorace minus, in capite nihil de dictis lacteis tubulis reperitur? Respondetur, non in cuiuslibet partis coctione album succum gigni, sed pro diuersitate naturæ partium, diuersum quoque affluere nutrimentum succum; in ventriculo chylum; in hepate, & corde sanguinem; in liene atrum humorem; in testibus semen; in ossibus medullam; in vberibus lac, in omento, mesenterio, thymo, cæterisque glandosis, & adiposis partibus lacteum succum.

Repetit; Etiam in male habentibus, quandocunque in ventriculo coctio peragitur, dictæ lacteæ venæ in abdomine inueniuntur plenæ quasi dicat in his corporibus vbertas esse non potest: ergo succus ille nutrimenti vbertas non erit. Dic: Etiam in morbosis, dummodo facultas nimis imbecilla, tabida, & ex succa non sit, vltima coctione peracta, aliquid albi succi in determinatis lacteis adinueniri, minus tamen albi, vel aliquando etiam flauescens, quo magis, vel minus partes præter naturam affectæ sunt. Dic etiam, in huiusmodi tabidis via posse dictum succum inueniri, & quia parum sumitur, & quia vix concoquunt membra: in alijs vero morbidis corporibus, si facultas naturalis non admodum patiatur, & cibos assumi, & membra nutriri, & in illis dictum succum, vt dictum est, reperiri.

Subdit: Si pinguior chyli pars in lacteas exugitur, reliquum corpus optime nutrimento fraudabitur. Dic, non à parte pinguiore chyli, sed à concocto, & assimilato sanguine illud alimenti superfluum per Nos fieri. Ideo non fraudabitur corpus reliquum, sed vnaquæque pars, quod sibi magis placet, ac delectat, attrahet, & in sibi similem substantiam coquendo conuertet, vt ex ea, quod de substantia per continuum effluuium deperditum est, inflauetur.

Cætera, quæ ibi subiungit, cum ad nostrum casum minimè faciant, hic à nobis prætermittuntur. Addemus tamen eiusdem Authoris rationes, quibus probare nititur, album succum illum chylum esse, quæ duæ sunt. Earum prima sumitur ex continuitate cauitatum, & identitate, vel similitudine succi; Altera ex continuitate motus eiusdem succi, siue spectetur terminus à quo, siue terminus ad quem. Inquit igitur.

Continuus est cauitatum comeatus. Ex ventriculo per pylorum cremor candicans intestinis infunditur, de quo nemo dubitat. Ex intestinis tria vasorum genera excipiunt, venæ, arteriæ, & lactea vasa. Non venæ, quia primò nullum vestigium vnquam in ijs observatur dicti liquoris. Secundo venarum est vehere sanguinem, non chylum. Tercio venæ illæ circulationi inserviunt, vehendo scilicet sanguinem, ab arterijs adactum, ad hepar, & cor; quod ligatura conspicitur.

Quanto

Secunda oppositio eiusdem.

Solutio.

Tertia oppositio.

Solutio; Et in morbosis vberibus aliquid albi videri.

Quarta oppositio soluitur.

Primo Bartholinii ratio, quod lacteum succum chylum sit.



Quarto distincta sunt vasa lactea à venis; cum hæc semper rubeant, illæ candicent. Non arteriæ: quia his etiam, qui lacteas impugnant, indubitatum est id. Ergo lacteæ venæ solæ huic muneri dicatæ sunt. In hisq; eiusdem qualitatis, & candoris liquor, qualem coxit ventriculus, semper reperitur; qui quidem, etsi purior appareat, evenit, quia ab intestinalibus fæces feceruntur, & à lacteis angustioribus depuratur.

Altera ratio  
eiusdem.

Idem manifestè prodit dicti succi moti terminus à quo, & ad quem. Terminus à quo est ventriculus: hinc enim chylò scatent illæ venæ, quando chyli fit distributio, & successiva ventriculi coctio, alias nunquam. Terminus ad quem est receptaculum, & denique Cor: si enim conspectiores lacteæ ligentur, non ad hepar, sed ad dictam chyli lacunam videtur ire candidus succus, & inde ad subclavia, & Cor.

Solutur p  
ma ratio.

Hæc duæ rationes non magis cæteris hucusque tactis videntur. Etenim continuas vasorum nil pro ipso concludit: quia iam per ipsum sunt alia vasa præter lactea, quæ ventriculo, & intestinis communicant, sed continuantur, & non minus, imò magis, quàm ea, possunt attrahere, & reuera trahunt, prout tum Hipp.; tum Galen., tum Veteres omnes docent. Quibus novissimè Ludovicus Bilsius dexterrima Autopsia fidem ocularem addidit, dum sine cruoris effusione Canem benè passum in abdomine aperiens, ac arterijs colligatis, denudò consuens, & aliquid interim cardiaci liquoris ei exhibens, post aliquot horas iterum aperiendo, publicè monstravit, in mesaraicis cinericiu liquorẽ contineri, qui foras extractus ferè sanguinis instar congelabatur, vt non semel testificatus est Antonius Deusingius maximè *lib. de chyli motu num. 56.* & *disserat. Epistol. de hepatis officio ad eundem Thomam Barthol.* Nec dubium facit, quod nunquam in ijs obseruetur candidus succus: quia primò, vt modò diximus, si diligentia Bilsij adhibeatur, poterit inueniri; cum aliqui, si non reperitur, id eueniat, quia statim à cruore tingitur. Secundò nec dubium, quin lactearum ipsarum multæ sint mesaraicarum, & Cæuæ germina, sicuti iam ostensum est. Neque illud absolutè verum, venarum vsum esse sanguinem vehere: nam, & serum in renes, & bilem in cystim, sanguinis fæcem in lienem, lac à mammis, & ad mammas ducunt; tum succos omnes, ac excrementa in cacochimis, ac in crisiibus ad aluum, vrinam, ac sudores transmittunt; pro quo videatur *Gal. 3. de natur. facul. 12.* non ergo mirum, si & chylum, media hepatis, & propria vi trahunt tum ob aliquam cum illo sympathiam, tum ob alimenti defectum, tum ne in ijs detur vacuum; cum cætera omnes corporis venæ consequenter à radicibus alliciant; id quod pulchrè firmavit *Hippocr. lib. de carn. num. 12.* dum dixit: Venæ ex ventre, ac intestinis

Venerum  
vius non ad  
solum san  
guinem ve  
hantur te  
tingitur.

Venæ chyl  
ab intestinis  
attrahunt.

„ in quæ cibi, ac potus colliguntur, postquàm hi fuerint calscati, te  
„ nissimum, ac liquidissimum trahunt; crassissimum autem, ac fæx  
„ isthic relinquuntur, computrescitq; ac fit stercus) & hoc repetit *num. 13.*  
De circulatione, quatenus ipsa detur, dicendum est, eam huic chyli attrahioni non ob stare, imò eam mirè promovere: cum enim ad hepar san  
guinem

guinem à paucioribus arterijs adductum venæ copiosiores diduxerint, ne in ipsis detur vacuum, manifestum quod ab ijs per continuam cavitatem attrahetur proximus, & illis non dissonans succus, præcipue per ora illa, quæ non arterijs, sed intestinorum cavitatibus implantantur. Atverò, quod refert magis, eam circulationem non dari, abundè probabitur libro sequenti.

Distinctio quoque coloris nihili penditur: albedo enim omnibus venis propriè, siuè inseparabiliter inest, itaut, sanguine dempto, nulla inter ipsas, & nervos circa substantiam, & colorem differentia subsit. imò ex hoc Vesalius ansam arripit contradicendi Geleno in eo, quod dixerit, venas mesaraicas aliquam gignendi sanguinis virtutem habere: „nam alba (inquit) substantia quomodo rubrum succum ex albo efficiet? quod etiam Galeni argumentum est *lib. 6. de placit. Hipp. & Plac. cap. 8.* Sed inutiliter arguitur: quia, si legantur, quæ hic dixit *lib. 4. de usu part. 17.* videbimus, venarum proprium officium esse, vt chylum, & sanguinem deuchant, secundarium verò, vt ipsum ulterius concoquant; non gignant. Quare si mesaraicæ venæ à lacteis per colorem distinguantur, non id à propria substantia, sed à contento obtinent.

Sed & arterias modicum, quid in se ipsas de chylo assumere tùm ab intestinis, tùm à ventriculo, apud me dubium non est, qui ex hoc provenire tam citum vitalium virium robur ex assumpto cibo, ac spirituoso potu, procul dubio affirmo. Ex quo enim alio pulsus magnitudo, ac vehementia post moderatum cibum assurgit, nisi ex mutua nativæ caloris, ac cibi actione, & reactione per arterias adaugeatur, roboreturque; natus calor? Hanc arteriarum assumptionem ipse Galenus agnovit, „& docuit *lib. 4. de usu part. 17. bis verbis*: Et quod officia arteriarum „ad intestina pertingentia modicum quiddam cibi assumunt, plurimum „autem venæ. ] Sicuti & *lib. de natur. facul. 3. cap. 13.* post medium „Nutrimentum (ait) cum per tota intestina permeet; per vasa, quæ „ad ea pertinent, rapitur; plurimum quidem in venas; exigua quædam „portio in arterias. ] Sicq; concludit *cap. 14. in fine*: Non est ergo mirandum, si ex ventre prorsus exiguum, quantum scilicet exquisitissima „est confectum, in arterias venit. ] idquè non convenientia qualitatis, sed successione quadam ad earum dilatationem: per eam enim, quatenus etiam nutrirî postulant, in ipsas tunicas, quod conveniens est, attrahitur; & sic quod sanguinis in cavitatem earum est translatum, id vti sibi magis conveniens, tunicæ ipsæ in se attrahunt, vt nutriantur; prout statim in principio capitis decimiquinti idem *Gal. eod. lib. docuit*; Quod obiter hic annexere volui, ne quis ob id putaret illud chyli modicum pro nutritione ipsis arterijs inferuire.

Similitudo succi idem, ac continuïtas vasorum, operatur, nempe nihil, quia non datur, similem esse hunc succum ei, qui in ventriculo, aut intestinis est, neque in substantia, neque in colore non in substantia, cum is multò crassior, & compactior sit non in colore, dum is multoties sub-

Albedo non  
lacteis solum,  
sed omnibus  
venis pro-  
pria inest.

Etiam arteri-  
arum quid mo-  
dicum chyli  
trahunt.

Non tamèn  
eo, sed san-  
guine nu-  
truntur.

Sacri simili-  
tudo non  
concludit.

uiridia, aliquando fuscus, nonnunquam vinosus, quandoque subflauus, cernatur, prout magis in esis, potatisque supereminet talis, vel talis, color, & virtus: hic verò semper candidus, & veluti lacteus est. Repetit viuacissimus Barthol. pag. 188. quod, quamuis in ventriculo, & intestinis nonnunquam subuiridis, flauus, vel alterius coloris sit chylus: in lacteis tamen semper candicat; quia vel alieni colores à candore vincuntur, vel alienus color in intestinis cum sæce deponitur, vel lactearum angustia per vltiorem coctionem dealbat, vel rarò aperiuntur animalia, quæ versicolores cibos ingerunt: Non ei autem hæc valent subtrahere: Nam nullus alius color sic facile vincitur, aut inficitur, vt candidor, sicuti videre est in mistione vini ad aquam, atramenti ad lac &c., vel è contra: ab vtiâ enim vini aquæ libræ puritas, & ab atramenti paululo multum lactis euidenter tingitur: ad tres aquæ vnciæ vini libram, lactis mediocritas multum atramenti vix excolorabunt. Vnde sicuti non ea valet exceptio, in lacteis candorem alios chyli colores euincere; ita nec valet iaculum, quod contra mesaraicas venas retorquetur pag. 189. de illarum perpetua rubedine succi, etiamsi chylum eas exugere, a nobis supponatur: quia, vt dixi, rubedo non sic facile à candore, vt à rubedine candor decoloratur.

Alienus color enim fa-  
cibus non  
deponitur.

Neque alienus color cum faecibus deponitur, aut ab intestinis in candorem vertitur: non primum enim, quia idem color, & crassas, & tenues eiusdem substantiæ partes comitatur, vt in sanguine videre est, quæ totus, vel magis, vel minus rubescit. Non secundum; quia licet aliquid alterationis possit chylus ab intestinis recipere, vt Galenus asserit, id tamen intelligendum de portione ab ipsis retenta, non de ea, quæ à venis surripitur. Et iam supra dictum est etiam in intestinis ipsis chylum virefcere, rubescere, fuscum esse &c.

Ne lactearum  
angustia  
colori inuadit.

Nec lactearum angustia potest candorem impartiri, nisi per coctionem, quæ in solo, citatoque transitu, qualis ex aduerso supponitur, fieri non datur; & quicquid sit de remotioribus, vel glandulis ipsis, saltem in vicinioribus non albicaret.

Nec verum denique, rarò aperiri animalia, quæ versi colores cibos assumunt; siquidem, si quod aliud animal, homo ipse diuersissima cibaria, potulentaque deglutit: tum & boues, equi, & alia pecora nonnunquam viridi herba vefcencia chylum viridem in ventriculo, & intestinis continent, viridia excrementa deponunt, & tamen in omnibus, si rectè valeant, non minus, quàm in homine, candicat glandularum, venularumque propositus succus. Ergo non ea similitudo adest, quæ supponitur. His adde, quod idem Bartholinus aliquando definire non audet, an talis succus chylus sit, an potius lac, vt arbitratur Hæuius: Si ergo lac, ergo per coctionem peculiarem, non per merum transitum, vt sua, & Pecqueti est positio.

Altera autem  
Bartholini ratio.

Altera autem Bartholini ratio, à motu chyli desumpta, iam fuit præ parte soluta antecedenti capite, & fusiùs videbitur libro secundo: ibi enim

## CAPVT DECIMVM NONVM. 85

enim videbimus, quid ligaturis, & quid suorum motibus in emoriente animali concitatis credendum sit: Hic autem auneitur, & hoc argumentum, Ventriculi coctionem non à parte post partem, sed simultaneâ fieri, vehementer pyloro ocluso, dum ea perficitur, & solummodo recluso, quando perfecta est, prout veris, & indubitatis anatomicis signis, demonstrauit *Gal. lib. 3. de nat. fac. 4.*, & ut vniformis chyli substantia, quæ alias talis non esset, confirmat: Ex hoc ergo, quod statim, assumpto cibo, & dum in ventriculo adhuc sit concoctio ex ipsorum Auctorum dictis lacteæ venæ videntur albo succo refertæ, id verè contra ipsos (opinione mea) aperto Marte pugnat, ipsosquè conuincit apertè, illum non chylum, sed alium mesenterio congenitum succum esse: Quinimò, quamuis ipsi daretur, aliquid tenuis antè perfectam coctionem ad intestina descendere, cum id paululum, sit, nec illorum ideo cavitatem dilatet, potius pro eorum irroratione deseruijet, quàm secus.

*Concoctio in ventriculo non partim, sed simultaneâ fit.*

Experientia item, qua supponunt, per ligaturas mesaraicarum non impediri chyli motum in lacteas, per ligaturam lactearum chylum in intestinis resistare, non solum inueneri similis, sed & incredibilis est: Quæquæ enim, quomodo chylum in lacteas moueri videntur? an quia sint pellucide; velut vitrum, ita ut intra ipsas succus fluere videatur? non sic esse, manifestum est, quia color lacteus, & pinguis species potius lumen obdurant. An quia ligatæ turgent? id etiam in sarciminibus demissis videtur, quæ per ligaturas turgida sunt; Et ex anxia volutione macerati animalis potest quoque vi exprimi id, quod aliqui nunquam moueretur illuc. An quia fecentur, & sic liquor exeat? At non potest venire à comitibus vasculis? Sed & quis distinguet, an succus ille per lacteas ad hec cunctas, an ad receptaculum; an per utraq; migret? Et cur ligatis lacteis, in mesaraicas non transfluit dictus liquor? nùm negabunt ipsi, à mesaraicis in Portam cruorem fluere? si sic, iam de eorum circulationis vanitate conuincuntur: Sin minus, quis attestari possit, cum cruore chylum quoque non irruere? Sed & quis Argus tunc obseruabit, ab intestinis chylum non attrahi, sicuti è contra in alijs iam dictis vasculis fluere? Annè intestina aperta tunc oculis panduntur, & ab ijs fugi, ab his non fugi conspiciuntur? Incerta nimis iudicia, quæ in fugacissimis experimentis, & quæ facile in diuersas possunt reduci causas, fundantur. Vnum hoc è contra concludet, si è lacteis alba fluunt, dum in intestinis aëu viridia, vel flaua morantur.

*Expenditur experientia.*

## CAPVT VIGESIMVM.

140

*Quæ à dictis Auctoribus contra Galeni rationes pro hepatis sanguinis ministerio, opponuntur, & eorum solutio.*

**R**Estat modo, ut quæ primævis Galeni rationibus primo huius libri capite adductis per hos Auctores opponuntur, expendamus ad hoc,

vt hepatis pristinus splendor adsit, & in sanguificandi munere integretur. Itaque contra primam Galeni rationem, quæ similitudini plantarum innuitur, obijci ex Bartholino potest, non melsaricis venis convenire radicem analogon, sed lacteis primo non his solum, sed & ventericulo, in intestinis, tubulò thoracico, & cordi ipsi, ac omnibus in summa coctionis, distributionis, & delationis ciborum, chyliquè instrumentis, vt videre est apud ipsum in expensione sententiæ Harueij pag. 187. & 188.

Idem refutatio,

Qua obiectione nil inuicem similius dici poterat: si enim microcosmos homo dicitur, non solum radicem, sed & terræ eiusque eterogeni succi, ad omnia alenda membra viuacitiam idonei, analogon in se contineri, & comprehendere debet: quæ autem analogia ori, ventriquè conuenit cum radicibus plantarum in mille capillaria filamenta desinentibus, terræquè infusis, si solarij ductus, & à Solò se iuncti conspiciuntur? Quare prudentius Hipp. lib. de hum. num. 4., & Arist. 2. de part. anim. 3. alium in homine fungi terræ officio deservierunt, vti à qua sugentes venularum ductuli, quæ sibi familiaria videntur, ad securrunt, tamquam trunci principij deferunt, ut videntur tota, & disposita rursus, in cetera omnia membra alimentosa demandantur. Sicut enim terra, vt ait Hipp. lib. de nat. hom. num. 10., & 11. continet in se acidum, amarum, dulce, salsum, & omnigenum, ab eaque Solis auxilio, eadem disponuntur, vt vnumquodque satorum trahat id, quod sibi, sed naturæ suæ magis familiare est; Sic in stomacho, & intestinis cuncta, acidum, amarum, dulce, & omnigena alimenta, ea loris à Corde, vti à Sole, influentis auxilio, sic fermentantur, disponuntur; vt ad quælibet per communes radices, ac riuulos alenda membra delata, ad inferuiant, vt trahat vnumquodque, quod sibi familiaris extat: Lacteis, vti quæ sparse sunt, nec in communem stipitem desinunt, nequaquam radicem analogia competit, sed bene melsaricis, quæ ordiatæ à tectore per stipitem congruum prodeuntes, eousque diuancantur, expanduntur, & exilesunt, vt earum simul sumptarum figura verè arborum radicationi adapteatur: Lactæ autem ramusculorum sunt potius soboles, quæ ab alijs diductæ venis, in glandulas, pinguedines, variasquè membranas partes terminantur, obliquantur; Sed quid de Corde audio? Huius quidem præcipuè inter servilia membra adnumeratio incongrua prorsus cernitur: per illud enim totus vivit homo, ex eo cuncta bona dimanant, & ad illud cuncta, quæ in animato corpore sunt, libenter, ac congruè referuntur.

Obiectio contra secundam Gal. rationem.

Contra secundam Galeni rationem, qua dicebatur, hepatis figuram, structuramquè valde facere ad sanguinis generandi ministerium probandum, obijci, seu responderi potest, eas non magis chyli coctionem, & sanguificationem, quam sanguinis ad ipsum redeuntis parolationem, cuiusquè ab excrementis expiationem arguere, ac indicare: Sed non minus vana est hæc obiectione, seu responsio, quam superior: Ad quid enim hæc percolatio consista inferuiet post sanguinis reditum à nutritis partibus? Si ad Cor iterum redire debet, & ubi illuc perveniat, chyli filia à subclavijs

Responsio ad eandem.



à subelauis descendens miscetur (vt à ijs, falsò licet, supponitur) ergo percolatio de vento erit riam enim nutritæ sunt partes; iterum chylo inquinabitur sanguis. Præterea: an totus à circulatione rediens sanguis per hebartransibit? Qui ad caput, brachia, pectus, omnesque à lumbis infra positas partes fluit, an per ipsum percolandus itabit? qua via? & cur? vt bilem deponat? illi alia via generalis aperienda erat, non per Portam, quæ aluinis tantum partibus, ac regionibus inseruit; hæc antea erant peragenda, non post reditum. Sed quod magis mirandum, dum Cor nobilitare hi automant Authores, illud seruire, & veluti mancipium faciunt; dumque lecur opprimere, ac sepelire vanè putant, illud eleuant, Cordi præponunt, ac vltimam sanguini manum dare, perhibent. Non mirum tamen: quia si præpostere sanguinis genescim, & motum ponunt, sic etiam illius depurationem disponere debebant. Nobis autem, qui Veterum calcamus vestigia, non quidem Cor chylum coquere, sed lecur; non hoc colare, sed purificare sanguinem, sed Cor est asserendum.

Contra tertiam item Galeni rationem obijcitur ex Bartholino lib. *Defens. aduer. Riol. pag. 152. & 153.*, ruborem illum hepatis purpureum non ex sanguinea eius substantia, sed ex sanguine ibi superfluo, & percolando deuenire, eique per accidentis inesse. Inane responsum: quia non iccoris parenchyma, sed illius venæ arteriæque sanguinem conueniens, & Cor iuxta illius doctrinam sanguinem producit, perficit, ac in se continet; venæ, arteriæque sanguine semper scatent, sanguinem vehunt; & tamen nec hæ, nec illud talis rubedinem nanciscuntur. Patiatur ergo Bartholinus adeo rubicundum præ cæteris partibus iccor esse, quia ex sanguine minimum immutato eius constat substantia; quod cum ita sit, iure dici potest, ab eo verius, ac facilius, quàm à quouis alio membro; chylum sanguificari. At (inquit) omnis etiam musculus ex affluente sanguine rubicundum nitorem demonstrat; nec tamen sanguinem gignit. Fallitur: quia, si sanguis ritè extrahatur, caro omnis, & musculi, in iugulatis animalibus, & maxime in auium; pullorumque genere albicant, præter lecur, quod semper sanguinis colorem, & substantiam æmulatur. Repetit, non omnium animalium lecur adeo rubescere. Conceditur: quia neque in omnibus sanguis æquè rubicundus est; sufficit autem, quod in vnoquoque animalante iuxta speciem, ac naturam suam hepar sanguini in eo contento omnium partium simillimum sit; id quod in Orbe pisce ab Eo nominato optime discernitur: in eo enim si lecur minio non cedit, nec lecur minium excedit.

Contra quartam nil aliud offerri ex eiusdem, & sodalium mente potest, quàm venas totius corporis ad nil aliud inseruire, quàm ad sanguinem ex nutritione residuum reducendum ad Cor, & ideo nil interesse, siuè à iccore, siuè à corde dicamus, eas exoriri. Verum sequenti libro demonstrabimus, ex Priscorum mente, congruentia, & ratione, Venas pro deferendo toti corpori alimentitium sanguinem deferuire, sicuti, & arterias

Obiectio contra tertiam Galenionem

Refellitur.

Lecur est sanguine minimum immutato gignit

Musculus sanguine ritè extrahitur, albicat.

Obiectio contra quartam

Responso ad eandem.



arterias pro natui calidi, spiritusque vitalis influxu esse; Et ideo illas subtiliores, moliores, capacioresque ac rariores, ut faciliè, & affluenter sanguis ab ijs refudet; has verò crassiores, densiores angustiores, ac densiores, nè nimis faciliè spiritus transpiret, dispergatur, & euaneascet, à Deo conlitas fuisse. Et sic in sui vigore vis remanet argumenti.

*Obiectio contra quintam.*

Contra quintam ex iisdem obijcitur, negando, venas emulgentes renibus inferre ad serum trahendum, splenicumque ramum lieni facalem sanguinem offerre; sed utraque vasa ad sanguinem ijs partibus superfluum cordi referendum pro circuitione ab Harueio disposita, inferuire, asserendo. Vtrunque se res habeat, (quamvis ex professio de dicta circulatione in sequenti disputabitur libro) illud pluribus in confesso est; renes serum expurgare, lientem verò succum melancholicum; quod suè per assignatas vias, suè per alias consequantur, illud nobis sufficit, utrunque viscus (sicuti, & cystim felleam probe) hepatis proximum esse, ideoque ab eo succos prædictos faciliè absorbere, non quidem omnimodè (cum eorum purior portio ad nutritionis complementum sit opportuna); sed pro maiori parte, Quæ de Corde dici non possunt, cui nullum expurgatorium membrum sic proximum est.

*Obiectio contra sextam.*

Ad sextam dicunt, nil illam valituram, dummodò euincatur, chylum non ex parte iecoris, sed ex thoracico tubo per subclauias venas in Cavam, & Cor peruenire: sufficit enim, ut ab hoc per arterias ad partes nutriendas demandetur, & inde per venas redgatur, prout circulationis leges volunt. Respondeo: si illud euincerent, sique probarent, per arterias ad partes nutriendas deferri humorem, ab ipsis ratio esset: Sed nec primum, nec secundum euincunt. Non primum: quia sanguificando chylo inconcussam manere iecoris semitam, sicuti, & alteram tubi thoracici impuissionatam, & incongruam, sat hucusque monstratum est. Non secundum: quia per venas nutritionem ferri, prodidere Medicinæ Magistri, in sequenti libro monstrabitur, nec lunium tonitrua quicquid hanc labefactant positionem; Et sic in suo robore ratio manet, venalem sanguinem à Iecore pro liare, ab eoquè naturaliter procreari.

*Responsio ad eandem.*

## CAPVT VIGESIMVM PRIMVM.

*Quicquid contra Veterum auctoritates dicunt, impugnatur, & ad bilem fecernendam non esse dicatum Iecur, ostenditur.*

Contra auctoritates Veterum strepit Martinus Bogdan in suis Insuper dijs detectis pro Bartholini Vasis lymphat; ubi asserere non veretur, Vetere, tum Medicos, tum Philosophos nunquam hepatis sanguificationem assignasse. Et primò aduocat Hippocratem, qui lib. 4. de morbo dixit, hepar quidquid bilis est, trahere, & lib. de cord. in fine natuum calorem, qui in sinistro cordis ventriculo est, à proxima sanguinis cisterna alimentum sumere. Platonem quoque in Timæo venis sanguinis

sanguinis gignendi officium, non hepati, attribuisse, scribit. Aristotelem etiam *lib. 3. de hist. anim.* docere, ait, à vena Caua duos ramos produci, vnum ad omentum, alterum ad Pancreas.

At quid subriceam, Galenum ipsum inclinare alicubi in sententiam nedom Aristotelis, sed & Pecqueti? Videatur *cap. 16. lib. de ther. ad Pis.* „ vbi hæc leguntur: Nam quando fortis fuerit natura; tunc, & venter „ expeditè cibos concoquit, & venæ sanguinem faciliè producunt, & „ iecur promptè bilem fecernit, atque ita defæcatum sanguinem Cor „ suscipiens, ipsum deinceps vniuerso corpori iam nutriendo idoneum „ submittit.]

Sed hæc in vanum offeruntur: nam, vt dictum est, supra *cap. 2., & Hipp.*, & Plato hepati chylum coquendi, ac sanguificandi officium assignauere, nec Cordi aliud, quàm sanguinis spirituosissimi, seu natui caloris præparationem, & instaurationem tribuerunt. Neque Aristoteles in rerum summa dissentire videtur, vt in fine capitis tertij tactum est. De Galeno adeo certum, vt de illo dubitare, potius ridiculum sit, quàm serium. Idem quoque Auicennæ cum suis Arabibus placuisse, neminem, credo puri ingenij latet.

Et quod ad Hippocratem spectat, *Is lib. 4. de morb.* nequaquam dixit, hepar trahere bilem: sed huiusmodi munus folliculo fellis attribuit.

„ Ipsius oratio sic habet: Et sanè sanguinis fons est Cor, pituitæ caput, „ aquæ splen, bili locus folliculi in hepate. ] *Sub num. 8.* sic: Nunc verò „ dicam de bile, quomodo, & cur copiosior in corpore fiat, & quomo- „ do locus folliculi in hepate ipsam trahat. ] *Sub num. 13.* Quin, & hoc „ ita se habet, quod ad folliculum in hepate sola bilis à cibis, & potibus „ secernitur: venulæ enim, cum debiles, & tenues sunt, alium humo- „ rem trahere non possunt. ] Neque ex eo, quod ibidem dicit, sicuti, & „ *lib. de Cord.* fontem, & cisternam sanguinis Cor esse, ideo sanguinis con- „ ficiendi munus Cordi assignauit; qui imò *num. 8.* iam citato non obscurè „ annuit, secundam cibi coctionem in hepate fieri his verbis: Postquam „ comedit, ac bibit homo, aliquid amari, quodquæ biliosum, ac leue est, „ copiosior etiam bilis fit in hepate. & statim dolet hepar, quod pueri „ cor vocant; atque hoc ita fieri videmus, & clarum nobis est, quod à „ cibo, aut potu factum est: trahit etenim corpus in seipsum de cibis „ omnem prædictum humorem. Trahit enim folliculus in hepate, „ quicquid isthic biliosus inest. ] Quomodo autem generatur bilis in „ hepate, nisi ibi fiat concoctio? Manifestum item, & hoc fit ex ipsis no- „ minibus fontis, ac cisternæ, quibus Hippocrates pro Corde utitur: nam „ fons nil aliud significat, quàm aquæ salientis manifestam eruptionem, „ quæ non ibi gignitur, sed aliunde per terræ venas continuè suppedita- „ tur; sicuti cisterna aliud non est, quàm aquarum aliunde quoque pro- „ uenientium in vno reductu collectio. Quibus si seria addatur obiectio, „ libros de morbis non esse verè Hippocratis, omnino tollitur vis adductæ „ auctoritati. Et id facillimè patet: quia multa ibi continentur, quæ

Hipp. hepatis  
munus tra-  
hendi bilem  
non assigna-  
uit.

Fontis ac cisternæ san-  
guinis nomen quomo-  
do Cordi ad-  
plicatur.

ipſius ſapientiam, & alibi dicta non redolent; ſicuti liquet in pun-cto, dum hic inter quatuor nutritios homines reponit aquam, quæ purum excrementum eſt, & ſolummodò vehiculum cæterorum; Et tamen in alijs genuinis libris non ſemel ſcripſerat, quatuor humores naturam hominis conſtituentes eſſe ſanguinem, pituitam, & utranque bilem, ſſauam ſcilicet, & atram, vt in *lib. de hom. ſtru&.* 1., & *de nat. hom.* 8.

Plato, quamuis non ſemel venis virtutem ſanguinis coquendi (prout & Gal.) attribuerit, non tamen id propria earum virtute fieri, perhibuit; ſed imò id eas obtinere à concupiſcibili animæ parte, cuius ſedem in hepate conſtituit, ac veluti ad præſepe ventri alligauit, vt teſtatur multoties Gal.

Ariſtotelem porrò dixiſſe conſtat 3. *de hiſt. anim.* 4. à Vena maiore alias duas propagari venas, vnā ad omentum, alteram ad Pancreas: Sed vel Lippis conſtat, illum non valde Anatomicam calluiſſe peritiā, ſicuti, & ipſe de alijs illuſusque eueniſſe, reſert *cap. 2.* maximè in venarum dignotione perdifficili, vt quæ in mortuis, effuſo ſanguine, languſcunt, & collabuntur. Vel melius dicendum eſt, laſteas venas pro parte aliqua Cauæ inſitas, ipſius eſſe germina iuxta Ariſtotelis mentem, itaut eiſdem ſint generis cum alijs venis. Quomodoſcunque ſit, hoc non repugnat cæteris, quæ de hepate alijs in locis dictauiſſis ipſe.

Galenus autem adducta ſeries, ſi benè ponderetur, nec Cordi ſanguificationem præſcribit, nec fauet hepatis ad bilem ſecernendam relegationi. Non primum: quia cum dicit, Atque ita deſecatum ſanguinem Cor ſuſcipiens &c. Imaniſtè inferit, non inibi produci, ſed aliunde ad illud venire; ſicuti, & venas ſanguinem facilè producere, poſeſt intelligi, ac ſi diceret ducere, ſeu vehere, vel ſi perſiſtatur, intelligi de productione, ſeu generatione, quomodo ſumi debeat, ex profeſſo declarauit ſæpè *ait. 6. de placit. Hipp.* & *Plat.* 8. Non ſecundum: quia bilem ab hepate ſecerni nò excludit illius in ſanguine procreando facultatem; imò illam euidenter includit; excrementorum enim ſecretio coſtione præſupponit, ac ſequitur. Quicquid autem ſit, mihi ſemper placuit Authorum ſenſum ab Operibus, vbi ex profeſſo de re aliqua tractant, non ab ijs, vbi incidenter de ea aliquid dicitur, expiſcari: in his enim ſufficit, non oppoſita inueniri, eaque tangi ſolum, quæ ad ibi intentam faciunt poſitionem.

Quod hepa-  
tis officium,  
non ſit bilis  
ſecretio, ratio  
lo prima.

Bartholini  
reſponſio di-  
uelliſſa.

Sed quod magis reſert, eſſet contra rationem, quod tam magnum viſcus pro ſeparanda bile fabricatum fuiſſet. Et quamuis huic rationi reſpondeat Bartholinus *pag. 155.* magnitudinem partis non indicare eius officij magnitudinem, ac vim, eo quia Corde maius ſit inteſtinum rectum, oculoque podex; quorum tamen utrunque illis nobilitate cedit; quiniò quò membrum mole maius, eò magis ſeruile dicendum ſit, cum & in hominibus ſæpè in exiguo corpore magna virtus, in magno ingens vitium adſit: Attamen in hac ſua reſponſione multipliciter peccat. Primum confundendo magnitudinem, ſeu operoſitatem actionis cum eiſdem

# CAPVT VIGESIMVM PRIMVM. 91

eiufdem nobilitate; quæ valde differunt, cum poffit, imò foleat nobilior actio exerceri à paruo, vt difcurfus ab homine, operofior à magno, vt onerum fubleuatio ab elephante: hic autem à nobis magnitudo actionis fumitur pro ipsius operofitate; & fic benè infertur, & conuertitur, ad eam, efficientis magnitudinem, & ad hanc, actionis operofitatem fpectare: vnde videmus, pro bile felleam cyftim, pro ftercore inteftina, pro vrina veficam fabrefactam effe, vt fcilicet excernendi contenti quantitati continentis, ac excernentis magnitudo refpondeat. Secundo confundendo magnitudinem partis cum capacitate ipsius, quæ valde diuerfa funt: nam magnitudo eft fecundum tria dimensionum genera, fcilicet fecundum corpulentiam magna quantitas; capacitas vero potius ad latitudinem, fcilicet extensionem: hic verò à nobis magnitudo propriè fumitur; & ob id non aptè refpondetur, rectum inteftinum Cordi magnitudinè præftare, cum potius dici debeat capacitate, fcilicet latitudine, fecundum quam non magnitudo actionis, fed quantitas contenti arguitur, prout de vtero, veficâq; dici poffet: at per illam, aptè magnitudo actionis monftratur, vt exemplo cerebri, cordis, renum, lienis, pulmonisq; patet. Tertiò confundendo feruilitatem cum operarum, virtutum, gratiarumq; impartitione: fi enim quò quis magis alterius commodo operatur, inuigilat, & impertit, eò feruilius dicendus effet, & Cor in corpore, Rex in Regno, Dux in Republica feruilius appellaretur: Sed quia differt à feruitute gratia, imperium ab obedientia, elargitio ab acceptione; ideo & Cor, & cerebrum, & hepar, quamuis magis corporis vitæ, & gubernio infudent; omnium tamen, & propterea, paruum principaliffima cenfentur, & funt, ficuti, & Rex, Duxq; in Populis. Quarto confundendo cum viribus corporis animi vires; & tamen certum eft, diuerfiffima hæc effe: quia fi de animo dicamus, non incompetit corpori exiguo, & imbecillo ineffe magnam animi vim, & magno validoq; paruum: at fi de corporalibus viribus agatur, planum eft in maiore corpore maiorem, in minori minorem vim adeffe, vt de homine, & paruulo, de Viro, & Gigante conftat: Hic autè de naturali, fcilicet corporea vi agi, non de animo, certum eft. Quinto comparando membrum, quod ab alio membro differt fpecie, cum homine, qui refpectu alterius hominis Solo indiuiduo differt; quæ comparationes funt incongruæ: nam fi eiufdem fpeciei aliquid fola magnitudine, aut alio accidente differat, nil quoad hoc maioris, vel minoris conditionis erit: nec enim homo magis, aut minus propter hæc accidentia dicitur; & fic hepar hepate non dicitur nobilius, fiuè maius, fiuè minus fit: (quamuis quo ad valorem etiam aliqua in eadem fpecie iuxta maiorem, vel minorem magnitudinem poffit confiderari differentia, vt fuprà diximus.) At fi conferatur hepar cum glandula, vena, neruo &c.; homo autem cum Elephante, equo, Camelo &c., planum erit, ad maius robur hæc animalia, quàm hominem; heparq; quàm altera membra, natum effe; & fic molem corporis magnitudinem operationum indicare.

Actiois epe  
robis ab  
eiufdem no-  
bilitate dif-  
fert.

Magnitudo  
partis, & ca-  
pacitas di-  
uerfa funt.

Seruilitas, &  
grauitudo im-  
partitio dif-  
ferunt.

Corporis, &  
animi vires  
differunt ma-  
ximè.

Speciei com-  
paratio an  
indiuidua id  
congrua eft.

Magnitudo  
operationis  
à magni-  
tudine mem-  
brorum  
indicatur.

Ergo nè incongruum Bartholino videatur concedere, magnitudinem operationum à magnitudine membri ad eam dicati elici, & indicati: Sicuti enim ad ferenda magna onera non canes, non lepores, non formicas; sed Equos, Elephanteq; & canendo è contra non hos, non Camelos &c., sed cicadas, philomenas, pueros &c. Natura dicauit; ita in corpore magnis operibus magna viscera, minoribus minoribus præfessisse, existimandum est; cum aliqui nobilitas actionis ab ipsius vi, & intentione differat. Et sic, sicuti non inconuenit, hominem Elephanti ob rationem, lusciniæ cuculo in cantu, ceruum sui in pulchritudine præualere (quamuis robore cedant); ita, et si hepar sua magnitudine operositatem, qualis sanguificatio est, maiorem multò, quàm sit bilis secretio, præferat; cedit tamen nobilitate rationis cerebro, ratione vitæ Cordi: Restat igitur in suo vigore ratio, quod deformiter Natura genuisset hepar adeo magnum, si sic paruæ actioni, qualis pro purganda bile ab his Viris egegijs supponitur, præesse debuisset.

## CAPVT VIGESIMVM SECVNDVM.

*Examinantur officia à Pecqueto, & Sequacibus Iecori attributa,  
& respondentur.*

Quod Iecoris  
officium  
non sit bilis  
secretio, Ra-  
tio secunda.

**S**ED postquam huc peruenimus, non incongruum erit examinare officia, quæ loco sanguificationis Iecori attribuit Pecquetus. Ea fuere quatuor, quorum vnum, & præcipuum cum sit dicta bilis secretio, hic parumper insistendum est: nam vltra supra allatam rationem dictum officium elidentem, alia euidentior est, quam assert Riolanus; nimirum Quod si huic Iecur incumberet actioni, in flauum eius purpureus tingeretur color (& tamen rubicundum cernitur, ac sanguineum); nec esset esu suaue, vt est, sed amarum. Quæ ratio optima est; qui enim trahat picem, inquinatur ab ea, & quæ aliquid electiuè trahunt, vel ob similitudinem, vel ob escam trahunt: Videtur ergo lien obscuri coloris, saporisq; aciduli, quia succum atrum imbuit, ac secernit; & quia talis cernitur, talem etiam succum contrectare arguitur. Flauescit, vel virefcit felle vesicula, simulquæ amarescit, quia simili humore imbuitur, ac nutritur; & quia talis visitur, id quoque conijcitur.

Obiectio Bar-  
tholini con-  
tra eam tol-  
litur.

Nec se ab hac extricat ratio Bartholinus pag. 154., dum dicit, Iecur flauedine tingendum fore, si bilis in ipso detineretur: sed, inquit, expellitur ab eo: respondetur enim, quod, si sit pulsio, ergo secretio eam præcedit: non sit autem hæc nisi post coctionem, & sic per eum fiet sanguinis coctio, quæ vera, & princeps actio Iecoris erit; bilis verò pulsio consequenter, & per accidens; Vel per quandam colationem, & à sanguine iunctionem fit; hæc autem non nisi vnius retentione, & alterius repulsione fieri potest: cum ergo pellatur bilis, retinebitur sanguis: Atuerò hic non retinetur, sed Cauæ dimittitur: Ergo nec bilis per pulsionem ab

## CAPVT VIGESIMVM SECVNDVM. 93

eo fecernitur; Et sic per attractionem fieri, esset necesse, quæ similitudinem supponit, aut eam.

Repetit ille, ob id quandoque illud flauescere, vt in mastatis animalibus non raro visitur. Sed respondetur, si aliquando flauescit, id euenire, vel quia Iecur ægrum est, & à bilioso succo obfessum; vel ob excandescentiam eius caloris, qui bilem nimiam gignat; vel quia obstructam sit cystis viaculum; vel quia hæc indiuisiōne, vel scissione iecoris rupta, aut vulnerata est. Et illorum indicium est, quod vbi flauum iecur cernitur, caro quoque, & pinguedo, vel flauescunt, vel extenuata sunt; vel vacua cystis inuenitur, & peruia.

Altera eius-  
dē obiectio  
collitur.

Nec minoris momenti est alla Riolani ratio, Quod si Natura hepar ad bilem fecernendam destinasset, in quibuslibet animalibus ei fel addidisset: vnicuique enim parti Natura donauit, quæ ad suam primariam actionem perficiendam instrumenta necessaria videbantur: Est autem vesica fellea bilis euident receptaculum, & expiatorium; ergo cuiuslibet hepatis adnasci debuisset. Et tamen videntur in multis animalibus iecora „ carere felle. Vnde *Arist. lib. 2. de hist. anim. cap. 18.* sic dixit: Iecur „ magna ex parte, maximoque animalium numero felle caret. ] *Ex lib. 4. de part. ani. ait,* etiam nonnullis hominibus fel deesse.

Ratio tertia  
ad idem.

Quarta ratio est, quod frustranea, & intempestiua esset huiusmodi hepatis actio: nam cum per hepatis venas sanguis solum recurrendo, ab aliis iam partibus dimissus, perueniat, (vt iidem volunt Auctores, & qui circulationem sanguinis profitentur); qui verò per arterias ad alendas partes confluit, nil gratiæ possit à iecore, cuius solum causæ parti arteria, vt ait *Vesall. lib. 5. cap. 7. in fine*, exporrigitur, mutuari; constat, nutritionis opere completo, irritam fore dictam bilis seiunctionem; vltra quod is solum expurgaretur sanguis, qui ab abdomine per portam reuertitur, reliquo, qui per cæteras vagatur partes, ab ijsq; ad Cor regreditur, impuro relicto, quod esset incongruum, & mutilum, prout, & iam supradictum est *cap. 18.*

Ratio quarta

Hæc autem ratio valet etiam ad refellendum alterum iecori arrogatum officium colandi sanguinis, vt quod, & frustra, & intempestiuum, & imperfectum iisdem de causis esset; præterquamquod hoc esset iecur supra Cor (cui tamen dignitate cedit) eleuare, non deprimere, vti falsò autumant ei lugubres Næniæ occinentes; quemadmodum eodem *cap. 18.* tetigimus.

Officium em-  
landi sangui-  
nis eliditur.

Ridiculum verò nimis est tertium officium ipsi à Pecqueto adscriptum, nempe quod gerat vicem pistilli succutientis ventriculum, & intestina, sicq; chylum in lacteas impellentis: Nam præter id, quod incongruum prorsus esset, Naturam huiusmodi violentum impellendi modum in viuum animal introduxisse, cum ei non desint alij intrinseci, naturales, & proprii, quibus vnaquæque alenda pars potitur pro depellendis superfluis, per idonea scilicet instrumenta, vel naturalia, vt sunt fibræ transuersales (& his tum ventriculus, tum intestina abundant), vel animalia,

Officium pi-  
stilli resolu-  
tur.



vt nervi, musculiq; qui in abdomine multi videntur; Nec iecur huic vlti inferuire posset, cum adeo ventriculo adhæreat, vt in respiratione nec minus, nec magis, quàm ipse, eleuetur, subsideatq; & sic nec possit ipsum percutere, vt esset necesse ad suppositum finem. His adde, quod quæ nutritura sunt congruentius est, vt ab aliendis trahantur partibus, quàm vt ab alijs in ipsas vi impellantur: pellitur enim, quod dissonum, attrahitur, quod familiare, & consonum est. Et hoc migrandi modus in plantis manifestus conspicitur; multò ergo magis in animantibus, quæ ex se motum, ac sensum habent. Sed de hoc latius disertum est supra cap. 1. r.

Officium fontem  
ven-  
triculi non  
iecori pro-  
ptium.

Quartum officium, nempe ventriculum fouendi, calefaciendiq; nec ipsi lecori proprium est, cum alijs quoque competat adiacentibus partibus lien, omento, diaphragmati, arterijs &c.; nec per se; nam calefactio propriè, & per se competit sanguini, ac spiritui, quibus mediandibus, & ipsum lecur calefcit actu, & sic alijs impartitur calorem. Propria autem lecoris opera sunt attractio, retentio, concoctio, & expulsio, ad quæ ob peculiare suum temperamentum sanguinis procreatio, inde distributio pro totius, & Cordis alimonia necessariò consequantur.

Est fontem  
lymphatici  
liquoris ne-  
gatum.

Præter hæc aliud officium hepatis à Bartholino additum est, lymphatici scilicet liquoris esse veluti fontem perennem, qui ipsum refundat in chyli receptaculum, vt inde ad Corcum chylo, vti vehiculum ascendat. Sed inania hæc: nam bilis, & aqua inter se contraria sunt; quia bilis calida, & sicca, aqua autem frigida, & humida est: Si ergo per lecoris attractionem sit à sanguine secretio bilis, vt ipse vellet, quomodo aqua? Si per pulsionem, eo quia dissimilis sit, bilis educitur, quomodo aqua? Id verò de ipso lecore dicitur, alioqui enim, quod ab eo variae partes varia quoque superflua, vel excrementa possint attrahere, nempe bilem fellea vesica, atrum succum lien, aquam, serumq; tum renes, tum per lacteas glandulæ. Sicuti, & in Anatomes vehementia posse ob angorem ab ipso aquam exprimi, non repugno: qui tamen nec alienum duco, vt superius dictum fuit, per earum aliquas ad iecur chylum deuehi: non enim inconuenit, idem vas contrarijs motibus inferuire, vt manifestò cernimus in respiratione, pulsu, ventriculi gula, vtero, & similibus, prout latè docet Gal. lib. 3. de nat. facul. cap. 13.

## CAPVT VIGESIMVM TERTIVM.

*Rei conclusio; & pro Iecore reniuiscente Carmen.*

**D**esinant ergo oculatissimi hi duo Viri Pecquetus, ac Bartholinus, cum ipsquæ Neoterici omaes in suis adinventionibus adeo gloriari; neque arbitrari pergant, totius corporis nutritionem à succo per tales à se repertos anfractus, ac meatulos transeunte suos habere natales: (arcta nam nimis via est, solisquæ summis in egestatibus adeunda) Sed verius, Hepatis sua reconcessa hæmatosi, cum nobis teneant, similes lacteas

# CAPVT VIGESIMVM TERTIVM. 95

lacteas venulas partim ad mesenterij, ac ipsius glandularum nutrimentum tum deferendum, tum custodiendum esse a Natura dicatas, partimq; ad Iecur tenuissimum traducere chylum; Suum verò lumbare Receptaculum, ac cum eo thoracicum tubulum ad totius Spinæ omniumque naturalium membrorum superfluum humiditatem excipendam, locoq; ac tempore tum ipsis, tum cæteris indigentibus retribuendam, communicandamue formata esse: Vnde ibidem præcipue in Ischuria, quoties ad vesicam vrina non peruenit, stagnare, deponi, & affluere serum, rationabile est, & grauitas lumborum in huiusmodi casibus clarè suadet. Sic & veritatem magis attingent, & Priscorum auctoritati inhærentes, tutius incedent.

Nobis autem fœrmite concludere liceat, propriam venalis sanguinis Officinam Hepar esse. Non ergo intempestium erit hoc tandem nobile Viscus ab Orco reducere, pristinaeq; suæ dignitati restituere, loco funeralis Bartholini Epitaphij sequens Vrnæ affixum apponendo Carmen.

Pro Sanguifico Hepate Carmen.

Quid Viator abis?

Sicquæ graui censet Infontem marmore claudi,

Cuius, & imperio purpura digna fuit?

Siste.

Læserat Heroem Pecquetus, Sanguine dempto,

Addiderat tumulum Bartholus vltro quidem.

Eia.

Sed neque sub Saxo Iecoris nunc vmbra moratur.

Ipsi nam vitam Turrius ecce tulit.

En

Sanguine nec solum ditauit Turrius Hepar:

Sanguinis at sceptrum reddidit, imò dedit.



Huic quoque rediuiuo applausit, fœcunda distante  
Musa Egregius Medicinæ colens Hyeronimus Albertotus sic:

Hepatis de tumulto triumphus.

Perge porrò, Viator.

Hepatis hic nihil est,

Quod licet humanis inhumanus

Hostis gemitus,

Nunc extra tumulum

Vium volitat

Per ora Virum

Cui, veluti Arabicæ aui

Natalem fecerunt

Cineres me iorem;

Illud tamen Letheo  
In tumulo iacisset  
Ni vigilis in morem Argi  
Centenas seruasset excubias  
E Turre Ioannes  
Quem Hepatis Assertorem  
ac Vindicem  
Alterum iure dixeris Chironem;  
Dignum sanè, cui Turrim  
Cognomine, & virtute fundatam  
Ergant Medici in Colossum  
Tanti muneris Mnemosinon.  
Ripa scilicet de alta  
Alta remedia Mundus  
Debuerat expectare.



## LIBER SECVNDVS.

IN QVO

DE SANGVINIS MOTV

CIRCVLARI<sup>IN</sup> DISSERITVR.

P R Æ M I S S I O.

**I**Antam in Orbe Medico inuentæ à Pecqueto Lactæz metamorphosim peperere, vt mirum, ni, veteri Medicina funditus excussa, tota in nouam, sicquæ teneram, ac infantilem Artem breui sit abitura: Accidit enim in similibus, vti in coercito à fortibus Aggeribus impetuoso flumine, cui si fortè ob superuenientem pluuiam exundanti detur, pauculam in ipsis aggeribus rimam adinuenire, dici nequit, quàm citò omnia retenticula dirumpantur, quotquæ vastentur agri, euellantur ædificia. Sic in Medicina factum, & sit adhuc; in qua cum vsque ad hæc tempora à potentissimis tùm Hippocratis, tùm Galeni thesibus omnium ferè ingeniorum fluctuantium impetus, tamquam in vndique vallato Alueo, detinerentur, vix imperceptibilem ferè aditum per hæc lymphatica, siuè lactea vascula adinuenerunt iuniores, quod statim, omni pudoris, vel respectus Aggeris disrupto, nouarum opinioinum prouentus inexplicabilis emanauit; Quarum si inceptui progressus proportionatus accedat, parùm aberit, quin, vt dixi, omnia innouanda sint, incredibili cum ægrorum discrimine, super quorum dorsum (proh dolor) quælibet Artis ingens nouitas ineuitabiliter premit.

Illinc cæpit securis dignitas inhumari, Cordis Regia lebetis ebullitione fœdari, cerebrum inferiorum partium enutritione onerari, Sanguis in implacabilem rotam proscribi; & ex altera Ventriculus, & mesenterium exaltari, chylus in omnibus, & ad omnia aptari, itaut huius prima generationis nostræ semina, exordia, & alimenta præscribantur.

Opinionum  
neotericarum  
culus.

Data enim hæmatosi venia, ad faciem biliosam derandendam Pecquetus, Bartholinusq; proscribere Iecur, Cordiq; totum sanguificandi chyli adaptauerunt molimen. Entius, Glissoniusq; problematicè primum, Charletonus inde seriò, Harueij quoque documentis innixus, sanguinem à nutriendo ablegarunt. Hicq; per nervos à cerebro nutritium prouenire succum (sic referente Deusingio) scripsit. Nec sanguis solum à pacatâ nutritione detrusus, sed & in perennem Harucianam circulationem coniectus cernitur. Ex chylo lac gigni, & eoque factum in vtero efformari, ali, augeriq; Deusingius cum Alijs priùs hæsitando, post verò firmo pede asserendo, concludunt. Hisce superaddit Pallierius in nuperrimo libello de Lactis vera genesis, & vsu Genuæ edito, semen ipsum ex chylo immediatè, fieri, solidarumquè corporis partium, tum cerebri, tum glandium &c. nutritionem, adipisque generationem ex eodem promanare. Et quid expectatur amplius? Ventriculum Regem clamitat, ad eiusquè nutum totum componi microcosmum, decernit.

Relinquo nunc dicere renum, lienisquè attractiones exulantes; pulsum, respirationisq; causas, & vsus veteres profligatos; facultatis attractricis opificium cassum; fibrarum actionem inutilem putatam; Cordis dilatationem, vel casualem, vel coactam vocatam; nutritionem corporis incessantem, ac inexplebilem appellatam; pulmonem circulationis arbitrum proclamatum; & similia tot alia paradoxa, quæ singula persequi, vix homini longo tempore esset possibile.

Remanet solum, ut nunc, in theorica omni Vallo disrupto, ad Practicam inuertendam, & peruertendam concurrant. Et iam capit sanguinis missio claudicare tum circa sectionis locum, qui liber citræ læsatum partium considerationem relinquatur, prout in pleuritide promulgauit Deusingius in ad hoc dicato Opusculo; tum circa eiusdem delectum; quæ videtur in gravidis, etiam à talo, amplectenda (si sanguine non nutritur fœtus); in mensibus verò euocandis abigenda, si venarum non est sanguinem ab interioribus ad incisionem, sed ab extremis ad Cor vehere. Sic & innumerabilia alia absque dubio insurgent absurda, si videri poterunt Præces, quæ iamiam ad circulationis normam ab Exteris quibusdam remanabunt.

Et quid ergo à Nobis Italis expectatur? quod omnia abeant retrorsum? Videamus quæsto, ne Pestis hæc nos quoque inficiat; Et sicuti pro Catholica fide contra liberas Exterorum quorundam conscientias, & pugnatur, & vincitur, ita Medicinales huiusmodi hæreses abigamus, oppugnemus, arceamus. Parentes nostros imitemur, qui Paracelsos, Bouios, Vanhelmontios, aliosq; Hippocraticæ Medicinæ dirutores insectantes, fulgidam illam, inconcussamquè præseruauerunt egregiè. Sequamur insuper, & Eos, qui Fernelios, Argentorios, Augenios, aliosq; Galenomastrigas reprimentes, sese ad fulgoris apicem euexerunt, Praximq; nostram, imò & Artem elimarunt eximie.

Nè nos fallat, vel alliciat verborum melos, orationis concinnitas, modorum blandities, novorum modulitas; Nè moueat Auctorum nominis celebritas, dictorum argutia, rationum fastus, & conclusionum apparentia: Ieues enim animos, faminilia corda irretiunt huiusmodi, quæ à cordatis pro futilibus venundantur, imò spernuntur.

Omnia persequi mihi occupatissimo non datur: quæ tamen potero, ad incudem ducam, sperans, id saltem me consequuturum, vt scilicet alia excitentur ad idem, facinus præclariora ingenia, quæ rem totam medullitus attingentia vmbas dirimant, nebulas fugent, nubefq; dissoluant. Cum ergo superiori Libro Hepatis decor (vt arbitror) ab humo eleuatus, Cor autem pristinae præ eminentiæ restitutum fuerit, agè nunc videamus, quid de sanguinis in humano corpore motu veridicè magis cum Antiquioribus Medicinæ Parentibus sit tenendum. Præscriptum ei ab Haruicio circulum perlustremus; quique illi cardines à Recentioribus additi sint, adamussim considerato, videamus, nùm validè, ac securè sit sanguinis motus perennis, & rotatus adscriptus; vt tamen nec interim multæ aliarum sileant disputationum prosecutiones.

## CAPVT PRIMVM.

*Circulationem sanguinis, si detur, qualis, & quantacumq; sit, non obesse Veterum de eiusdem officina opinionem, nec nouam quicquam fulcire, commonstratur.*

**T**OT enim, tantisque priori Libro adactis arietibus nequidem cedent hi duo celeberrimi Viri Pecquetus, ac Bartholinus, qui, suis eminentibus ingenijs confisi, nihili pendunt Veterum calcare vestigia, nec nisi nouis introductionibus anhelantes, plura cum Alijs conuoluere, vel irritare Antiquiora non verentur, dummodò inuenta dogmata circumsepian, ac tueantur. Sed (ipsorum pace dixerim) non est, vt adeò fimbrias dilatent: siquidem Antiquis pugnabit Veritas, pugi abunt Hercules non solum, sed & Pygmæi ipsi, vt videant omnes gentes, plerunque infirma à Deo eligi, vt fortia quæque confundat.

Intolerabile quippè est apud emunctæ naris homines, ampullosam illam audire, vel videre iactantiam, qua quis iamdiu in Arte benè disposita leui de causa peruertere verbis, & re ipsa conatur: Sic enim de Ijs dicere possumus, qui, vt Receptaculi sui, lactei thoracici tubuli, lymphaticorumque vasculorum inuentum ad sydera euehant, pro nihilo habent hæmatosim confundere; alimoniam partium interturbare; excrementorum secretionem inuerrere; nouos humorum motus, nouam chyli semitam effingere; partium non vulgarum insita ministeria pernegare.

Vt ergo propriam Pecquetus assertionem de chyli via ad Cor, pro sanguine generando, tueatur; alter verò consentiat non illegitimè,



Circulatio-  
nis Harueij  
descrip-  
tio.

plurimas Antiquorum theses impugnare non prætermittunt, eas, tamquam mucidas, & obsoletas respuentes; Sicquæ non à lecore sanguinem alimentosum in Cor, & vniuersas corporis particulas per venas fluere, sed benè ab extremis tum alui, tum capitis, tum brachiorum, tum crurum venis in Cauam illum reduci, sustinent, vt inde Cordis dextrum ventriculum ingrediens, per arterialis venæ cavitatem in pulmones, ab his in venalem arteriam, ab ea in sinistrum Cordis ventriculum, hinc in Aortâ, & ceteras corporis arterias, indequæ in partes omnes pro earû alitione continuo motu agitur. Illinc postmodum per venarum anastomoses, vel per carnes ipsas in venas rediens, ab his iterum in Cor, à Corde in arterias cursitare, ab ijsdem supponitur, itaut continua sit dicto modo sanguinis circuitio. Et hoc, vt digito monstrent, chylum in axillarem venam per thoracicum tubulum introgressum, ad Cor cum remeante sanguine progredi, vt ibi coquatur, & sanguis fiat. Quam postea circuitiorem vt tueantur, Eos præterea non tædet negare attractionem fieri per emulgentes venas in renes, expurgationem atræ facis per rimum splenicum in lienem, deductionem sanguinis per mesaraicas ad naturalium partium enutritionem, eiusdem accursu per venas spermaticas in testes &c.: Sed omnia prædicta opposito modo fieri, edocentes, ab emulgentibus renum sanguinem ad Cauam; à splenico ramo, & cæteris mesaraicis in Iecur per Portæ venam; ab alijsq; itidem ad Cauam continuè remigrare sanguinem, tradunt non secus, ac si in plantis humorem alimentitium à frondibus ad ramos, ab his in Truncum, & hinc ad radices deferri, dicamas; Sicquæ illud Aristotelis verissimum dictum confirmans, Dato vno inconuenienti, plura alia ex necessitate sequuntur.

Harueij opi-  
nio in nullo  
Pecquetis-  
nis de chyl  
vix dogma-  
tibus fauet.

Hæc sanguinis circulatio, Harueij Angli doctissimi Anatomici inuentum, & plures habuit fautores, & oppugnatores non paucos. Qui tamen Vni prudentissimè quidem, etsi dictammet circulationem adinuenierit, experimentis ditauerit, rationibus confirmauerit, & ab omniû contradictorijs argumentis eximere studuerit; in nullo tamen, nec minimò, chylî traductionem per mesentericas venas ad hepar commutari debere, autumauit; sic annuens, optimè cum sua sanguinis circulatione posse, & chylî antiquam commutationem subsistere, nec ob eam hepatis quicquam pro suo munere derogandum esse, quin, regressu sanguinis ad ipsum possit simul attractus chylus in transitu per tot venularum laberintus proba fieri in sanguinem conuersione donatus. Nisi quod, & ipse, à Corde sanguinem, perfici iuxta Aristotelis mentem credidit: Succum verò album in lacteis vasibus reperiunt, non quidem esse verum chylum, sed aliquid, quod ab vberiore nutritu, & bonitate concoctionis, interdum casu superest eadem lege, qua adeps, medulla, genuura, lac &c. enascuntur, admittit. Et in hoc videtur nostræ opinionis fauere, solum in eo varius, quod ad casum, & ad chylî munus ipse refert, quæ nos in naturam, & similitudinem alitarum partium, ac in sanguinis depurati superfluum reportamus.

Harueij opi-  
nio de la-  
cteâli succo  
fauct Auct.

Verum

Verùm Bartholinus, Pecquetusq; non in moderato, leniquè motu sanguinis acquiescentes, vt qui neutiquam suæ ipsorum opinioni fauere, neq; contrariarum rationum vim effingere poterat; similes ijs, qui ex digiti libertate cubitum sibi arrogant; velocem præcipitemq; illam fieri circulationem, in medium afferre non dubitarunt; quibus, & Conringius fauet lib. de sang. gen., & motu cap. 36. quamuis in hoc persistere non audeat, sed ad scrupulum sanguinis singulo itû fluentis se contrahat aliquando. Itaut per eos pluries in die, & bis qualibet hora deberet totus sanguis cum chylo per Cor, vt coquatur, recal fiat, & à vitijs corrigatur, circueundo pertransire. Et sic, si morari in eo interdicitur (per alternuū enim systolem non datur); frequenti tamen transitu illud idem, quod quæritur, obtineri, autumant; prout apud Bartholinum, legitur pag. 146. vbi hæc sunt verba: Si crebris circulationibus elaboratur, ergo perfectus, & maximè coctus partibus traditur: Id enim repetito circuitu assequitur chylus, seu sanguis crudior, vt quod vnicuique circulatione perfici non potuit, sequentibus, sæpiusquè repetitis, gyris, vltimum vtilitatis gradum indispiscatur. Non igitur crudo chylo, seu sanguine imperfecto nutriuntur partes, sed illo, cui complementum circulatio addidit: imperfectus enim partibus non apponitur, sed per circulationem redit, vt perficiatur.

Quomodo de circulatione sentiant Pecquetus, ac Bartholinus.

Qui quidem animi conceptus (etiamsi modo per recentiores disposito circulatio prædicta daretur), vix capere possum, quomodo in mentem talium Virorum insurrexerint; cum à quauis proba ratione, aut verisimilitudine prorsus abhorreant: Ponamus enim in homine viginti quinque libras adesse sanguinis, si totus is per arteriosam venam, pulmones, & venalem arteriam transire per horæ dimidium deberet, stante pororum, vasorumq; exiguitate, nonnè continua inundatio, turgor, & inurmutatio fluentis, imò furentis sanguinis persentiretur?

Eorum opinio respuitur.

Prima ratio;

Sed & si toties temperatis Viris circulatur sanguis, vt probus, defæcatusq; euadat, in agrestibus, & intemperatis, qui quater, quinquiesquè in dies singulos cibum capiunt, quoties circularetur? An enim putant, circulationes ipsas proportionem respondere cibationibus, an verò omnibus hominibus eandem numero esse? forsitan, vt suos tueantur conceptus, nihili pendunt illud primum admittere. supponentes, quot cibationes augentur, tot proportionato numero plures circulationes fieri: Verùm, & illud absurdissimum omnium erit, & omnino impossibile: nam si in continentibus, & bis in die cibatis bis qualibet hora circulus impletur, in alijs quater fieri debet: nonne ergo hoc erit potius præcipitium, quàm naturalis motus? itaut sic Sanguinem Virgiliano illo metro alloqui liceret.

Secunda ratio.

„ Quis furor, osucci, quæ vos dementia cepit?

Verius autem, quando talis daretur sanguinis circuitio, eadem deberet omnibus non secus, ac integrales partes, & naturales alij in finctus, vel semel, vel bis ver. gr. in die, vel hora; vel, si deberet quicquam in velocitate

Alia cibationis  
alia causa  
circulationis  
causa.

velocitate mutari, non à cibo, sed à motibus, ætate, sexu, & similibus mutaretur: non enim eadem, sed omnino differens est cibationis, coctionisq; ipsius, & supposita circulationis causa tum efficiens, tum finalis; & ideo non valet proportio ab vno ad alterum: Est namque cibationis, coctionisq; finis, vt de perditâ, seu dissoluta substantia instauretur, & imperfecta moles augeatur; & sic in quibus crebra sit, vel propter labores, vel propter vacuationes, vel propter habiûs raritatem calori additam dissolutio, crebra quoque cibatio, coctioque expetitur, necessaria est, & benè toleratur; sicuti in quibus ob otium, aut spissum habitum modico calori adiunctum, tarda, raraq; dissolutio contingit, rara quoque instauratio appetitur, & fertur. Sed præter hæc alius quibuscumque finis præfigitur, gulosis præcipuè familiaris, vt scilicet gustu suauium tum ciborum, tum potuum fruantur. Sic efficiens coctionis causa est natui caloris actio, siue ipse calor agens, vt sibi assimilet passum; qui non desinit, sed quoties aliquid coquendum offertur, insurgit, vt sibi assimilet: cum autem cibationis causa partim naturalis, partim animalis sit; (ex sœtu enim oris ventriculi insurgit animalis sensus ad cibum quæritandum) sit ex hoc quoque, vt multi, præsertim pueri, & ignari, exemplo, vel consuetudine ducti, cibos sæpius ingurgitent, & potiones.

Quis finis  
circulationis,  
et quæ causa  
efficiens at-  
tribuitur.

Circulationis autem finis (vbi illa detur), si eius Auctoribus standum, est, vt nouus semper partibus enutriendis sanguis offeratur, vt sanguis in ambitu refrigeratus, ad cor redeundo recaleseat, neue otiano putridus fiat: Efficiens verò non animalis facultas est, non consuetudo, non natius calor agens, vt sibi assimilet passum; sed naturalis, inuoluntariaq; seu vitæ insita facultas. Ergo, sicuti varius ambarum finis, varia efficiens causa, ita quoque non inuicem proportionata erit repetitio; Et sicui pro vna cibatione potest bina, vel trina fieri, prout variat voluntas ingurgitantis, cui, & actio ventriculi potest ob caloris valorem respondere; ita ex altera, cum non euariet circulationis causæ, nec ipsa euariari potest. Quod si repetant, etiam in hac euariari posse, si non finem, saltem efficientem causam, vel etiam vtrunque, cum in cibatis pulsus sit maior, quàm in fameſcentibus, & maior calor, qui citius, velo eiusq; perficere possint opus; Respondeo, variari quidem aliquo modo, sed non eo, qui duplicato noui tribuere possit anſam, & effectum. Dico etiam, vel ex cibo calorem augeri, dum in ventriculo sit coctionis lucta, non ideo circulationi valiturum; vel ex eo ob caloris concentrationem, occupationemq; in coquendo, motui potius torporem, vel segnitiem addi. Patet igitur, saltem in sic crebro cibatis, siue pueri, siue agrestes sint Viri, magis adhuc chylum incoctum remanſurum, atque talem partibus alendis offerri.

Ratio tertia.

Sed & impossibile esse huiusmodi circulationum prouentum in sano homine, vnicuique rem intimè consideranti patebit: nam primò considerandum (siue diastoles, siue systoles causa pulsionis ponatur), eam ferè imperceptibili momento temporis perfici, alteramque alteri oppo-

sitam

itam immediatè succedere. Item venæ arterialis osculum esse tùm ob cordis duritiem, tùm ob sygmoides membranas angustatum, itaut à modico sanguinis obturetur facillimè : igitur, dato etiam, quod in quacunque cordis adstrictione, vt putat Harueius, vel dilatatione, vt alij possint in illam aliquid impelli, vel attrahi an putamus, amplius quàm guttam vnā, vel alteram ab ea excipis si daretur longitudo ictus sine contrario statim succedente motu, possemus ariolari, plures multò guttulas, & considerabilem quantitatem ingressuram : vt cum subito vni motui impellenti alter attrahens succedat, impossibile est, quid considerabilis acceptari. Numerentur ergo ictus, & inueniemus, antequam quantitas ea, quæ ab vno pastu in sanguinem, vel chylum abit, pertraherit, aliam ex nouo pastu superuenire, itaut modicum quid ex reliquo massæ sanguinæ ad hoc opus explendum esset satis.

Quinimò non in omni Cordis ictu sanguinem in huiusmodi arteriosam venam posse propelli, siue excipi, omnis ratio suadet : nam cum ex pulmonis arctatione idem vas constringatur (sicuti in inspiratione dilatatur, sit quidem, vt tunc temporis ab ea potius sanguis Cor versus, vt vbi vas latius euadit, abigatur, quæ de causa à Natura affirmatæ sunt tres illæ membranulæ tricuspidæ ostiolo ea figura adnatæ qua regressum in Cor sanguini contendant, vt ait *Gal. lib. 6. de vsu part. 10.* Ponamus ergo, in pulmonis arctatione (ea autem pulsu saltem duplo, vel triplo rarior, & tardior est) Cor constringi, vel dilatari; tunc, si dilatetur, nil ab eo impellitur, sed potius vacui ratione trahitur; si verò constringatur, manifestum, quod in restrictum quoque, & contrapressum vas, vel nil, vel modicissimum quid impelletur, & potius aer, qui subtilior quouis adigitur facilius. Et hæc ex parte eiusdem venæ, quæ non ad nutum Cordis, sed potius à respirationis effectibus, vt dictum est, mouetur.

Ex parte verò Cordis eadem expulsionis modicitas à pluribus potest argui. Et primò quia in sano homine parùm Cor dilatatur, parumque constringitur, itaut ridiculum sit metiri quantitatem sanguinis transeuntis, & circulationis celeritatem à capacitatem ventriculorum Cordis, quæ sanguinis vnciam, vel paulò magis continet : cum nec in maximo pulsu ventriculorum parietes valde constringantur : quandoquidem ex omnium mente in systole, etsi Cor adstringatur in latitudine, oblungatur tamen, vel si decurtatur, dilatatur ferè tantundem, itaut pauca omnino, facta computatione, fiat angustatio. Secundò, dato etiam, quod semper Cor in sua diastole aliquid à Caua trahat, longissimè illud minus est, quàm in iij arbitrentur; cum receptioni obstat tùm sanguis, qui in quaticitate aliqua semper in ventriculo eius moratur, tùm aliquid aeris, quem ab arteriosa vena, ab alijs suis osculis, & poris attrahit. Tertiò quia Cor hominis continuis agitationibus deditum, multoties in suo impeditur, & distrahitur munere. Addatur his alia ratio, quæ infra legitur *cap. 12.*, vbi etiam contraria argumenta soluantur. Quare, data etiam

Modicitas sanguinis in arterialem ad Cordis quæcumque motum introeuntis ostenditur.

Non in omni Cordis ictu sanguinem in arterialem venam introeunt ostenditur ex parte ipsius.

Idem ex parte Cordis esse ostenditur.

¶

(at

(at non concessa) aliqua circulatione, sufficeret, quod nec semel in die, omnibus ritè perpenſis, illa fieret. Et hoc modo manifestum, quod chylus incoctus, sanguisque crudior remaneret, (& hoc esset pro partium alitione incongruum, & pernitiosum); vel etiam in lacteis moraretur, vel in subclavijs.

Ratio quare  
ita

Item si talis datur motioſis celeritas, ita ut per solam diastolem in Cor ingrediatur cum sanguine chylus, & per statim subsequentem systolem expellatur, quæ illi coctio obueniet, & quam à Corde gratiam est acquisiturus? nulla naturalium alterationum fit in instanti, & maxime vbi substantiæ modus, & forſan forma commutanda sit, prout si ex chylis, qui aqueus, tenuis, insipidus, vel aliquando acidulus, & in summa à sanguinis natura dulci temperata, mediocri, & spirituosus valde distans, debet sanguis euadere. Nec dicant, illum, tranſeuntem per glandulas, & per lacteos tubulos, coquendum, & disponendum: nam à partibus exanguibus, frigidis, albis, & nulli visceri contiguus, vel dependentibus, quæ dispositio, pro sanguine gignendo speranda?

Ratio quare  
ita

Adde, quod neque huiusmodi circulationum Pecquetianus prouentus in sano homine admittendus est: mirum enim, quod ei locus esse possit citra mentis amentiam, ingenij stoliditatem, memoriæ vacuitatem, imaginationis instabilitatem, voluntatis inconstantiam, animi agitationes perpetuas: Si enim continuè, & furenter sanguis in cerebrum ab arterijs eiaculatur, & à venis in Cor reducitur, quæ quies primo tribuatur ad contemplandum idonea, ad iudicandum apta, ad retinendum necessaria? Et quæ secundo ad cogitandum commoditas, ad deliberandum facilitas, ad sustinendum idoneitas dabitur?

Cum igitur nec datur, nec congruat à Pecquetianis supposita circuituum crebritas, patet, suppositam quoque coctionis, ex moræ defectu, imperfectæ compensationem per transitus iterationes cessare, & sic alimentum partibus offerendum erudum, vel malè coctum. Atuerò dicent ipsi: si ergo datur mora, dabitur, & coctio, sicquæ cessat ratio: Verùm animaduertant, quod sic retorquere ijs non valet nam hinc alia succedet supra tacta imperfectio, nimirum quia per si tardum, raturque sanguinis progressum ad Cor, chylus in lacteis remanebit, nec à venis subclavijs cum sanguine in cor feretur; præterquam quod tunc omnia insurgent absurda, & pericula, quæ in primis prioris libri capitulis recensentur.

Incoctum  
remanere  
sanguinem  
admittunt  
Neoterici.

Igitur, cum illud effugere non possint, flocci facere, nec curare decernunt; non incongruum arbitantes, incoctum alimentum partibus offerri; quoniam unicuique inquirunt, parti inest virtus assimilandi sibi, quod probum sit, & expellendi, quod noxium, vel inutile; Quasi quælibet pars a Natura dotata sit canalibus duplicibus, qui alimentum deferant, & qui excrementa recipiant, aut secernant, veluti cerebrum, Cor, lecur ventriculus, pulmo, renes, vesica, vterus &c. At quis, quælo, modus supererit cæteris integrantiibus partibus sese à noxijs exonerandi?

At hoc incongruum  
monstratur.

Musculi,

Musculi, caro, glandes, ossa, cartilagine qua via tùm tenue, tùm crassum excrementum, si multum sit, extra mittent? Porro non omnibus illa celebris via est, quæ dictis visceribus, & cuti contigit. Nonnè ergo congruentius illud Naturæ institutum est, vt sanguis, quoad licet, defæcatissimus, & optimas generetur, expurgatis nimirum partibus noxijs per communes cavitates? Vt potè eum nec sic fieri possit, quin aliquid supersit, à partibus euitandum, & in communes venarum, ac porulorum riuulos dereliquendum; quod, quia paucissimum est, per capillaria eorum extrema oseula extra pro sordibus, ac pilis extruditur; & si copiosius, aut vitiosius, in vlcera, vesiculas, porrigines, bubones, furunculos, erysipelata, scabies, aliasq; cutaneas affectiones abit; & tandem si plurimum, in venis restitat, quoad natura citra magnam molestiam tolerare potest, nataq; aliqua occasione, per aluum, vrinas, sudores, stomacum, nares, hæmorrhoides, vterum, aut aliam ei commodiorem viam, si valida illa sit, expellit; sin ægra, aut defæcata, febres sustinet, & contra noxia pugnans, vel criticè vincit, vel paulatim dissolvens, atterit, vel tandem ipsa occumbit.

## CAPVT SECVNDVM.

*Contrariæ rationes pro circulationis velocitate probanda allatæ dissoluntur.*

**H**uiusmodi autem circulationis prædictæ velocitatem ne quidem putandum est ab hisce Auctoribus gratis positam, creditamque esse: Eam enim ex multis phænomenis sibi visi sunt rationabiliter coniecisse, ac eliciuisse; quæ quia Iuniorum mentibus tenebras offundere ob verisimilem apparentiam possunt, hic libet examinare, & illorum lubricitatem, ac fallaciam summam detegere.

Præter igitur præmissam Cordis ventriculi capacitatem, cui iam pro parte responsum, corpus viuum secantes, & venam aliquam exutam alligantes, obseruarunt, eam citissimè versus Cor inanitam fuisse. Item Caua vena constricta, & vulnerata Aorta, viderunt singulo cordis ictu sanguinem copiosum prodijisse, breuiq; interiecta mora, sine sanguine, & Cauam ipsam versus Cor, & Cor ipsum remansisse; Vt ideo (cum horæ dimidia plusquàm mille fiant Cordis pulsationes) aptè concludere liceat, posse simili tempore totum corporis sanguinem circuituionis metam attingere, & in Cor, iterum circuiturum, redire, siq; simul facillimè chylum à subelauijs venis in idemmet Cor ingredi, torietq; regredi, quoad optimam coctionem nanciscatur.

Verùm his, & similibus alijs experimentis vnica responsio satisfacit; aliud nempe esse, considerare sanguinis motum naturalem in homine, vel alio animali integro, sano, & quiescente; aliud verò coactum, in eodem lacero, vulnerato, angoribus, angustijs, pressuris, & interitus

*Experimenta à quibus circulationis velocitatem venarum Perquetiani.*

*Ad eadem respondetur.*



facie afflicto: Sicuti enim in illo naturales, ordinati, lenesque sunt motus, & actiones quæcunque; ita in hoc omnia violenta, subita, confusa, inordinata, & præcipitata conspiciuntur. Quorum signum euident, simulque causa est, in hoc non pacificè, & submissè, sed saltuosè, tensivè, palpit anter, & omnifariam dimoueri Cor, & arterias; corpus vndique se efferre, torqueri, exudare, vociferare, spumescere; Mentem agitari, tremiscere, irasci, effærari: his autem contraria prorsus omnia in sano, quieto, & pacifico corpore praticari. At quantum illiusmodi pathemata valeant (relinquatur pro nunc illius peruersio, alibi tangenda) ad motum sanguinis augendum, citandum, & cogendum, nemo sanæ mentis dissitebitur.

Alia experimēta leniora.

Quapropter, & ipsi contrarij Auctores, scopulum ineuitabilem videntes, ad leniora transcutunt experimenta: Abcissa ergo vena in phlebotomia, inueniunt horæ quarto ad libras sanguinem, vi arteriarum demandantium, exire; & sic, computato eo, qui à tot alijs partibus posset ad venas quasunque regredi, non videntur extra rationem conijcere transitus suppositam velocitatem. Abcissa etiam arteria aliqua insigni, referunt ex Galeno, horæ dimidio totum sanguinem tūm arteriarum, tūm venarum omnium euacuari posse.

Ad phlebotomiam experimentum respondetur.

Sed quamvis primum experimentum cæteris violentia cedat: non tamen in eo violentia neganda; cum in vulneranda parte frictio, ligatura, vulnus, balneatio, motusque fiant, & per consequens dolor aliquis adsit; omnia ad exeuntis succi motum maximè augendum, & accelerandum valde idonea: præterquam quod in progressu videbimus, in phlebotomia non ab arterijs, sed à venis præcipuè, & sic præter Cordis transitum sanguinem exire. Addatur, aliud esse succum contineri in vase integro; aliud verò in rupto, vel discisso: sicuti enim in eo potest, vel quiescere, vel insensibiliter repere; in hoc necessariò, & mouetur, & celeriter exit: cum humidi proprium sit fluere, vel ab alio terminari; & sic per successionem succus succum, sequatur, adigatque simul. Quantum quoque improprium sit ab artificiali hac euacuatione ad naturalem sanguinis internum motum arguere, perspicietis, qui in hoc præcursus succi impedimentum, in illa incitamentum agnoscat. Tūm, & qui considerat, in corpore centenos esse venarum ramos non brachiali illo scisso minores, & qui, si vulnerentur, non minus sanguinis sunt effusuri, facillè arguendi insufficientiam detegit, dum non horæ medio, sed minima sic horæ parte totum sanguinem effundendum fore, perspiciet; quod in integris ijs cogitare, vel imaginari, insulsum.

Ad arteriarum incisionem respondetur.

Idem dic de vulnerata arteria: quis enim crederet, ab ea non exire sanguinem, nisi qui à Corde in eam singulo iæu transmittitur? An nè potius ab omnibus tūm superioribus, tūm inferioribus arterijs ad scissionem confluet? Spirituosus succus, & calens ipse sibi aditum parat. Quinimò, & per pulsus diastolem credendum est, per crebras illas anastomoses, quæ passim inter hæc duo vasorum genera habentur, sanguinem

nem à venis quoque omnibus in comites arterias exugi, & ab his ad fauciam conuolaturum. Abût ergo, à nobis similis arguendi, & coniec-  
tandi modus.

Cæterum si quæ alia huc faciant experimenta, ea omnia in progressu Libri, vbi tùm Harueij, tùm Asseclarum ponderantur pro circulatione adductæ rationes, in veram reducuntur causam, & inconcludentia ostenduntur. Hic igitur pedem figamus, concludamusq; iterum, siuè stetur Harueio circulationis inuentori, siuè consideretur ipsius circula-  
tionis (si modò datur) lenis motus, nil pro chyli deductione ad Cor ex ea desumi; sed inconcussum manere assumptum, secur sanguinis officina esse, ab eoquè in totum corpus distribui, & in Cor speciatim. Hæcquæ verior, & à sæculis confirmata opinio est, cui insistere, decen-  
tius multò, quàm singula hucusque à nostris Parentibus longissima experientia excussa dogmata inuertere, negareq; ea, quæ nostri iudicii vis capere non potest.

Concludimus  
iterum pro  
lecoris san-  
guificatione

Vanissima siquidem illa Iuniorum quorundam iactatio est, quæ præ-  
sumit, & prædicat, Literas, & Artes in dies augeri, nouaq; inueniri  
semper; Veteres autem desipuiffe: cum potius ratio dicat, quò magis  
ab origine quid distat, eò minus de sua virtute participare; Et sic cum  
omnes scientiæ, ac liberales Artes ex Adamo, & primis ijs Heroibus,  
quibus à Deo specialius infusæ fuerant, per viam semini inditam, & per  
traditionem emanauerint, facilius est, vt per obliuionem, in capacita-  
tem, incuriam, egestates, tribulationes, bella, terremotus, incensiones,  
ac alia deustationum genera paulatim minuantur, quàm quod incre-  
mentum quotidie capiant, vel sint capturæ. Et hoc vnicuique singula  
percurrenti patebit: Nam etsi quædam nouiter inuenta videantur, si  
benè examinetur res, siquè omnium Mundi orarum, & quoruncunq;  
Scriptorum liceret habere notitiam, inueniremus, vel ab alijs regionibus  
emanasse, vel à veteri aliquo Scriptore ad aliud propositum, vel  
diuersis vocibus, nomenclaturis, aut significationibus exiisse; multoq;  
plura esse, quæ præciosissima in Arte nostra Antidota, delitiosa vnguen-  
ta, medicationum genera, compositionum formæ, simplicium cogni-  
tiones, opinionum celebritates, sententiarum pondera euauerunt,  
quàm quæ non de nouo inuenta, sed aliter depicta, vel illinc huc depor-  
tata, aut ab Exteris Auctoribus tradita, tamquam noua, in sciorum  
oculis offeruntur. Quorum ratio est, quod omnia voluantur, sicut  
Cæli, & quod nunc cunctis placet, sit ex longa consuetudine asperna-  
bile; ideo ad alia, quæ antea pro derelictis habebantur, recurritur, &  
veluti noua amplectuntur, prout, & in mechanicis Artibus experimur  
quotidie.

Hæc verò pro abundantia Cordis obiter sint dicta in patrocinium  
famæ Antiquorum nostrorum, à quibus omnis nostra Ars, & omnis  
scientia dimanat; nequaquam autem in detrimentum veræ laudis Eo-  
rum, qui bonis insudantes virtutibus, ea, quæ temporis vetustas, aut

bellorum tonitrua, aut ingeniorum otiositas consumit, Orbi literario resituant, instaurant, innouant, expoliant. His (testis mihi Deus sit) ne latum quidem vnguem inuideo, sed ominor meliora semper.

## CAPVT TERTIVM.

*Adducuntur quadam, quæ admittenda circulationi obstant plurimum, & à contrarijs solutionibus vindicantur.*

**H**Vcufque de adiuuenta sanguinis circulatione incidenter egimus, eoquæ consilio in primis, vt monstraremus, ea etiam data, datoquæ, discursus gratia chyli peruentu ad superiora, non posse, nisi incongruenter, subsistere Pecqueti, ac Bartholini suppositam chyli commigrationem per venam subclauiam ad Cor. Nunc vero seriò disquirendum, num talis circulatio detur, & realiter subsit, necnè, quòd, illa, si fieri potest, profligata, res omnis in pristinum redigatur statum, & firmiora semper sese præferant Antiquorum dogmata. Multa ergo sunt, quæ illi admittendæ obstant sumoperè, & ea hic adnectere libet, vt aliorum præcipuè ingenia melius pro veritate indaganda acuantur, & eleuentur. Primò ergo.

Obiectio  
prima.

Si daretur huiusmodi circulatio, sanguis, in qualibet corporis vena (ni ad sit obstructio, aut partis peculiaris affectus) idem, eisdemque qualitatibus esset: Sed contrarium quotidiana docet experientia: Ergo non datur. Probatur prior ex hoc, quod ab eodem fonte (iuxta Circulationis mentem) omnis promanat sanguis, ad eundem totus insatiabiliter redit, sicquæ per plures, & multiplices circulationes miscetur: ideo videri non potest, quomodò, adhuc sano existente homine, vel saltem vniuersali affectione detento, in vna parte sanguis sit vitiosus, & in altera probus: Quod tamen euenire, in dies conspiciamus tum in phlebotomijs, quæ in præseruationem, & præuentionem fiunt, tum in ijs, quæ communibus morbis, vt synocho, exercentur: Nam, scèta vena, multoties sanguis in principio bonus, in progressu prauus, vel e contra in principio vitiosus, inde consequitur optimus; nonnunquam in vna phlebotomia vnius qualitatis, siquæ reiteretur, alterius; ab vno brachio laudabilis, ab altero, vel à crure malus. Huic obiectioni respondebunt Contrarij, non futuram in sanguine mutationem, nisi aliqua pars sit affecta, cuius etsi sensu nondum percipiatur affectus, vel ob leuitatem, vel ob inaduertentiam euenire. Non tollit verò hæc responsio obiectionis efficaciam: quia ad hoc, vt dicta de causa aliqua in sanguine diuersitas esse possit, necesse est, in illa parte circulationis vim cessare, & sic diuersum in ea sanguinem asseruari; quo stante, cum arteriarum non minus in eadem seruetur pulsus (alias extremè pateretur), & per consequens arteriosi sanguinis noua semper per Eos affluxio fiat; horum vnum necessariò euenturum est, vel scilicet affluentem foras propelli,

& sic

Responsio  
ad eandem.

Anticipatur.

& sic prauum quoque foras exire; vel ibi constipari, acervari, in tumorem eleuari, & sic sensum minimè latere, vel nec per phlebotomiam extrahi. Sed sine his diuersitas prædicta experimento ordinario in neutris corporibus phlebotomatis obseruatur.

Quinimò, si dicta daretur circulatio, idem quoque, eiusdemq; qualitatis esset sanguis tum in venis, tum in arterijs. Sed diuersus cernitur: Ergo nec datur. Probatur prior; quia si à venis per Cor in arterias, ab his in venas, iterumq; ab his in arterias circueundo commigrat, & remigrat incessanter, nescio, quomodo, qui in arterijs reperitur, varius, seu differens possit esse ab eo, qui in venis. Dicit forsan Pecquetus, qui in venis est, infici seà variari à chylo ei admixto: Sed hoc non est verum ex sua suppositione: quia ex ipso chylus refunditur in axillarem venam quatuor solum digitis longè à Corde, & in Cor statim migrat, vt in arterias statim quoque ingrediatur. Præterea si ex chylo inficeretur, minus purpureus ex eo in venis fieret; at e contra cernitur. Dicit alter, in transitu per Cor sanguinem mutari: At quomodo in vno ictu mutabitur? Et si iterum in venas redit, cur non sic mutatus?

Altera verò propositio constat experimento, ratione, & auctoritate. Experimento quidem; quia in arteriotomijs, tum studiosè, tum casu factis, obseruatum fuit semper, sanguinem viuidum, floridum, tenuemq; & spirituosum exire, cum in phlebotomijs purpureus, obscurus, crassus, & multoties cacohimus exeat. Idem, & in vulneribus obseruatur, in quibus eodem tempore à sectis arterijs sanguis tenuis, rubicundus, & feruens proflire conspicitur, à venis autem crassior, densior, obscuriorq; egreditur. Ratione; quia cum arteriæ Cordis, in quo natiui caloris, & spirituum fons reponitur, vera sint germina, non potest nisi sanguinis pars melior, & spirituosior in ijs contineri: in venis autem, quæ nil, vel parum à Corde immediatè recipiunt, ac dependent, iecoris autem vetuti appendices sunt, sanguis, qualiscunque est, ac iecori similis gignitur, retinetur, & ad membra fluit. Auctoritate aurem, quia, vt tradit *Gal. lib. 4. de placit. Hipp. & Plat. cap. 4.* quem plures alij sequuntur, sanguis, qui in arterijs reperitur, sicut, & in sinistro Cordis ventriculo, tenuior, flauiorq; nonnunquam verò nigrior, semper autem calidior visitur eo, qui in venis, & dextro ventriculo cernitur. Vessalius etiam *lib. 3. de corp. hum. faber. cap. 2. in fine ait*, tenuiorem, rarioremq; & velociori impetu ruentem substantiam arterias, quam venas, amplecti; cuius testimonium ratificare videtur arterialis constructio, sextuplò venali crassior. Hic tamen consistunt Iuniorum nonnulli, præcipuèq; Hermanus Conringius hanc sanguinis diuersitatem denegantes, & verunq; sanguinem similiter rubicundum, & aquè concrementum asserentes: Verum hoc negare est negare sensum ipsum, cuius tamen iudicio ipsi profitentur omnia sua statuminare dicta; & illud idem, quod plurimi suorum Sequacium admittunt, sicut, & Harueius ipse, qui solùm circa spirituositatem, non circa tenuitatem contendit. Imò Gal-

Obiectio  
cunda.

Pro Pecque-  
to respon-  
sio refellitur.

Alia respon-  
sio inutilis.

Probatur se-  
cunda pro-  
positio.

Ad rem op-  
positio.

Refellitur.

Imò Gal-  
trucchius,

truchius, vt videbitur inferius *cap. 22.* ex diuersitate, quæ in educatione sanguinis per venæ incisionem pulchrioris in fine educi, inuenitur, confirmare præterit (quamuis perperam, vt ibi dicitur), exitum illum ab arteria fieri.

Obiectio 101  
111.

Item si deberet illa eadem fieri circulatio, arteriæ capacitate, & numero venas æquarent, imò potius superarent, cum illæ ultra sanguinem spiritus copiosos (quibus nec suus denegari debet locus) contineant, & quoquoque deducant: Sed aliud cernitur: Ergo non debet dari. Prior probatur, quia si sanguis a toto corporis venoso genere confluit ad Cor, & ab eo consequenter æquali motu rythmoq; in arterias pellitur, itaut quantum vtro trahitur motu, tantum altero pellatur, manifestum est, si æqualitas in hoc seruanda, quod recipientes arteriæ respondere deberent demandantibus venis, sicuti, & expulsio attractioni. Sed verò hoc non esse, ocularis inspectio docet, quæ arterias generaliter ob binas tunicas, easq; sextuplo crassiores, quam venarum tunica, vt etiam tradit *Gal. 6. de vsu part. 10. Vesal. et supra ex Herophilo, et Arist. ipse lib. 3. de hist. anim. 3., et 4.*, minores multo, & incapaciores esse, visitur. Adde, & numero pauciores, maximè in partibus iecoris, mesenterij, & totius abdominis, vt testatur *Arist. loc. cit.*, & clariùs *Gal. lib. 16. de vsu part. 12.*, nec difficietur contraria pars, docetq; nouissimè Riolanus. Huic obiectiõni, sibi met etiam factæ respondet *Réu. Io. Paulus Galtruchius* è Societate Iesu, sicuti, & *Conringius*, ac alij: Sed eiusdem responsio ponderatur, & infringitur infra dicto *cap. 32.*, vbi peculiariter Egregij illius Philosophi rationes considerantur, dissoluunturq;: Sicuti non paruum vltiorem explicationem, & confirmationem nostra hæc capit obiectio ab ijs, quæ in decima octaua obiectiõne enodantur.

Obiectio  
quarta.

Adde, quod, si talis debuisset dari circulatio, necesse erat, vt & aliqua daretur continuatio cavitatum venarum cum arterijs, harumq; cum venis, vel alius canalis ab his ad eas, ab illisq; ad has deferens. At nulla huiusmodi continuatio datur, nec alius apparens canalis cernitur: Ergo &c. Prior probatur ex eo, quod in necessarijs nunquam Natura defecit: quod autem necessaria sit osculorum connexio in ijs vasis, per quæ fieri debet ordinarius alicuius humoris fluxus, patet exemplis, per quæ videmus Naturam! prouidisse de congruis canalibus ad transmigrationem cæterorum succorum chyli, feri, seminis, bilis &c. Hæc tamen continuatio inter Cauam, & Aortam nullibi cernitur; cum inter eas intercedat septum Cordis, & illud crassissimum, per quod veluti refudare cogitur, & per cæcos meatulos à Riolano admissos *lib. 3. anthrop. cap. 12.* & à Bartholino alios referente *lib. 2. anatom. reform. cap. 7.* veluti transcolari pars sanguinis tenuior à dextro eius ventriculo in sinistram, pro arterioso sanguine, ac spiritibus instaurandis. Arterialis autem vena, per quam transmigrationem fieri, autumant Neotericorum permulti, contigua quidem est Aortæ caudici in sui exortus principio, sicuti, &

arteriæ

arteriæ venosæ germinibus : non autem earum cavitati continuatur ; nec præter originis funiculum , seu nodum in fætibus , alio modo cum arterijs confluit , conspiratq; quàm per quasdam anastomoses , non secùs , ac inter cæteras corporis vniuersi venas , arteriasque fieri , docet *Gal. lib. 6. de vsu part. cap. 10.* propè finem his verbis : In toto corpore ,  
 „ mutua est anastomosis , atque oscillorum apertio , arterijs simul , &  
 „ venis , transumuntq; ex sese pariter sanguinem , & spiritum per inuisi-  
 „ biles quasdam , atque angustas planè vias . Sic etiam neque à finibus  
 arteriarum continuatur in venas cavitatis , sed vel caro , vel aliud corpus  
 intercedit , itaut non nisi per quasdam veluti diapedesim possit ab vno  
 ad alterum vas transitus fieri .

Contra obijcient autem , similem à nobis supponi chyli sanguificati  
 traductionem per hepar à vena Portæ in Cauam , inter quas , vel inter-  
 cedat caro lecoris , vel si se osculantur oscilla vtriusque venæ , id inuisibile  
 est , & sola ratione euictum : Sed respondetur , non esse parem rationem ,  
 nec vllam proportionem vnius ad alterum : nam in hepate non solum  
 chimitransitum supponimus , & desideramus , sed & ipsius coctionem ,  
 & excrementorum secretionem ; quæ ideo hoc obstaculo indigere ad  
 hoc , vt plus temporis in Hepate succus retineretur , inibi à fætibus per  
 lienis , ac fellis adiutorium expurgandus : Ast in Corde , ac pulmonibus  
 nec talis pro circulatione mora queritur , nec haberi potest ob subal-  
 ternantes systoles , quæ sanguinem foras exprimunt , & ob carentiam  
 latebrarum , aut venæ gyrorum , qui ipsum remorentur . Quod si hæc  
 expetebantur ad attenuationem , dissolutionemq; sanguinis in spiritus ,  
 iam non infimum hoc signum est , circulationem non desiderari . Qui-  
 nimò , & debilius multò est impedimentum , in iecore suppositum , eo-  
 quod in Corde , pulmonibus , carne , osse , aut alia parte inuenitur ; cum  
 imò Vesallius cum alijs multis ponat , oscula venularum Cauæ cum Por-  
 tæ propaginum osculis coire , & visibiliter vniones obseruari , sicuti , &  
 circulationis acceptatorum plurimi testantur ; cum e contra in Septo Cor-  
 dis oscula cæca , & forsan sola porosa quædam raritas adsit , nec in pul-  
 monibus aliqua inter hæc varia vasa apparens semita adsit , nisi quæ-  
 dam rationabiliter admittantur anastomoses , vt necesse est . Item tertio  
 per hepar sola portiuncula , nimirum ex quotidiano alimento enata , &  
 vnica vice tantum transire habet : at pro circulatione supposita vni-  
 uersus corporis sanguis , & pluriès in die , & celerrimè pertransire præ-  
 tenditur , quod an fieri per inuisibiles coniunctiones ordinatè possit , qui-  
 libet cordatus Arbitrè decernat .

Has difficultates videns Conringius *lib. de sang. gen. & m. t. nat. cap. 43.* ab Auctore Harueio deuiare coactus , eiusdem sententiam de sangui-  
 nis transitu per partium poros refellit non aspernendis rationibus ; to-  
 tusq; est in probando , dictam transumptionem per anastomoses , seu  
 coniunctiones vasorum ad inuicem fieri ; quas dari permultas , quauis  
 non appareant vbique , probat exemplo multarum coniunctionum , quæ  
 videntur

Contra obie-  
 ctio .

Solutur .

Contingit  
 remigra-  
 tionem in ve-  
 nas per ana-  
 stomoses &  
 si, & aut .



Impugn-  
tur .

Non ritè ad  
anastomoses  
confugi pro  
circulatione  
probat,ur,

Obiectio  
quinta .

Responde-  
tur ad ean-  
dem .

Confutatur  
responsio .

videntur in liene, renibus, feminalibus vasis &c. , & ratione convenien-  
tiæ, quæ, sanguinis e vase in vas reditionem , concedens non fuisse, per  
extrauafationem fieri, suadet . Omnia benè , si illam fieri, patens esset,  
vel necesse : sed cum nec fieri pateat, nec sit necesse, frustra ad exempla,  
& ratiocinationes similes confugitur . Quod non pateat , est clarum,  
cum pro illa affirmanda ad ligaturarum coniecturas, quæ æquè contra,  
vt infra dicitur, possunt concludere, sit recurrendum . Non esse necesse,  
verissimillimum est ; quia sanguis mea sententia ad partes fertur non  
animi gratia , non ratione superflui, sed nutritionis, sed necessitatis , vt  
naturalia omnia , non per modum transeuntis, sed alentis . Obiter autem  
hic notatum velim , Circulationis fautores , qui omnia sua putant per  
sensatas demonstrationes probare, in plurimis ad coniecturales rationes  
confugere , vt ideo illorum quouis ab altero passim diffentiat . Et verò,  
si intimius responderetur , non ritè ad huiusmodi anastomoses confugi-  
tur : quia cum huiusmodi coniunctionum oscilla vtrunque sint peruia ,  
nō videtur, quomodo tantum non valeant ad reddendum arterijs, quan-  
tum ad recipiendum ab ipsis, tantundem apta ad retrahendum dilatatio-  
ne earundem, quantum ad remittendum pollet constrictio . Item, &  
arteriæ omnes, si sic esset, finire, & insinuari in venas , non in carnes,  
ossa , & cæteras alendas partes deberent, alioqui sanguis ille per fines  
exiens, non in venas migraret, sed per partes ipsas, spargeretur, vel for-  
as exiret : illud autem non esse, sensus negat, & auctoritas Anatomico-  
rum, qui suas vtrisque vasis capillares extremitates in partes finientes  
assignant . Patet item, è directo magis ad fines sanguinem ab arterijs  
ciaculandum, quàm in laterales anastomoses . Sed & non magis in ca-  
pillaribus arterijs, quàm in ramis , & truncis similes obseruantur conne-  
xiones vasorum : in has autem, & per has fieri reditum sanguinis , &  
difficillimum, & inuti e ; ergo nec in illas .

Accedat, si eadem daretur circulatio, frustraneam, & superfluam  
fuisse illam Naturæ diligentiam in serè vbique associando arteriam  
venæ, illasquè inter se varijs oscillis inuicem conspirantes officiendo :  
quia si par circulationem sanguis à venis in arterias, & ab arterijs in  
venas totus erat transiturus, ad quid illa itineris associatio, oscillorumq;  
tàm decantata coitio ? Respondebunt, non frustra, sed vtiliter , ac ad  
rem id à Natura factum esse ; coniunctas scilicet arterias venasq; ire, vt  
mutuò, ac vicissim se calore foueant ; vt arteriæ venarum adiuuent cre-  
bra sua vibratione motum ; & vt extremis anastomosis occlusis, per  
alias vias ab arterijs in venas ciaculetur sanguis : Sed inutiles, & super-  
uacue hæc utilitates sunt, nec à Natura intentæ : nam quoad primam,  
manifestum est quod , si mutuo motu vasa hæc indigerent, id esset magis  
ex parte venarum, quæ iuxta Circulantium dicta sanguinem in extre-  
mitatibus partium refrigeratum ad Cor reuchant, quàm ex parte arte-  
riarum ; vel saltèm mutuum, & tamen reperiri contingit venas sine  
arterijs , non has sine venis, prout tradit *Gal. 16. de vsu part. cap. 13. , &*

non inficiantur ipsimet contrariam opinionem insequentes. Quoad secundam res potius è contra est: nam siuè ex arteriæ motu, vt à multis autumatur, siuè à gravitate descendens succi, alterius tubi succum, vt Conringio videtur, ad ascensum impellente, ea expectetur utilitas, potius contrarium fore expectandum, rationabile est: mobile enim, vbi aliud mobile ad motum inuitat, secum trahit illud, non è contra; & sic cum arteriæ per Eos ad extrema deuchant, sic etiam venas incitent; Succum autem per tubulum ad infra fluentis impetus iuuat quidem alterius ascendens motum, si in quadam moderata, & paulatina ascensione alter dilongentur tubus, non autem si per idem ferè iter retrogredi per alterum quidem tubum, sed simul eundo connexum, ei opus sit. Quoad tertiam verò utilitatem frustra expectatur ea; cum non minus superiores, quàm extremæ anastomoses obstrui possint, & sicuti ad recipiendum, ita ad remittendum aperta oscula profunt; vt ideo non magis sint per ea venæ recepturæ, quàm reddituræ per eadem.

Sed nec talis fieri potest per arterias sanguinis transitus perennis. Primò ob continuum ipsarum motum per constrictionem, & dilatationem; cum eodem ictu non in vna parte sola, vel propè Cordis hiatum, sed in toto corpore idem arteriarum motus obseruetur: quare quantum receptioni prodest dilatatio, tantundem constrictione obest: Siquidem, si in rerum natura non datur vacuum, manifestum est, in dilatatione pulsus fieri in toto arteriarum excursu attractionem, vel sanguinis, vel spiritus, vel aeris ad totam dilatatæ cavitatis capacitatem implendam; in constrictione verò eorundem expulsionem: Ideo non per determinatam partem, nempe à Corde, poterunt sanguinem, ac spiritum totum recipere, & inde alio pallere: quia sic vna pars alteram impedit, aut agitat, & sic regurgitatio, vel vndositas saltèm, quæ non nisi in præternaturalibus obseruatur; tum quia nec tantus à sinistro sinu euolare potest succi, ac spirituum proventus, vt dictam possit replere cavitatem, & sic aliunde necessariò aduenient. Secundò, quia, his etiam datis, cum arteria corpus durum, ac crassum sit ad hoc, vt spiritui retinendo esset idonea, sic docente Galeno rationi innixo *lib. 6. de vsu part. cap. 10. iam cit.*, oscilla autem, si quæ adfunt adeo tenuia sicut, vt lynceum quoque visum effugiant, sicuti, & earum fines in densa corpora carnem, membranam, cutem, ossa &c. interaneantur; difficile ab ea exibat per anastomoses, & in eam recipietur sanguis, & non nisi tenuissimus; crassior autem remanebit, ne circulabitur. Neque dicatur, à Corde illum extenuatum iri: nam quod crassum est, per vltiorem cōtionem crassescit magis; nec calor dissoluendo semper attenuat, sed multoties crasse facit: Ast hic animaduertendum, quod Narueius cum suis Pedissequis, quando dilatantur arteriæ, Cor constringit, quando illæ constriunguntur, hoc dilatari tenent, & sic videtur cessare obiectum constrictionis, dilatationisq; nil propterea repugnantium; cum clarum sit indicium pulsionis à Corde in dilatatam Aortam. Illud autem experi-

Obiectum  
sensu.

Contrap-  
tio ex Ha-  
uio.

rentia oculari obseruauit in corde viui animalis à suis capsulis libero, ac dissecto: obseruabat enim, quando pectus pulsatur, tunc Cor dilungari, tendi, & adstringi; cum verò pulsatur in pectore, in quauis arteriæ parte pulsari.

Resoluitur.

Sed experientia hæc nimium fallax: nam clarum est, membrum sensituum, vt Cor, dilaniatum, scissum afflictumque non naturaliter quidem dilatari, ac moueri, sed modo quodam ferè conuulsuo. Et hoc est, quod ei imposuit, vt putaret, illam elongationem, quoniam cum tensione dolorifica, & quodammodo constrictiua fiebat systolem esse. Hoc autem verisimili nimium repugnaret, cum sentiamus per tactum, quo tempore pulsus in regione Cordis sentitur, eodem, & in carpo, ac temporibus ferire: Si ergo ille ictus in alijs partibus diastole est, ac dicitur, cur non in Corde? Et ratio idem dicat: nam vnumquodque sequitur naturam sui principij, nec potest quid moueri motu contrario ei, quo suum principium mouetur. In his autem hallucinatum ipsum esse, patet ex modo, quo Cor pulsans considerat, ac describit in suo *lib. de motu cordis cap. 2.* Nam inquit, dum Cor mouetur, vndique contrahi, magis verò secundum latera: in quiete autem ipsum laxum, flacidum, eneruatumque iacere, præcipue quando emori incipit. Nemo verò est, qui nesciat, pulsus, sicuti ex duobus motibus contrarijs constat, nempe ad extra in diastole, ad intra in systole, ita duas quoque esse quietes, vnam in diastolis, aliam in systolis sine: Si ergo in vtraque Cor flaccescit, & in vtroque motu tenditur, manifestum, quod etiam, & magis in diastole erit Cor duriusculum, ac tensum; cum maior vis ad se dilatandum, quàm ad se constringendum plerumque requiratur: Quare videmus, ipsum considerasse pro systole motum, pro diastole intermissionem morientis Cordis, non diastolis, ac systolis, quæ ambæ motus sunt, differentiam.

Patet etiam, ipsum in tali elongationis, & temporis obseruatione falsum esse ex eo, quod à Fautoribus suis in hoc experimento desertus est. Vnde videmus, Conringium *cit. lib. cap. 36.* cum Cor pulsatur, sursum ad basim mucronem eius contrahi, enunciasse; Deusingium quoque non equidem Cor elongari, sed quia tunc circum angustatur, longius ideo tunc videri *lib. de motu sang. & Cord.* asseruisse. Sed de hoc fusius proprio capite, vbi eodem, quo Cor, arterias motu moueri, firmatur, differetur inferius.

Obiiciunt  
septima.

Quod verò magis refert, Non est necessaria talis circuitio sanguinis. Ergo nec dabitur. Consequentia est nota: Naturalia enim talia ex necessitate sunt, & fiunt. *Arist. 2. Phys. 75.* Probatur antecedens: quia non ad nutritionem (cuius gratia sanguinis præcipue motus est) partium: nam ea fit quiescendo, non transeundo: vt enim partium natiuus calor agat, in futurum alimentum, & sibi illud assimilet, requiritur quies vtriusque, & aliquo tempore contactus; per circulationem autem non solum qui peruenit sanguis iter suum sequitur, sed & si quid antea iam firmabatur.

datur, vel illud secum rapit, vel continuo noui aduentu immutabitur, recrudescet, sicquæ actio turbabitur, nec vera nutritio fiet. Non ad euentationem: quia motus calidi succi per loca calida potius maioris est causa caloris. Non ad pulsus: quia cum is idem, & æqualis eodem tempore in toto corporis ambitu fiat, non sanguinis, alteriusuè tenuioris substantiæ per determinatum locum motus, sed per totam arteriarum communitatem eiusdem tractio, & expulso necessaria est, vt in obiectione quinta diximus. Non ad eius euitandam putredinem: quia vnumquodque in sua minera conseruatur sine alio motu; tùm ad hoc sufficit continua transpiratio, fumorumq; excretio; & si quidem aliquis requiratur motus, sat ille est, qui à continua partium attractione, consumptioneq; consequitur; tùm & iugis ipsius, ac spirituum ad varias corporis partes in occurrentibus animi, & corporis motibus transfluxus: nunquam enim vigilans homo quiescit, quin ad aliquid intendat Cor, & moueantur aliquæ corporis partes: vigilæ autem somnus succedit, vt possit homo sufficere, vt absumpti spiritus instaurentur, vt internæ coctiones melius perficiantur, vt partes inde omnes elaborato succo quietè fruantur. (quod enim caret alterna requie durabile non est.) Non tandem ad recalcificationem sanguinis ab ambiente refrigerati, vt vellent alij: quia dum in vasis est, suum retinet calorem sanguis, extrahatus, in partis abit naturam, vel concreuit; tùm & in partibus tantùm externis hic haberet locum finis, quibus occurrit aer, non in internis, quæ mutuo calore fouentur; & tamen idem in omnibus, imò & in ipso Cordis ambitu supponitur motus. Quæ contra hanc obiectionem militant, & quæ pro ea sunt, infra, vbi rationes pro circulatione afferuntur, examinantur, & refelluntur, ne sæpius eadem repetantur, legi poterunt.

Insuper: Vel in Corde datur chyli in sanguinem conuersio, vel sanguinis circulatio, vel vtraque, vel neutra. Non vtraque; quia hæ duæ actiones, sibi inuicem contrariæ, & prorsus incompatibiles sunt: nam circulatio cum sit motus irrequietus, retentioni, quæ quietem importat, opposita est, nec potest nisi tractione, vel pulsione, vel vtraque continua, & ordinata fieri: Coctio autem, cum alteratio sit, fugacem spernit motum, retentionemq; potius supponit, & mutuat actionem, ac passionem alterantis, & alterati. Quomodo ergo ambæ simul poterunt eodem tempore, & ab eodem exerceri subiecto? Sed & illo dato, non autem concessis, quomodo poterit Cor tot adstare, ac resistere munij, sanguinis coctioni, circulationi, cogitationi, animi passionibus? Non alterutra; tùm quia id esset contra Iuniorum ipsorum dogmata, quæ in Corde, & sanguinem confici, & ab eodem continuè excipi, impelliq; pro circulatione contendunt; tùm quia sanguificationi obstant, quæ in prioris Libri principio, & progressu rationes allatæ leguntur; circulationi autem, quæ nunc adductæ, & quæ plures adducendæ sunt; tùm quia rationes, quæ pro earum vna faciunt, alteram impugnant:

Obiectio  
Quarta.

Ergo neutra valet exerceri, sed quid medium ex vtraque refractum, coctio scilicet cuiusdam portionis pro sanguine arterioso, & spiritibus instaurandis necessariae, eiusdemque impulsio in omnes arteriacas regiones, ut cunctis calorem, vitamque impartiat partibus.

Ad hanc ob-  
iecti-  
onem  
responsio.

Eiusdem dis-  
solutio.

Respondet autem nonnullus, coctionem, ut quaedam veluti generatio est, momento posse à valido Cordis calore perfici, & ideo non esse impossibile, vtrumque, motum scilicet, & sanguificationem simul esse: Sed fallitur sic respondens; primò quia huiusmodi actio propriè generatio non est, sed alteratio in qualitate, ut ait *Gal. 3. de sympt. cau. 1.*, cum non corrumpatur substantia, sed quaedam solummodo accidentia immutentur; quæ ideo mutuam actionem, passionemque; agentis, & passi requirit, nullo modo in vnusistū oculi habendam, quicquid dicatur de præuia dispositione in deferentibus vasīs acquisibili, quorum temperies quantum in calore Cordis temperie remissior subsit, alia egere nequaquam probatione opinor; ut propterea talem in ijs dispositionem adipisci, quæ finalis ferè sit, & Cordis temperaturæ proxima desperandum censeam. Fallitur secundo: quia, etiam si talis operatio generatio dici mereretur, neque in instanti haberi potest: præuia enim ad eam præparatio requiritur, non ab alijs, sed ab eodem generante inferenda; utcumque sit de aliqua extrinseca adiuvante causa, vel præambula dispositione ab alio acquirenda; quia talis nunquam est, ut simile quid omnino generari fiat, ni eiusdem sit naturæ.

Conringij  
animadvert.  
60.

Sed verò hoc aduertens Conringius *cit. lib. cap. 34.* statuit, non singulo istu, quod in Cor ingreditur ob diastolem, systole exire. Hæc porro (inquit) elaboratio sanguinis non sit longa quadam temporis mora, sed exigua: aliqua tamen. Neque enim omnis sanguis, qui illabitur siue in dextrum, siue in sinistram sinum tempore diastoles, proijcitur iterum in systole: Namque id fieri non posse, arguit capacitas orificij venæ arteriosæ, & Aortæ longe minor orificio arteriæ venosæ, atque venæ Cavæ. ] Huius alteram quoque assignat causam, quod sanguis ex auriculis Cordis in sinum elabens, quodammodo descendit, sensim post modum ascensurus, donec emittatur: At in hoc, quod verissimum apud me est, videat acutissimus Vir, quomodo Circulatio sua possit consistere: si enim quolibet istu maior ingreditur quantitas, quam egrediatur, clarum est, vel postea Cor ab attractione destitutum, in expulsionem preseuerans, vel ab vtraque cessaturum, ut coctio-  
ni incumbat. Patet igitur, nec vtrique muneri, nec alterutri irrefracto Cor incumbere. Iam  
verò ad alias non infirmiores obiectiones  
gradiamur.

Retorquetur  
in ipsum.

## CAPVT QVARTVM.

*Ostenditur causarum diſſi circulatorij motus insufficiencia, & pro eo diſpoſiri modi incongruitas.*

**N**EC enim imbecilliora adhuc ſuperſunt famigeratæ circulationi obſtantia, ex quibus pro nunc vnum tantum aſſerre delibero, ne in tædioſam longitudinem Capita abeant. Obſtat igitur eidem non minus, quod nullum eſt dare mouens, quod vel ſolum, vel cum alijs cumulatū poſſit huic circulari motui vitam dare; nec modum, quo aptè iſ poſſit perſiſtere. Et primò non ſufficit Cor: quia dato, quod & attrahat, & conſequenter expellat, ſolū id quo opus habet, vt & alatur, & ſpirituoso gignendo ſanguini ſit ſatis, trahat. (nil enim vltra ſuam quærit indigentiam); expelletq; id ſolū quo grauatur (: quid namque aliud, niſi moleſtans, eiſcitur ?) nec ea vi, quæ poſſit vſque ad extrema pertingere, ac multò minus, quæ valeat retrogreſſum in venas ſic è longinquo iuuare. Cum nulla vi adeò efficax, quæ in tot flexuoſitates impingens, non frangatur.

Obſtatio  
nona.

Ad ſanguinis  
circulationem  
peragendam  
nō ſufficit Cor.

Non ſecundò arteriæ: quia vel admittunt ſolummodò, & ſic nil conferunt; vel attrahunt, nec impellunt, & ſic vltra ſe nil operantur; vel impellunt nec attrahunt, & ſic in ſe nil efficiunt, extra verò paruam habent efficaciam; vel vtrunque agunt, ſed non ſimul: quia contrariæ hæ duæ actiones ſunt, varijsq; fibris, & varijs conatibus gaudent; proinde non poſſunt, niſi conſecutiue, vna ſcilicet actio poſt alteram conſiderari in arterijs, itaut in dilatatione attractio, in conſtrictione pulſio fiat, vel è contra: Sed, vt vt ſit de attractione, pulſioneq; in genere, quæ procul dubio in arterijs adſunt, de ijs, quæ pro circulatione iuuanda requiruntur, ſummè dubitandum eſt, neutram in arterijs locari; non attractionem: quia, ſi omnes ſimul attrahunt arteriæ, quomodo ille ſolus à Corde exitus ſufficiet, vt modicum quid omnes accipiant, quod pro implenda earum dilatata capacitate ſufficiat? & ſine tempore extremitates contingat? Clarum eſt, in diſtrole arterias omnes ſaltem ſemiduplò fieri latiores: quantum ergo ſanguinis, ac ſpiritus ad hoc requireretur! & qua velocitate mouendi! Si verò non omnes ſimul, perſiſteticus, vnduſuſquè, non æqualis erit arteriarum motus. Non impulſionem: quia, ſi ſimul omnes impellunt, cum longus, multiformis, & ſæpè flexuoſus ſit illarum excuſus, itaut illico non poſſit quid à caudice ad capillamenta ob mutuū expellendi corporis impedimentum peruenire; maniſeſtum eſt, expulſionem non ad extremitates ſolas, ſed & ad omnes anastoſes (& hæ etiam in truncis adſunt); imò & ad Cor ipſum fieri. Et ſic interturbabitur venalis ſanguinis motus; ſi verò non omnes, eodem modo vnduſus, ſeu fluctuans arteriarum motus erit. Adde, neque Harueianos hæc actiones in arterijs admittere, qui putant,

Nec arteriæ  
ſufficiunt.



tant, sanguinem sola cordis impulsione per arterias ferri non secus, ac si vasa ænea, lapidea, coriacea, in animata essent; imò & ex illo in partes impietū iuvari regressum in venas vsque ad Cor ipsum; quasi, & sanguis impietū, & par sicta lapides sint, & repercussionem efficientes. Quibus positionibus nil inuicissimilius poterat enunciari; Vt ex hoc multi ab Auctore descuerint; Et inter cæteros Conringius, ex venarum  
 „ ligatura falsitate illius opinionis venatus: cum videatur (ait ipse)  
 „ ligata vena, sanguinem nihilominus ad Cor versus moueri; ligata  
 „ verò arteria, etiam vltra ligaturam sanguinem ad membra fluere,  
 „ & sic non solo cordis impulsu, qui tunc a vinculo citra dubium im-  
 „ peditur.

*Hæc partes  
 ipsæ sunt sa-  
 tis.*

Non tertiò partes ipsæ: quia ipsæ etiam vel solùm excipiunt; vel attrahunt, consequenterq; expellunt. Si excipiunt solùm, clarum est, nil ad motum sanguinis collaturas; Si attrahunt, cum in eas non arteriæ solæ, sed & venæ inferantur, & utræque sanguinem contineant, liquet, non minus ab his, quàm ab illis eas attrahuras fore; Tùm &  
 „ non, vt expellant, sed vt alantur, fruuntur; Cum nihil in rerum sit  
 „ Natura (ait *Gal. lib. 3. de nat. facul. 6.*) quod propter ipsum, vt sic  
 „ dicam, trahere, siue trahendi functionem trahat; imò vt eo, cuius  
 „ per tractum sit compos, fruatur: atqui frui eo non licet, nisi retineat.) Tùm consequenter nec attrahunt semper, sed quando indigent; non indigent autem, si iam potiantur; nec magis, quàm possint conficere pro sui alimonia (omne namque naturale a non errante intelligentia ducitur.) Tùm nec sic validè, vt Cor, & viscera euincant. Si expellunt, non magis quoque in venas, quàm in arterias, videntur impulsuræ; imò magis in has, vt quæ dilatatione sua aditum influenti possunt præbere succo, suamquè capacitatem non multo sanguine, sed cedente spiritu refertam possident; neque sanguinem, quo aluntur, nisi ipsis grauis, vel molestus fiat (talis autem non erit semper); & sic neque continenter, sed vbi solùm suæ satisfecerint egestati; nec ea efficacia, quæ extra se valeat in venis ceptum motum iuuare.

*Hæc venæ.*

Non quartò venæ: quia nullam habent in se sic trahendi, aut indescinenter impellendi occasionem non trahendi; quia attractio, dempta vacui ratione, vel gratia fructuionis, vel similitudinis sit, ipsæ verò iam sanguine fruuntur, nec illo indigent. Non impellendi: quia sanguis ipsis familiarissimus est, & nisi sit vitiosis, aut copia exuperet, ipsis molestus esse non potest; & vbi sit, potius aperiendo ora sua, quàm intra se, pellunt; & sic videmus per nares, os, anum, vterum, multoties salubriter sanguinem exire: omnis enim expulsio extra se, non ad intra per expellentem fit.

*Hæc simul  
 quædam.*

Non tandem dictæ partes omnes simul, tùm, quia plurimæ exceptiones adductæ, quæ singulis obsunt, etiam omnibus iunctis nocent: Tùm quia vnaquæque harum partium ab alia situ, forma, temperie, & substantia differt, idè etiam functione; Tùm non æqualis singularum potentia,

potentia, sicquē nec in vllam actionem communem ordinata habilitas esse potest; Tūm per earum singulas, præcipuē arterias, venasquē longus est excursus, propter quam mutua coadiuuatio inturbabitur eō, vt effugi non possit, quin ad earum singulam actio tota interdum incumbat, & sic vigeant contra singulas iam adducta obstacula.

Aliqui ad sanguinem ipsum confugiunt, sic sperantes vniformi, & generali motui vniformem quoque, & vniuersalem adaptasse causam: Et sic ei motus facultatem tribuunt, tamquā animato, suisq; potentij ducto: Sed hi omnium maximē decipiuntur. Primò quia nec sanguis viuut, nec quicquam perreptat, vt videre est in pelui, etiam statim ipso exhausto ē venis, nullum in eo ne minimum quidem motum obseruari; nec ab eadem rationali, vel sensitiua anima informari potest, cum à partibus omnibus seiunctus sit, non continuus; nec, vt liquor, corpus organicum est, cui possit ritē anima, quæ organo pro motibus necesse habet, adaptari. Secundò quia, etsi animatus esset, & ex se moueretur, non posset tali perenni motui se dedere: nullum enim naturale agens sine fine agit, esset autem sine fine motus, cui quies non sit annexa; nec minus circulari; quia nullum mixtum superat conditionem miscibilitum: cum autem nulli elementorum talis motus naturaliter inest, nec sanguini, qui ex elementis constat rectē adscribi potest. Tertiò quia nec vllum animatum corpus in gyrum naturaliter mouetur, ergo nec sanguis.

Nec sanguini ipsi motus adscribendus est.

Sed nec est assignare modum, quò aptē dictus possit circularis motus subsistere: Etenim ad hunc non valet æquipondium tūm quia hoc in animalibus non valet, in quibus nec grauitas, nec leuitas quicquam primario operantur; Tūm quia nec in casu datur, cum maior semper sanguinis copia addit in venis, quā in arterijs; Tūm quia, etiam si daretur, sanguinis arterialis raritas, leuitas, caliditas, ac spirituositas opponitur quodammodò densitati, grauitati, tepori, ac corporeitati sanguinis venalis, itaut, si in illo fugacitas, in hoc otiositas, si in illo volatilitas, in hoc fixatio, & si in illo celeritas, in hoc segnitias rationaliter debeat præualere; quæ quomodo ordinato motui quadrent, iudicet quiuis doctorum causarum, & motus speculator egregius.

Ad talem motum non valet æquipondium.

Non sola valet attractio tūm quia hæc propriē ad fructionem, alitiorum, vel vnionem, non ad motum, non ad fugam, non ad separationem videtur à rei natura ordinata: motus autem continuus hæc in se videtur includere. Tūm illa videtur validiorem energiam in attrahere, quā in remittente, seu permittente, quæ in casu nec habetur, nec haberi potest; illud quidem, cum nulla pars Corde in trahendo validior sit, ipsumquē qualibet validius, multò; hoc verò, quia in circulo pars attrahens simul sit remittens, remittens, attrahens. Tūm illa supponit terminum motus, ad quem res trahatur; in circulo autem nullus terminus, nullus finis; sed omnia finis, omnia principium.

Sola attractio ad circulationem non valet.

Non sola pulsio: quia hæc auersionem in pellente significat, violentiamq; in impulso: at neutrum in partibus animatis versus familiarissimum,

Necque sola pulsio.

riſſimum, & alimentitium ſuccum debet ſupponi. Item hæc validiorem ſupponit, & exigit impellentem partem recipiente, ac admittente, & hoc nec in caſu habetur, nec ritè, admittitur. Non illud; quia Cor validius quolibet alio impellit; quare ad recipiendum ineptius: non hoc; quia, vt dictum eſt, in circulo nullum impellens, quin fiat recipiens, & e contra. Item hæc ſupponit originem motus, nimirum vbi pellens conſiſtat: at nec in circulo hæc habentur, cum nullibi origo, nullibi meta.

*Neq; vtraque ſimul.*

*Neq; ambra alternatim poſſim.*

Non vtraque ſimul: quia attractio, & pulſio motus contrarij ſunt, igitur à contraria cauſa, ergo nec ſimul in eodem ſubiecto, & eodem prorsus tempore eſſe poſſunt. Non tandem alternatim, vt aduerſò ſupponitur, ſingula ictoſa parte: quia, vt dictum eſt, quies intercedere debet; diaſtoles autem, ac ſyſtoles, tùm in Corde, tùm in arterijs ſic breui tempore conſpiciuntur, vt plerumque interſtitium ſenſu indiftinguibile ſit: hi ergo motus, vt iſtantianei, poſſunt quidem tractionem, pulſionemue aliquam alternatim inducere; at non eam, quæ tùm reſpectu materiæ, tùm quantitatis, tùm lationis, ad circulationem totius ſanguinis perenniter repetitam requiritur.

*De contratio ſanguis motus in Caua ambigitur.*

Rurſus non videtur, quomodo in Caua, quæ è directo à Iecore aſcendit ad Cordis dextram auriculam, ac inde, ſolo in eius dextrum ventriculum aperto foramine, iſdem fibrarum ductibus rectis, tranſuerſis, ac obliquis, eademque cavitatis rectitudine, ſine valvulæ vllius obſtace, ſuſum continuatur uſque ad axillares; poſſint duo contrarij motus excitari, nempe à ſuperioribus ad inferiora, & ab inferioribus ad ſuperiora, itaut in Cor ſanguis vtrinque moueatur; niſi ponamus, vel ſint Cauæ tractione, ac pulſione ſanguinem ab ipſo Corde attrahi, vel à Cauæ ipſius foraminato circulo in illud impelli, ac reliquum ex vi vacui ab omnibus ſuccedere partibus. Sed vtrunque eſt incongruum, & irrationabile: Nam quomodo Cor ager indiftans contrarijs motibus, impellendo ſcilicet per arterias, trahendo per venas? patet quippè, quicquid in remotum agit, per inuiſibilem, ſpirituofamque qualitatem, vel ſubſtantiam quandam agere, à qua contrarios motus cieri, impoſſibile eſt: ſi enim ſympathica ſit, attrahet quidem, vt magnes ferrum, non pellet; ſi antipathica, pellet, non attrahet. Quod ſi dicamus Cor trahere à Caua, & ab alijs vi vacui ſuccedere (de pulſione ſat ſupra dictum eſt), quæ Naturæ diſpoſitio, vt ſemper violentè à venarum ramulis omnibus ſanguis rapiatur? Si autem illud Cauæ foramen impellere dicatur, fruſtra impellet, ni ſubito alius ſuccederet ſanguis, iterum impellendus, qui ſi ſuccedat, iam in dictum incidimus violentum ſucceſſum. Integra ergo remanet obiectio, quomodo per eandem Cauam ſanguis poſſit contrarijs motibus agitari, vt tamen nec inferiùs, nec ſuperiùs ſine vllò obice ſiſtatur à ſuo motu ſanguis vterque, ſcilicet aſcendens, & deſcendens, & in Cor deſceat.

Quandam ſolutionem aſſert Galtrucchiuſ, quam tamen ſolutam in hæc

Ano. Libri, vbi huius Auctoris seria ponderantur, ac effringuntur obiecta, inuenies.

Hermannus Conringius *lib. de sang. generat., & motu cap. 41., & 42.*, Conringij de causis circulationis optio.  
volens causam exquirere ad circularem motum suscitandum, & manutenuendum idoneam, ac sufficientem, respuens in primis omnes ab Antiquis motui sanguinis in animalibus adscriptas causas, tùm & solam redarguens Cordis pulsionem ab Harueio habilem putatam, proindeq; concludens, necessariò, & attractionem requiri; vtrunque ingeniosè quidem in Corde disponit: nimirum pulsionem ex valida eiusdem constrictione in systole exerceri; stabiliens; attractionem verò ex eiusdem met exuperant calore, qui vndique à venis trahat, deuenire, arbitraturs. Eo scilicet modo, vt in arterias sanguis pulsione feratur, à venis autem calore iterum ad Cor alticiatur; Quas quidem, vt insufficientes putatas, iuuari, credit à gravitate, & leuitate sanguinis, & à fuga vacui; videlicet gravitate iuuante descensum præcipitem in arterias descendentes, & a venis superioribus in Cor; consequenter autem ascensum in arterijs superioribus & in inferioribus venis, prout aquæ, aut alterius succi descensum per ductum aliquem, aut syphonem videmus ascensum parere in ductu alio ad eandem prioris altitudinem ascendente: Leuitate verò, à calore illi præstita, ascensum in Aorta superiore, & Caua inferiori accelerante; Sicuti, & vacui fuga operante, vt succo præterfluente contiguus alius succus indeficienter succedat.

Verum enim verò tot cumulare causas, easq; inuicem contrarias videtur in naturalibus absurdum: Vtunque enim esset, quod ab eadem causa possent duo contrarij effectus prodire, vnus quidem illorum erit per se, alter verò per accidens, sicut Sol diei, ac noctis; gravitas descensus, & ascensus: At quod vnum, & idem possit contrarijs operari modis causisue, contrariisq; edere effectus per se, hoc nullibi apud Philosophos inueni: quomodo ergo in vno gravitas esse, & secundum illam operari potest, quod simul leue sit, & per leuitatem agat? iuuat sanguinis gravitas descensum suum in Aortam descendentem per se, per accidens autem ascensum in inferioribus venis ad Cauam; iuuat pariter eodem modo descensum suum in superioribus venis ad eandem Cauam per se, & per accidens ascensum in Aortam superiorem: quomodo concipimus exinde, eundem sanguinem leuitate sua, sibi à calore præstita, coadiuuare per se ascensum, qui fit in superiorem Aortam, & in Caua inferiore, per accidens autem descensum, qui fit à superioribus venis in Cauam ascendentem, & Corde in descendentes arterias? Enim verò, vel gravitas in sanguine est, vel leuitas: Ergo vel secundum illam, vel secundum alteram operabitur.

Gratis autem dabantur hæc: sed si exactè res perpendatur, inuertifimillima est illa comparatio sanguinis per venas, arteriasquè delati ad aquam per canales, & aqueductus esluentem. Primum quia in hac consideratur aquæ motus secundum suam naturam, per quam, vt grauis,

Videm opio respiciunt

Exemplum aquæ, in duabus fluens, sanguinis motui improprietatem.

deorsum abit per decliuem locum, huncq; inanimatum, & qui nil, præter datum transitum in ipsam agit. Secundò in descensus, vel ascensus sine durum, ac solidum corpus adest, in quod influens impingitur, & sic retroagitur succus. Tertio in dictis aqueductibus, si ascensus aliquis descensui interponitur, non ille subitus, vel retrogradus, sed paulatinus, & cursum suum prosequens; Quæ omnia contrario modo in fluente se habent sanguine: nam hic, ut actualiter calidus, & in viuentis corporis facultate positus, secundum gravitatem suam, aut leuitatem minimè operatur, vel mouetur, sed à viuentibus, ac animatis partibus vehitur; in fine descensus, vel ascensus non in duram illidit substantiam, quæ ictum valeat retroagere, sed in porosam, spongiosam, & potius alliciendam, quàm repellentem; & per retrogradum deberet motum incedere, nimirum per venam arteriæ coniugem, & vbiq; contiguam, ut proinde, solo vase remisso, contrarium omnino iter illi esset peragendum. Ex quibus, nisi decipiar, constare, arbitror, improportionatam arguitionem illam esse, à gravitate labentis aquæ desumptam.

Gravitas, leuitasq; circulationem non promoueat.

Sed & amplius, incongrua est dicta gravitatis cum leuitate associatio pro circulatione promouenda: quia, (data etiam comparationis congruentia) si gravitas iuuat in Aorta inferiore, & Caua superiore descensum, cur non, & in Caua descendente, & in superioribus arterijs? eadem enim decliuat in omnibus est. Vel si leuitas iuuat ascensum in Aorta ascendente, & in Caua inferiore, cur non similiter in ascendente Caua & in Aorta inferiore? Idem in eodem corpore, & per eadem vasa quomodo non idem efficit? Adde, in animato corpore, cuius positus ad libitum variat, non bene decliuitatem, vel planitiem, descensum, vel ascensum describi, ac determinari? Non bene igitur gravitas, leuitasq; inter causas circulationem promouentes reponuntur?

Aditio caloris inter causas circulationis incongrua.

Eadem incongruentia sequitur constitutionem caloris uti causæ attractionis, & constrictionis arteriarum, per quam sequatur expulsio: Etenim si ob id calor systoles causa est, quia spiritus agit (verius eleuat) fibris insitos, à quibus validata vis pulsifica vehementer constringat, & sic pellat, cur non eodem modo, eandemq; ob causam tum Cor, tum arteriæ dilatabuntur, & sequetur attractio? frustra igitur addit attractio, & pulsioni Cordis calor; cum vel sufficiat duas illas statuere circulationis causas: quarum tamen insufficientiam supra tetigimus) vel solum calorem, tamquam ambarum causam, adducere: nam si dixerit, à calore per accidens sequi expulsionem, hoc est per systolem; non minus per accidens ab eodem sequitur tractio, hoc est per diastolem, aut aliquam sanguini aditam qualitatem calori conspectaneam.

Vacui fuga à circulationis causis ableganda.

Non iuste minus vacui fugam à causarum circulationi adscriptarum consortio ablegabimus, si dicemus primò, hanc in corpore circumquaque aeri, spiritibus, humoribusq; perui inutiliter timeri, imò nec dari manifestum siquidem est, facilius aerem, spiritumq; in locum educti corporis subsequitur, quàm sanguinem. Secundò nec in molli ductu,

## CAPVT QVARTVM. 123

& facillimè concidente. Tertio nec in animato, cui æque retinendi, ac pelliendi, vel attrahendi facultas indita sit. Quarto nec in eo, quod, succo plenum, illum non extra se mittat, sed in se contentum à supra infra, ab infra supra agitet. Quinto nec in rationali animante cuius formæ dignitati non parum detrahitur, si vacui timore eam induci dicamus ad inutilem sanguinis gyrationem; cum ei sufficiat motum sistere, & corpus alere. Sed & alijs serijs iuribus huiusmodi causarum Contringiana cumulatio à D. Gaspare Brauo refellitur *Resol. Medic. part. 5. disput. 1. resolut. 11.* Vt propterea hic pluribus non sit opus.

## CAPVT QVINTVM.

*Alia admittenda circulationi oppositiones fiunt, & earum solutiones adducta superantur.*

**N**ON minus eidem Circulationi obstant ij circuitus, qui in doloribus capitis, oculorum &c. quotidie, vel alternis diebus, vel per longiora intervalla observantur; sicuti, & in febribus quotidianis, tertianis, & quartanis tam intermittentibus, quam continuis. Nam si circulatio fiat, clarum est, saltèm quotiès circulationis motus perficitur totiès cum sanguine humorem morbificum ad affectam partem, vel ad Cor rediturum; imò maior, & generalis circuitus particularem debere atterere; quomodo enim quiescet humor in venis, si totus sanguis moveatur? aut quomodo in parte, si per eam continuus sit sanguinis ab arterijs ad venas transitus? Et si hæc obstructa supponitur, cur poterit alias, & non cum circulato succo illum movere? Vt verò hanc objectionem effugiant, variè se contorquent circulationi fauentes, se tandem in hunc angulum conferentes, esse huiusmodi res præter naturam, & utrunque lateas specifica illorum circuituum causa, non tamèn perinde fieri, quin circulatio subsistat. Bona quidem verba, & quæ, si de circulatione constat, acceptari merentur. Illud verò disputatur, negatur, & per hæc, quæ obstatè videntur, contenditur. Motus quippe humorum ille est, etsi morbosus, naturalis tamen; nec per vim, sed a Natura peractus; nec extra venas semper, sed per venas ut plurimum, per arterias non rarò; nec pravi humoris tantum, sed & magis sanguinis, vel vitiosi, vel exuperantis. Quibus omnibus, nullo externo addito, nulla è mutatione extrinsecus adveniente, quomodo possit, si delationi reductio, & reductioni traductio per circulatorias leges respondet, vita dari, intelligi minimè potest, nec ab ulla causa circulationi attributa suaderi. Quicquid autem sit, ex hoc proinde arguitur, circulationem minimè necessariam, quin sine ea homo possit consistere, cum intermedio accessuum tempore liber ea in parte à dolore degat homo, & febre vacuus, nullumq; ex his aut paruum vitæ periculum impendeat, item nec sic ab impulsu Cordis trudi sanguinem, quin, & partium recipientium, &

Obiectio 6<sup>a</sup>  
simil.

Quid ad hæc  
respondetur.

Eadem responsio  
insinuat.



vaforum tùm deferentium, tùm receptantium actio requiratur præcipue; tùm & circuitus humorum, si qui in homine sensu percipiuntur, præternaturales esse, partium parere affectiones, earumq; diagnostica parare signa.

Obiectio  
vndecima.

Relictura  
responsio

Alia respon-  
sio confuta-  
tur.

Tertia re-  
sponsio re-  
solvitur.

Obiectio du-  
odecima.

Obstant autem, & cutis efflorescentiæ, exanthemata, erysipelata, phlegmones, varices, scabies, aliaquæ tùm sanguinis, tùm humorum exiturarum genera: quia, si circulatio fieret, nil horum persistere deberet, sed solum eundo fieri, redeundo evanescere: si enim venæ id habent, ut sanguinem, ab arterijs ad membra delatum, in Cor redeant, cur inibi illa firmantur? Nec possunt dicere, vitiosos humores esse, ideo non trahi à venis, tùm quia iam ipsi fatentur, non tractione sola, sed & pulsione simul, vel etiam hac sola circularem perfici motum; à vitiosis autem succis magis pultrix excitatur facultas: tùm quia plerunque æstuentes, & ab exuperante calore attenuati huiusmodi humores, magis ad motum apti, & proni videntur: tùm quia aliquando sanguis copiosus quidem est, sed probus, ut in phlegmonibus, & varicantibus quibusdam venis: Nec rursus valet dicere, non redire ea propter aliquam obstructionem: cum in huiusmodi corporibus, ac membris, siue fiat phlebotomia, siue ligaturæ adhibeantur, eadem experimenta proficientis, & recurrentis (ut putant) sanguinis obseruentur, ut in alijs. Signum, si à talibus phenomenon sanguinis reditus probatur, etiam in ijs fieri, nec impediri; ultra quod, si reditus impediretur, daretur autem aditus continuus, in molem intolerabilem omnes abirent abscessus. Nec tandem vrget responsio, non valere exempla corporum ægrotantium ad sana. Primum, quia, si tali responso nostra elideretur obiectio, necessarium omnis Neotericorum statim corrueret innovatio. Cum quodlibet suæ opinionis fundamentum consistat in experimentis factis non in ægris tantum, sed & agonizantibus ipsis. Secundò corpora huiusmodi propriè non semper ægrotant, sed aliquando adhuc valent, vel in crisis conualescunt, vel neutra sunt. Tertiò siue sanum, siue infirmum sit corpus, si circulatio sit, sanguis circueat omnia secum trahere deberet: necessarium autem, si datur naturaliter, perseverare habet: qualibet enim siue naturalis, siue vitalis actio aboleatur, vel in toto, vel in membro, illius interitus est, vel dubio procul appropinquat. Præter quod, si pulsus est circulationis origo, & fundamentum, illo in talibus existente, & hæc persistere debet.

Obstat in super ea, quæ in quibusdam partibus, earumq; venis sit collectio residui nutrimenti, ut in mammis lac, in testibus semen, in glandulis albus succus: si enim circularetur, qui sanguis partibus superest, cur in ijs illa exuperantia? & cur ex maiori mōra maior quoque horum succorum copia congeritur, usquequo Natura lasciuiens eos extrudat per naturales earum ductus? manifestum enim, quod ibidem stagnare non deberent, sed recurrere, si modò omnium venarum proprium est reducere versus cor sanguinem ad partes per arterias transmissum.

Enim

Enim verò, si quid aliud, obiectum hoc summè circulationem deprime-  
re videtur: Propterea huic dupliciter obveniunt pro ea pugnantes: Pri-  
mò namque negant nonnulli, & inter cæteros Deusingius, Bartholinusq;  
ex sanguine lac fieri; sicuti, & alij inter quos nuperimè Pallierius,  
femen: sed ex chylò immediatè procreari contendunt. Secundò vasa  
lac deferentia, continentiaq; vti & semen, inter veras venas non con-  
numerant, sed alterius generis tubulos opinantur. His positis, qui pri-  
mum, ac secundum tenent, facillimè se ab his exbrigrant obiectis: si enim  
non ex sanguine, neque in venis illa collectio, nec quicquam contra cir-  
culum operatur. Qui secundo soli inhxerent, ad naturam partis, quæ  
illum succum ex sibi adueniente alimento coaceruare studet, reliquo  
succo per venas circulari permisso, confugiant hoc fieri, asserentes citra  
circuli infractionem: Atuerò contrà sensus ipse est, qui, vt Veteres Ana-  
tomici vnà cum Vesallio, & Faloppio literis tradidere, venarum axilla-  
rium, & feminalium illas respectuè soboles esse, iudicat; & euentus,  
qui docet, per sanguinis missionem lac, semenq; non solum minui, sed  
retrahi ad spatularum, lumborumq; venas; lac nonnunquam ex re-  
pentino timore, mærore, & inedia à mammis abire, & ferè cum mu-  
lieris querela, & dorsi grauitate euanescere; papillarum suæui nimio,  
violentoq; coictui sanguinis excretionem, loco lactis, ac seminis subse-  
qui. Se de his, Deo dante, in sequenti Libro ad vnguem disceptabitur.

Ad eam re-  
spondetur.

Responso  
deijctus.

Obiecto de-  
cimæ.

Amplius: Multi videntur in corpore sanguinis, ac spirituum motus  
contrarij circulationi ipsi, & inter se: Ergo illa non datur. Antecedens  
probat ex eo, quod homo diuersis animi passionibus tam ob fortunata,  
quàm ob aduersa fortis accidentia, quotidie subiacet; gaudio scilicet,  
mærore, iræ, amoris, odio, pudori, timori, horrore, spei &c.; item & alijs  
corporeis, simulq; animalibus passionibus dolori, horrore, somno, con-  
cupiscentijs venereis, alijsq; similibus affectibus, per quos videmus ma-  
nifestò, sanguinem non magis spirituosum, ac arteriacum, quàm veno-  
sum, volare, ne dicam moueri, modò ad Cor, modò ad exteriora, nunc  
ad varias, nunc ad determinatas partes; Quod non fieret, si circuitio da-  
retur, eo modo maximè, quo supponitur, nempe quod arteriæ hoc ideo  
pulsent, quia impleantur, vt vtres, ac sanguis per eas impulsu Cordis  
feratur. Videmus ergo, in gaudio ad oculos, genas, os, ac in totum  
corpus statim sanguinem expandi, per lachrimas, rubicunditatem, ri-  
sum, titillationes, gesticationes partium. In timore, ac terrore san-  
guinem è contra, ac spiritus intro se recipere, ac concentrari, itaut ani-  
mus langueat, tremant artus, pallefiant omnia, & frigus inuadat am-  
bitum, nec ligatæ venæ turgeant, nec tuniæ effundant; In ira sanguinem  
circa Cor ebullire; feruere ideo spiritum; furere artus; oculos, os, ma-  
nus quodammodo conuelli; pulsusq; augeri; In mærore, odio, amore  
sanguinem inibi si mari, macerari, extenuari, quod dignoscimus ex  
cordis palpitacionibus, demissionibus, & interturbationibus pulsus, par-  
tium palliditate, virium languore &c. In pudore mirum, quomodo sic

statim

statim conuolet ad genus sanguis, & inde statim retrocedat. In horrore demittitur pulsus, anima contremiscit, spiratio confunditur, calor aufugit, robora languent. In somno item ex sanguinis, spirituumq; inter-natione clauduntur sensus, otiantur membra, iacent omnia, exteriora pallent, frigent, silent. Sed quid de impetu Veneris? in quo cuncta titillant, turgent, vrgent, angunt, languent, tandemq; flauescunt. Quæ, & quot mutationes in his omnibus raptim eueniunt? Quas contrarietates circa hæc subito non experimur in dies? Consequentia ergo clara est, cum facillimè hæc metamorphoses eueniant, arterias nulli ligatas esse sanguinis, ac spirituum determinato motui; sed vt occasio, ac animus fert, imperat, hos moueri, retrahi, resistare.

Conringij ad  
illam respon-  
sio.

Huic obiectioni occurrit Conringius *cit. lib. cap. 43.* Summaq; suæ responsionis in hoc consistit, quod, constituto, perpetuum illum circula-rem dari motum, hos verò etiam peculiare motus verissimos esse; di-cendum est, ab his peculiaribus generalem non impediri motum, sed potius eiusdem varias esse differentias, itaut simul possint, & generalis, & particularis motus consistere; Et varietatis causam esse, quod arteriæ aliquando minus deferant, venæ autem referant magis; vel aliquando plus arteriæ deducant, minusq; reducant venæ. Id vero modò in toto contingere, modò in aliqua parte; sicuti nec impediri, quin, & per quoddam tempus in parte aliqua cesset modò affluxus, modò refluxus, modo vterque.

Resoluitur  
dicta respon-  
sio duplici-  
ter.

Sed videat solertissimus Vir, ex suis hypothesibus, & natura rei, di-ctas rationis metas non subsistere: Prius autem notandum est, Ipsum sub conditione responsionem deducere, itaut, cessante illa, hanc simul corrumpere, sit necesse. Cessat autem conditio: quia nulla ex suis, alio-rumue rationibus, sensationibus, illationibusquè, quibus prætendant perpetuum illum circularem motum arguere, ac probare, ad hoc suffi-ciens est, vt iam demonstrari cæptum, & melius demonstrabitur infra, vbi contraria soluentur argumenta. Constat deinde commenta-tionem suam non subsistere. Primò ex natura rei: Si enim hoc ideo cir-cularis motus admittendus est, quia arteriæ sanguinem ad membra de-ferant, venæ autem recipiant, & quod membris superest, ad Cor repor-tent; manifestum est, simul esse non posse, vt illæ operentur magis, hæc autem minus, vel è contra; cum vnum ab altèro dependeat indissolubi-liter: Quia non possunt arteriæ plus deferre, quin, & a venis plus reci-piant; nec venæ plus reducere, quin plus excipiant; vltra quod paucis in istibus motus, vel ex superfluitate attracti; vel ex defectu transmissi cessaret. Secundò ex suis positionibus: quia si calor Cordis magis tra-hit à venis, magis quoque mouebit, impelletq; in arterias, cum à calore efficacia, spiritus agitante, motus fibrarum proueniat per Ipsum; Si cal-oris debilitas minus impellit, minus quoque attrahet, suè dilatationis medio, suè aliter attrahere calorem, ponamus. Idem dic de grauitatis, leuitatisq; ab eo posita cooperatione: nam si grauitas minus iuuat arteriarum

arteriarum ad inferiora motum, minus etiam venarum ad superiora, cum à proportionē vnus sequatur, & alterius motus (ex suis positionibus) viuacitas. Sic si leuitas iuuat ascensum, & descensum quoque validiori percussione iuuabit. Satiùs ergo, vt diximus, fuit, Naturam nulli alligatam motui esse, vt posset occasionibus datis occurrere, vel accedere ad libitum, non intermissa interim ex adhærente, & imbibito succo nutritionis actione.

Insuper: Cum sanguis per sentientes corporis partes fertur, pruritus calorem, inquietudinem, parit: Ergo signum, non solere ipsum ea continè tenere vestigia alioqui ab assuetis non sit passio. Probatur antecedens, quod in dictam causam referuntur aestuationes, agitationes, pruritus, ac similia cutis accidentia. Huic autem obiectioni respondebit Conringius, hoc ideo non per carnes ipsas, sed per anastomoses, talem translationem ab arterijs in venas fieri, à se positum esse: Cui tamen positioni nec sua desunt inconuenientia, vt in quartæ obiectionis vindicatione dicebatur. Aliquis autem pro Harueio reponeret, sanguinem, si naturalis sit, ea non pariturum symptomata; vbi autem talia persentuntur, sanguinem aliquo vitio laborare: Verùm talis responsio inualida: quia, etiam naturali sanguine existente, talia aliquando eueniunt à copia, vini potu, animi commotione, labore, ac similibus, quæ sanguinem solum commouent, non vitiant. Ergo si talia saltem motionem indicant, signum, ni præter naturam commoueatur, vel copia exuperet, tale ab ipso non teneri iter.

Item tùm venæ, tùm arteriæ, ex Anatomicorum, & præcipuè Vesallij doctrina, totæ ex fibrarum triplici genere intertextæ sunt, scilicet rectis, transversis, & obliquis, quarum vltimæ præsertim retentioni inferuiunt, sic ipso tradente Auctore, & alijs, potissimum *Gal. 3. de natur. facul. 11.*, & *5. de vsu part. cap. 11.* Essent autem frustra, si in continuo motu sanguis esse deberet, vt in circulatione ab Auctoribus nunc figurata fieret: Sed Natura nil frustra. Ergo &c.

Contra hanc tamen obiectionem illud est, quod ex Faloppio assert Guernerus Rolincius dissertat *anatom. lib. 5. cap. 13.* (prout, & Conringius *cap. 41.* confirmat); nimirum venarum fibras pro mero earum munimine, minimè autem pro sanguinis adiuuando motu inferuire; Quorum ratio est, duplicem ex Auerroe *lib. 7. Phys. com. 10.* esse traditionem (sicq; & pulsionem, & retentionem), vnâ propriè dictam, & vniuocè, per quam quid ad se, vel ad aliud trahitur, & in qua velocior est motus mouentis, quàm moti; aliam verò analogicè, seu æquiuoce, per quam quid sic disponitur ab alio, vt, illo immoto, hoc ad se moueatur, sicuti de magnete ad ferrum, de ambra ad paleam dicitur: neutro autem istorum modorum inferuire videntur fibræ illæ. Non primo; quia dictæ venarum fibræ nec mouentur, vt videmus illas æsophagi actualiter deglutiendo, sicut, & intestinorum egerendo moueri; nec possunt reapse moueri, cum adeo inter se contextæ sint obliquæ, rectæ,

&amp;c.

Obiectio decimaquarta.

Conringii excusatio.  
Non valet.

Alia responsio.

Inualida monstratur.

Obiectio decimaquinta.

Neotericeorum contrasectio.

De verber-  
culis de celo  
getundis  
de primo.

& transuersæ, vt nullæ illarum moueri possint, quin simul aliæ mouean-  
tur. Tùm etiam, vti ex carnes, potius in potentia sunt, quàm actû.  
Non secundo; quia sic nõ minus dicentur trahere obliquæ, quàm rectæ,  
non magis hæ, quàm cæteræ partes omnes, ad quas alimentum pertin-  
gat. Verum enimverò huiusmodi responzionem faciliè retundere pos-  
sumus, dicendo primò, non de futurum fuisse Naturæ modum tunicam  
illam, sine tot fibrarum intertextibus, muniendi, vt in membranis mul-  
tis obseruatur, nisi ex voto ei fuisset, ijs ad aliquid vti. His autem soli-  
tam esse pro motibus vti, omnes Anatomici tùm in musculis, tùm in  
vasis per multis, ad excretionem dicatis, vt sunt intestina, vesica, vterus  
&c. liberè admittunt: quæ autem similia sunt, similes edere actiones,  
par est. Nec valet, eas carneas, siuè musculosas non esse: nam & huius-  
modi eæ sunt, licet crassiores, (vt ait *Gal 3. natur. facul. 11.*) quæ in  
intestinatorum tunicis, vtero, vesica, alijsq; in partibus obseruantur;  
quemadmodum nec obest, quod actualiter eas moueri, non conspiciatur:  
quia venæ vasa parua sunt plerunque latentia, vt ideo lentè, & obscure  
moueri in tractionibus, & pulsionibus possint, absque quod per nos illud  
obseruari ad sensum valeat; nec tertio quod se mutuò sint impedituræ;  
quia Natura mirabilis, & sine Doctore agit ea, quæ ne sensui quidem,  
sed nec intellectui constant, prout circa motum in Corde vndiq; fibroso,  
motibusq; continenter contrarijs obnoxio videmus: scit enim illa ad  
otium aliquas appellere fibras, cum alias ad opus excitat, has incitare,  
illas fræno cohibere, pro sui cogniti finis adeptione.

Arando;

Dico vltcrius, vt vt à venis pro nutritione propria æquipoce succus  
aliquis trahatur, non deesse tamen illis vniuocam tùm tractionem, tùm  
pulsionem, quæ omninò ijs pro publico obeundo mutere necessariæ  
sunt: si enim venæ canales sunt sanguinis, benè arbitrandum, Naturam  
eis potentiam indidisse illam, quæ delationis, & retentionis suæ officio  
contingit: si verò potentiam, cur non instrumenta? Et cur ad pom-  
pam ea putantur data, quæ, oculis minimè conspicua, latent sensus,  
solosq; solertes non effugiunt Artifices? Aliter quid different à non vi-  
uentibus animata, ab artificialibus naturalia?

Terio;

Additur tertio, non minus obstituram hanc tractionis, pulsionisue  
venalis carentiam ijs, qui perennem in sanguine motum pro circu-  
latione præscribunt, quàm nobis qui temporaneum, & omni-  
genum. His verò concessis, concedenda necessariò est, & reten-  
tio, quæ obliquis adscribitur fibris; cum cæteris operantibus,  
nec operatio sit deneganda his, quas non frustra Na-  
tura addidit: siquidem non esse ad pellendum com-  
paratas, quod non transuersim, sed per lon-  
gum constringere sint potis, vltro cuili-  
bet persuaderi potest.

## CAPVT SEXTVM.

*Adduntur alia obiectiones ad dictam circulationem elidendam, & additæ  
responsiones refelluntur.*

**N**EC hic obiectionum finis: aliæ enim non ignobiliores super-  
sunt, ex quibus sequens vna est: Vnaquæque pars viuens, si vi-  
uere debet, alitione indiget, quæ consistit in assimilatione, agglutina-  
tioneq; assimilatae substantiæ ad alitam partem. Hæ fieri non possunt,  
nisi competenti tempore, mutuaque actione, ac passione aliti, & ali-  
menti, quod præcipuè sanguis est. Ergo non in continuo motu sanguis  
esse debet, sed in quiete aliquando manere, ne alendi corporis actionem  
subterfugiat. Nec valet dicere, in transitu partes in se ipsas trahere,  
quod placet: quia si per ipsas partes sit sanguinis transitus, vt Harucio,  
cum partialium nonnullis placuit, hoc dici non potest: quorsum enim  
vniò, si ambulat vniendum? Si verò vnitur, quomodo motus? quod si  
transitus fiat per vasorum coniunctiones, magis multò difficile erit, &  
à naturæ ipsius sagacitate abhorrens, à moto, fluenteq; succo sibi con-  
sonam selligere portionem, quàm à quiescente.

Obiectio de  
cima sexta.

Videntur Gal.  
lib. 9. natu  
facul. 1.

Hinc ideo Conringius *cit. lib. de sang. gener. , & motu cap. 38.* quam-  
uis per arterias alimentum in partes delabi statuatur, non tamen imme-  
diatè ab ipsis, sed à venularum extremitatibus, aliquantisper quiescen-  
tibus, subministrari, opinatus est: Huius tamen enunciationis incon-  
stantia infra in responsionis ad vitiam obiectionem factæ, pondera-  
tione detegitur, hoc solum pro nunc tacto, sic necessarium fore, arteria-  
rum fines omnes in venulas inferi, ac finiri, quod à nullo Anatomico-  
rum dictum, aut dicendum arbitramur; cum non minus arteriæ, quàm  
venæ in cutem obliterentur suisq; hiatus intro spirent aerem.

Conringi  
diffugium.

Dissoluitur.

Præterea: Plures partes manifestè repugnant, redarguuntq; dictam  
circulationem sanguinis: Ergo nec fit. Et probatur antecedens; quod  
ideo fit circuitus (sic elicit Harucius) : quia sanguis ad partes peruenit  
copiosior, quàm pro alitione absumant, qui idcirco in venas reassumi-  
tur, vt iter iteret versus cor. In plurimis autem non posse fieri vi-  
detur: quia quod ipsis superabundat, vel in suis cavitatibus conseruant,  
vel educunt, vel in quandam sibi congenitam substantiam transmutant,  
vel crebris suis motibus, ac laboribus absumunt; Sic mammæ (vt supra  
in obiectione decima secunda dictum fuit) in lactantibus, & gravidis,  
quod superfluit, in lac transmutant, in cauernulis suis detinent, & per  
papillas excernunt; Testes ex affluente sanguine semen gignunt, in tu-  
bulis suis reponunt, & ad tempus eiaculant; Adenes, quod ex nutri-  
tione superest, in suis venulis, & cavitatibus album conseruant, & cum  
debillimi sint, non illud repellunt, sed vel sudoris modo dissolunt, vel  
etiam supurati disrumpuntur, inanijuntur. Sic yterus, quod sibi super-

Obiectio de-  
cima septima



fluum est, excernit toties, quoties opus est, itaut nonnullis menstrua bis quolibet mense fiant; nonnullis per plures menses, & annos continuè aliquid euacuetur; sanis autem omnibus semel in mense per plures dies sanguis emittatur; Hæmorrhoides, ac anus, si aliquid superfluit sanguinis, statis periodis educunt, vt multis vtrique per intervalla cernitur; Os, quicquid superabundant, in salivam mutat, & expuit; Cerebrum per multiplicēs canales se exonerat, nervos itrorat, & in spiritus plurimos se diffundit; Caput autem totum non rarò salubriter per nares suam sanguinis plenitudinem deponit. Sic intestina, mesenterium, renesque superflua in adipem conuertunt, seq; circumscipiunt; Ossa in medullam nutriendi superabundantiam mutant, ac servant. Sic partes, quæ in motu continuo sunt, tum spiritus, tum sanguinem conterunt, & absument; vnde pulmo, & pectus, sicuti in perpetuo versantur motu, continuo quoque egent refocillamento; Cor, arteriæque similiter sanguinem aterunt, & spiritus dissolunt; Brachia, cruraque extra somnum, vt plurimum moventur, & sic omne alimentum digerunt. Cutis tota porosa est, & omnia sibi superflua, vel sensibiliter, vel insensibiliter eijcit, vel in pilos vertit. Venæ tandem sanguinis propriè continentia sunt, nisi quæ nimis turgeant, vel vellicentur, à se illum non pellunt. In paucissimis igitur partibus hæc fieret circulatio, & ideo melius dicendum, non fieri.

Quid à contrariis respondetur.

Idem responso respondetur.

Sed verò quibusdam, cum nullum aliud subterfugium subsit, non incongruum videtur, posse in quibusdam partibus proprio ipsarum instinctu sanguinem firmari, & concoqui, sicuti, & in alijs præter naturam retineri, generali circuitu prosequente: Sed si talis valeat admissio, si benè examinetur res, ad paucissimas circulus reduceretur partes, quod esset incongruum. Alij cum maius rationis pondus in lacte, & semina agnoscant, non solum negant, ex sanguine ea fieri, sed & in venis alterius generis, nempe lacteis asseruari eadem, volunt. Verum hoc supra refutatum est &c.

Obiectio de vena venali.

Vltèrius: incompetens illa videtur via, quæ ab Haruicio, & cæteris circumcincti sanguini designatur: Nam neque arterialis vena arteriæ venali, neque Aorta sua capacitate respondet Causæ osculo triplo latiori, quàm osculum suum sit, vt docet *Vesal. lib. 6. de corp. hum. fabr. cap. 12.* hæc verò arteriali venæ æquetur, vt ait Conringius. Et tamen res potius è contra esse deberet; nimirum capaciores esse vellent, quæ à Corde recipiunt, quàm quæ in ipsum immittunt, si verum est, sanguinem in Corde rare fieri, & spirituosum veluti eleuari, dilatarique vt Neotericorum multi tradunt. Arterialis item vena, quæ à pulmonis motu nunc dilatatur, nuuc perstringitur, non videtur Cordis ictibus paritura, si in huius pulsione ab incumbente restricto pulmone arctetur; nec in venalem arteriam impulsura, si pulsu caret, & constrictione non nisi per accidens in pulmonis compressione, ideo longe rariori, dotatur. Venalis item arteria, quæ aeri inspirato potissimum excipiendo à  
Natura

Natura dicata est (quamuis nec sanguine priuetur), neque potest tanto circuitui incumbere: si enim per suas inconspicuas porositates sanguinem continenter excipit, quomodo aerem? si hunc, quomodo illum? Sufficiat ei id, quod pro sui alimonia, integritateq; requiritur, posse trahere, non ultra. Ventriculus Cordis sinister, & ipse dextro angustior, vt consentiant omnes, speciatim *Nesal. cit. lib. cap. 11.* qui tamen ferè omnium voto calidior, spirituumq; fucina, sanguinis parum continet, rarefacit, & in spiritus conuertit. Ideo Conringius *cap. 34. iam cit.*, veritati inferuiens, fatetur non omnem sanguinem, qui in dia stole Cordis ventriculos ingreditur, in systole proijci: namque id fieri non posse, arguit (inquit) capacitas orificij venæ arteriosæ, & Aortæ longè minor orificio arteriæ venosæ, atque venæ Cauæ. Sed quæ absurda inde sequuntur! Si enim introitum non æquat exitus, & id in singulo accidit istu, quid de reliquo introgresso fiet? totum à Corde absumi, inconsonum est. Sed si nunc magis, nunc minus ingreditur, quid est, quod istuum numeretur, & amplificetur quantitas?

Contingit exceptio.

Reijciunt.

Obstant vltimò plura absurda, quæ, data tali circulatione sanguinis, necessariò in sequuntur. Quorum primum est, Cor omnigeni sanguinis, & excrementitij succi receptaculum facere, itaut, vbi animæ sedes præcipua, vitæ thesaurus, origo spirituum reposita fuit, angiportus, expurgatoriumq; omnium fermè sordium constituatur. Cui frustra obueniunt Neoterici, dicendo, sicut lux, ignisq; non coinquinantur à fæcibus, ita nec animam, nec spiritus inquinandos impuro sanguine: nam longè distat mortale, & vndique alterabile corpus ab incorruptibili anima, & inuincibili Sole; momentaneus calor, à lucidissimo igne: sicuti enim quodlibet, vel leuissimum vulnus, veneficus odor, phlegmonis principium Cordi mortem minantur; leuissimisque animi motibus, vel putrium vaporum ab utero, ventriculo, & intestinis eleuatione, spiritus languent; quid ab inquinatorum omnium contactu, ingressu, congressuq; expectandum fuerat? fateor, animam, quæ incorporea est, ab his minime fædandam; sed benè dixerim, vel illam fore fugandam, vel illius fædandos esse mores ob iniquationem spirituum.

Obiectio de cimanona.

Primum et circulatione absurdum.

Huic frustra obuiant Neoterici.

Secundum est, arterias, quas vètrices omnium vitalium spirituum, purissimi sanguinis receptacula, natiui caloris moderatrices, vicæq; in totum corpus delatrices Natura præfecerat, & quas ideo ferè vbique reconditas voluit, vt ab iniurijs melius custodirentur; inquinamentorum omnium ductulos, vrinæ canales, sudorum semitas, fæculentorum succorum viacula ad vterum, renes, lienem &c. statuere. Huic occurrit Conringius *cit. lib. cap. 38.* dicens, quod, quemadmodum alius aliquis calor optimè fouetur oleo, aut sebo, etiamsi eorum nonnullæ portiones in fuliginem abeant satis crassam; ita nec calor vitalis inficitur, aut corrumpitur; vtut quædam cum sanguine sint commista minus pura, & quasi fæculenta: Sed hic considera, Lector, nùm flamma lucida adeo, sed fusa, & purgata, a sebo, vt à cera, ab illa impura, vt à pitida, ab oleo

Secundum absurdum.

Huic Conring. occurr.

amurcato, vt à perfectò, à ligno viridi, vt à sicco eleuetur. Flammulae scilicet vita nostra rectissime assimilatur, cui si nitidum subieceris pabulum, lucida, & ipsa vii escet; si verò excrementosum, fumida vndique, & infecta flammescens, spiritus verè fuliginosos, infectos, fumolos emittet. Calor quidem fouebitur, sed non temperatus, & humanarum, nitidarumq; actionum parens: verùm vel præternaturalis, vel ferinus: siquidem à nullo alio distinguuntur. humani à ferinis moribus, & natura (prætermissa formali causa, anima nempe, cuius actus specificam differentiam progignit) quàm à qualitate natiui caloris; cuius pabulum sanguis, cuius exhalatio spiritus est, immediata animæ tum rationalis, tum sensitivæ ad omnia exercenda munia dicata instrumenta.

Spigelij dictum arguitur.

Nec est, vt apud eundem Conringium rideat Spigelius eos, qui verentur, ne spiritus vitalis ab excrementijs humoribus contaminetur: quia potius ridendus ipse est, si putat eosdem spiritus à puro, ac ab impuro sanguine generandos. Si incorporei spiritus essent, ab ipso aliqua ratio vigeret: sed cum corporei, quidni iuxta materiæ qualitatem puri, vel impuri fiant ad exempla fuliginum supradicta? Consideretur, quam animi tristitiam, vel etiam quandoque lypothimiam pariant à solis aluinis retentis sæcibus, vel transeuntibus diarrhæis eleuatis vapores, & quid ab ijs, qui per arterias, & venas sic transirent ad Cor, sit expectandum, eliciatur.

Tertium absurdum.

Tertium est, venarum bipartiri naturam, vt scilicet alia sit in truncis, alia in ramulis: Qui enim omnem nutritionis materiam per arterias partibus offerri, tenent quoque asserere, non immediatè ab illis mobilibus, & inquietis nutriti, sed à capillaribus venis, in quas quiescentes sanguinem alentem arteriæ deponant. Rursus, & qui sanguinis effluxus omnes, & excrementorum eiectiones arterijs demandant, fateri coguntur, non immediatè per eas, sed per venarum ora fieri, vt, omnibus perpenfis, statuit idem Conringius *at. cap. 38.* Cuius sententia his verbis describitur. Quamuis verò per arterias affluere omnem nutrimentitium sanguinem, asseramus, non tamen probabile videtur, ex arterijs proximè carnes, aliasquè partes nutriti; Nimirum quiete quadam opus est ad vltimam partium nutritionem: qualis tamen in arterijs fortè nullibi conceditur. Affluit quidem ergo per arterias sanguis omnis: at in venis minoribus, in quas ex arterijs transit, potissimum quiescit, atque exinde partibus in nutrimentum proximè suggeritur. ] Et in fine capitis sic: Obseruandum est, etiam affluxus excrementitiorum humorum omnis per arterias fit, non tamen etiam effluxum per eas contingere. Imò verisimile est, eos, qui secundum naturam sunt, effluxus, apertis venarum officijs, fieri, eo quod solæ venæ videantur ad extrema partium hiare: (hoc tamen, perperam dicitur), arteriarum sinibus per anastomoses cum venis coniunctis ] Cuius absurdi vim, & efficaciam agnoscant, quæso, circulationis fautores: Si enim per eos sanguis omnis ad maiores

venas

venas à minoribus peruenit, qua lege perueniet, si in his potissimum quiescit? Et quid est, quod alia natura in his, alia in illis sit? eadem corpora, simul continuata, diuersas habere functiones, mihi inuerisimile est, nec tale quidpiam siue in arterijs, siue in venis, a quoquam fuit vnquam, aut vsquam agnitum. Sed si hoc sit (quod inaius est), qui fiet circulatio sanguinis prætenfa? vnde à partibus attrahetur, si non per venas? Sed & si arteriæ ad extrema non deueniant, in venasque terminentur, quid ad Moebium, qui, vt nunc nunc dicitur, opinatur, depurationem sanguinis partim fieri per arteriarum extremitates in os, ventricululum, intestina, & cutem vniuersam inhiantes? Sed de hoc plura cap. 9. dicentur.

Quantum est, negare (instar Asclepiadis à *Gal. cit. lib. 1. de nat. facul.* Quantum ab  
surdum. 13.) vel confundere expiationem sanguinis ab excrementitijs succis: quandoquidem in corde, & propè ipsum nullum esse vas expurgatorium, nemo non habens admittit; totum sanguinem remeare ad hepar, per arterias, quid impossibile est, siue ab impulsu sanguinis dilatentur arteriæ, siue ex se sanguinem vehere habeant; cum per totum corpus dispergantur, & vnica ad hepar veniat; totum item ad renes peruenire, & ad lienem, inuerisimile est; cum Aorta à Corde exiens bipartiat, & æqua lance in omnes corporis partes ramos expandat, trunco suo per corporis truncum æqualiter diducto. Nec est, vt conetur Conringius suadere, sanguinem serosum renes petere, biliosum hepar, atrum lienem, hæmorrhoides: hæc enim partitio incompatibilis est cum illo impetuoso sanguinis à Corde in arterias traiectu à se laudato: Si verò quis recurreret ad attractionem harum partium, nimis longinqua earum regio à Corde est, nec possent illæ ad superiorem Aortæ caudicem pertingere tractione. Quare Gotofredus Moebius *Epitome Institutionum Medic. cap. 12.* statuit, sanguinem depurari in pancreate, quibusdam per vterum, aut hæmorrhoides, omnibus verò per os, nares, aures, & per arteriarum extremitates, siue in fauces, siue in ventricululum, siue in intestina, siue ad cutem terminentur. In his autem aduertat dexterrimus Auctor summam, quæ nihilominus in sanguine imperfectio remanet: nam si per eum chylus per pancreas in receptaculum Pecquetianum, siue in glandulas lumbares se colligit, vt per thoracicum tubulum ad Cor sanguificandus perueniat (sic tradit cap. 11.) leuissimam à pancreate purificationem chylo aduenturam, cogitandum est tum ob moræ minimum; nam raptim chylum transire, supponunt, vt viæ angustia celeritate pensetur; tum ob parvis naturam glandosam, quæ ad excrementa potius excipiendâ, quam ex piandâ idonea est; tum ob eius exiguitatem tanto negotio imparem; tum ob præuentionis importunitatem, cum in corde per eum sanguificatio celebretur. Cæteræ autem depurationes omnes inopportuna sunt, & vt vulgo dicitur, post pastum veniunt; nimirum post partium nutritionem, post arteriarum transitum. Adde, & peculiare esse illarum partium, quæ nominantur, expurgationes, nunc cruce

Conringij  
seu de tolli-  
turi.

Moebij au-  
puratio im-  
perfecta.

criticè ad totum expurgandum illas natura instituat, vt in menstruis, hæmorrhagijs, diarrhæis, & similibus, quæ à nostro casu quotidianæ depurationis longè absunt. In summa per eos vnique parti competit excrementorum omnium expiatio, nullo generalis operationis requisitæ respectu; quasi verò, sicuti dantur communes alimentorum officinæ, non eadem lance debeant impuratum, quæ per generalem coctionem emanant, secretoria assignari loca.

*Quintum ab-  
surdum.*

Quintum est, nesciri sic, quomodo febres lypiriæ, & Epialiæ gignantur, & possint consistere: Si enim in earum vna vruntur interna, quod ex linguæ nigritie, vrinæ ardore siti intensa, & corporis nudatione dignoscitur; quomodo si adest pulsus, per quem transmittuntur (vt aiunt) torrefacti humores ad cutem, exteriora frigeant? Si autem in altera externa calidissima sunt, intus autem refrigeratio sentitur, cur, si venæ ad cor calefactos humores reuehant, non calefiunt interiora quoque? Vel ergo non impellitur in priori à corde calefactus sanguis ad extrema, vel non reuehant venæ frigida ad intus, sicuti in secunda aut non impellitur frigidus succus ad exteriora, aut non calidus ad interiora retrahitur. Quicquid enim de statu præternaturali excogitetur, non poterit excusares, quin, si in sanis, non detur etiam in ægris vitalibus, & quibus idem, vel imò frequentior pulsus est, circulatio, cum qua neutrum eorum posset subsistere.

*Sextum ab-  
surdum.*

Sextum est, nullos in corde, & arterijs moraturos sic esse spiritus, sed actu tum genitos in partes diffundi: quorum tamen tanta vis est, vt, ijs dissipatis, cessat vita, solvatur anima, corpus intereat: Et prior patet consequentia: quia si impulsu cordis sanguis velociter excurrit ad extrema vsque, qua fouea spiritus, qui fugacissimus est, latitabit, quin totus rapidissimè excurrat? Scio igitur non ob aliud in dubium vocari spirituum existentiam ab Harueio; in quo tamen à suis sequacibus derelinquitur; cum omnibus inficiari displiceat, ad vitam spiritus requiri, & in homine plurimos morari, sola ratione, licet non sensu ob illorum tenuitatem, igneamquè raritatem cognitos; quorum existentiam, si non ab alio, ex hoc certam tenere possumus; quod in nil aliud repetinam ex animi affectu mortem, syncopem, vel lypothimiam referre possumus, quam in spirituum dissipationem, vel suffocationem, à subita expansione, vel restrictione seu concentratione pronatas; vt ideo non rarè solis vaporosis halitibus reparentur: cita enim deperditio, citaq; reparatio substantiam prius volatilem, non crassam, non hærentem arguit.

*Quam con-  
sultationem  
Veterum,  
cum Meo-  
sica inecu-  
latione ex-  
cogitauerit  
Gaspar Bra-  
uo.*

Plura autem ex his absurdus videtur e medio tollere Gaspar Brauo Excellentissimus in suo *Resolut. Medic. Volumine, lib. seu disputat. 5. resolut. 11.* Hic enim celeberrimus Auctor, circulationi consentiens, à Veterum verò lucidiori doctrina minimè abhorrens, studuit rem quoquo modo componere, admittendo, fieri quidem Harueianam circulationem, negando verò, sanguinem per arterias moueri mero Cordis impulsu, vt Harueiuscum Coringio, & alijs statuit, sed verius à facultati-

bus attrahente pellenteq. gradus vegetatiui; Id quod viriliter probat primò ex Galeni, Veterumq; vniformi doctrina; Secundò ex natura nutritiæ facultatis, quæ suas necessariò ministratrices postulat. Tertio ex proprietate viuientis corporis trahendi vtile, pellendi inuile. Quarto ex clusione cæterarum, quæ ab Haruicio, & sequacibus designantur causæ: Nam contra Haruicij impulsione plurima concludentia opponit; contra Conringij cumulas causas caloris, vacui, leuitatis, grauitatisuè non minora, nec minus seria; itaut superuacuum sit eis quicquam addere, vel minuere. Et sic non videntur currere multa ex di&is absurdis: quia si partium tractioni, ac pulsioni motus sanguinis impu-  
tatur, trahet vnaquæque, quæ suæ naturæ conferent; pellentur, quæ displicent, nec dissipabuntur spiritus; cum ex alia Illius *resolut.* 12. spiritus à Corde pellantur, & ad Cor redeant per vim systolis, ac diastolis iuxta occasiones co&ionum, somni, animi accidentium &c.

Sed bona Illius pace, non est, vt, ijs seclusis causis, speret Vir Excellentissimus Circulationem manutenere: Vt vt enim sit de causis motus sanguinis in genere, (de quibus secum prorsus sentio); pro circulando ipso, attrahitrix, & expultrix potentia vegetatiui gradus omnium viuientium partium minimè satis erunt: quia vti potentiæ naturales, ordinatissimæ sunt, nihilq; superflui admittunt, nisi vt necessitatis tempore, vel ad vsum aliquem communem loco, ac tempore inferuiat: Sed in hoc circulationis negotio nil horum concurrat. Non respectus ad necessitatibus tempora: quia supponitur, non in partibus ipsis trahentibus asseruari superfluum, sed continuè migrare, ac remigrare, accedere, & recedere. Non ad vsum communem: quia pro hoc sanguis ipse, & illius presentia facit, non illius motus. Si autem quis dixerit, esse ad vsum communem ex parte Cordis, dicitur, dari etiam in his determinatam quantitatem, & eam, quæ necessitati communi sit satis. Sumit ventriculus sanus superfluum sui ratione, sed necessarium tantum ad totius alitionem, & in ea quantitate, quæ reficiendo toti sufficiat. Sic & secur attrahit, & sanguificat non indefinenter, sed quoad corporis indigentia, & dissolutioni instaurandæ sit satis. Sic ergo de corde dicendum: attrahet enim, quod opus, non ad superfluitatem: Vel namque sibi trahit, pellitque, vel toti. Si sibi, patet, non magis, quàm opus, attrahendum, pulsandum, & sic non continenter; Si toti, vel quod eius sentiat egestatem ob omnium partium sustum, vel naturali ductu non errante afficitur. Si primum, partes plenæ non fugent. Si secundum sufficiet quantitas siuè ad alendum, siuè ad viuificandum necessaria, non nauseabunda saturitas.

Eadem de pulsione viuientis corporis meo iudicio ferenda sententia est, eam scilicet non frustra, nec superflue in sanis ad actum duci; quo sensu accepta, ad circulationem non sufficit. Sed de hoc abundè disceptatum, & assertum est supra cap. 4.

Neque valent rationes à perspicacissimo Viro adductæ (quæ alias

Reprimis  
talis con-  
cluzio.

Attractio, &  
pulsio vege-  
tatiui gradus  
pro circula-  
tione non  
sufficiunt.

Soluantur a-  
ludendum  
pro



pro nutritione statuenda optimè valent) : quia iam prima pro nobis est ; cum omnium Veterum sententiæ de causis motus sanguinis agunt , prout ad nutriendum dirigitur , nullibi autem pro circulatione , vel alio indefinente motu statuendo . Secunda item , cum non minus nutritiæ facultatis sinistra sit retentio , sicuti , & coctio , quàm tractio , pulsio : illæ verò quietem important , non motum , vnde à circuli causis hæ ablegandæ , & per consequens illæ . Tertia adhuc magis pro nobis est ; cum attrahatur utile non vt subito pellatur , sed vt propriæ inferuiat alitioni ; pellitur autem inutile , non vt alteri oneri , vel inutili aduenienti , seu quærendo pars se subiiciat , sed vt ab omni se subleuet . Alioqui quid referet traxisse , si abijciatur statim , pepulisse , si aliud subito trahatur ? Quarta quoq ; similiter : quia seclusis omnibus alijs causis , hæ et amissæ rationibus secludendæ sunt . Ablata enim nutritionis causa , nil est , quod ad attrahendum partes viuentes naturaliter excitet ; dempta inutilis grauitate , vel noxijs molestia , nil est , quod ad pellendum easdem inuitet .

Equidem , cum sic viriliter viderim , Virum hunc peritissimum insectari ibidem Harueij , & Conringij præcipua fundamenta , nimirum motus causas , non potui non opinari , Illum pro circulatione sic , & in quantum sentire , quasi diceret , si detur circulatio , nullam aliam causam , præter attractionem , & pulsionem , nutritionis famulas , iuridicam esse ; id quod , & ipse libenter fateor , nisi quod eam minimè dari contendendo . Similem autem coniecturam , præter dicta , adauget illiusmet loquendi modus multoties conditionatus . Nimirum eodem *lib. resolut.*

*Idemdem.*  
Auctoris conditionata locutio.

„ 8. hæc habet : Resoluendum primò , quod totus sanguis fertur ad Cor  
„ propter circulationem , & ob utilitates , quas in illa consequitur . Sic  
„ omnibus in confesso esse debet , qui sanguinis circulationem admittunt .  
„ Quæ verba quis non videt conditionata esse ? ac si diceret non  
„ teneri admittere . *Resolut. 9.* sic loquitur : Resoluendum primò , quod  
„ sanguis , qui perficitur in sinu sinistro cordis , & spiritus , qui generantur  
„ in illo , simul trudentur in Aortem : Sic admittentes spirituum  
„ vitalium generationem , simulq ; sanguinis circulationem , debent  
„ fateri . ] *Resolut. 10.* sic : Resoluendum , quod omnis sanguis repertus  
„ in venis communicatur illis per arterias , & per anastomoses transcolatur .  
„ Sic tenendum , admissa sanguinis circulatione . ] In his verbis  
„ quis non facile agnoscit conditionem quandam , quæ adesse possit , &  
„ abesse ? Non tamen negem illam ab ipso clarissimè admitti : Cuius  
„ tamen rationes , si quæ intactæ remanent , vndecimò , & decimosexto  
„ tanguntur capitibus .

*Septimum absurdum .*

Nunc verò horum Gasparis verborum occasione nacta , nolo septimum prætermittre absurdum , in quod circulationem acceptantes incidunt ; fateri scilicet , omnem sanguinem in venis repertum ab arterijs venire . In id autem nescio , quomodo tanti Viri sic oscitanter incidant , & hi maximè , qui sanguinem in iecore generari , lata sustinent fronte ,

fronte, vt facit dictus Brauo *Resol. Medic. par. 1. disput. 5. sect. 1. resolut. 6.*, ac alibi, sicuti, & *Comring. cit. lib. cap. 10.*, & *Rolfinc. differ. anatom. lib. 6.*, & 7. alios multos referens, inter quos non pauci ipsismet lecoris venis sanguificationem attribuunt: Si enim vera hæc sunt, prout, & in primi libri principio visum, probatumq; est, & à lecoris venulis in Cauam, à Caua in Cor, ab hoc in arterias transluit vel totus, vt ipsi volunt, vel pars tantum, vt Galenici sustinent; quis, etiam cæcus, non conspicit, a fontibus in riuos, non à riuus in fontes, motus, ac originis principium assumendum? Dato enim (non autem concessio) ab arterijs in venas totum sanguinem remeare, si rectum adhibeatur iudicium, non hæc mutatio, sed redditio, non concessio, sed retributio erit. Cui veritati lucem addit modus quo sanguis in Embryum ingreditur, qui est per vmbilicalem venam in lecur, Cauam, & Cor: quamuis nec in hoc desint, qui non sanguinem, sed chylum ad Embrium peruenire autumant, de quo inusitato dogmate tertio differetur Libro.

Scio equidem, nec deesse supradictis verbales euadendi loculos: dis-  
cunt enim, in hepate chylum aliquam tantummodò ruditatem sangui-  
nis acquirere, pe. sectionem autem ei totam à Corde obuenire, & idcirco  
optimè currere sanguinem (hoc est perfectam) ab arterijs in venas  
deportari: Sed hæc mera figmenta sunt, & à veritate ipsa aliena, quæ  
docet, & oculis ostendit, sanguinem optimum in lecore generari, talem-  
quæ ab eo in Cauam tum ascendentem, tum descendentem propagari,  
& ab his tum Cordi per latum osculum, tum arterijs omnibus per ana-  
stomoses, tum & vniuersis corporis particulis per innumeros earum ra-  
mulus, & capillares horum extremitates participari, ab ijsq; mutuo re-  
tribui, prout sæpius dictum, & dicetur non semel. Vt iam interim verè  
liqueat, in Arte nostra.

*Retrogrado passu dogmata cuncta labi.*

## CAPVT SEPTIMVM.

*Probatur vltèriùs, non dari sanguinis circulationem.*

**O**bstant igitur supradicta omnia, & alia nonnulla, quò minus tam  
famigeratam circulationem admittendam esse putem; quæ quam-  
uis singulariter omnia non demonstrant, nec per se singula irrevocabili-  
ter concludant: multa tamen seiunctim, eòq; magis simul iuncta om-  
nia, adeo certam apud me demonstrationem pariunt, vt nefas existimem  
ab antiquissima Medicorum, Philosophorumq; omnium opinione fal-  
laces ob quasdam experientias, facile conuincendas, recedere: Nam,  
vt aiunt Iuristæ Quæ singula non probant, simul vnita, perfectam pro-  
bationem inducunt *Gratian. discept. foren. 138. num. 19.* Verùm nec alia  
adhuc deest ad dictam circulationem explodendam demonstratiua ra-  
tio. Et est huiusmodi.

Pro silen-  
sione exple-  
dendo argu-  
mentum.

Si naturaliter daretur sanguinis circulatio supposita, aliquo vel sensus, vel rationis argumento in sano corpore ostenderetur: Sed nullo aut sensus, aut rationis argumento in tali ostenditur. Ergo nec datur naturaliter. Patet maior: quicquid enim in natura est, vel iudicio, vel sensu conijcitur, alias fantastica, vel supernaturalia habentur, quæ à nobis comprehendere minimè possunt. Solum ansa aliqua dubitandi circa minorem videbitur adesse, ut quæ negationem continet, probatu impossibilem, nisi loco, & tempore sit restricta, ut Iuristæ loquuntur. Ast hic, dum loco, nempe venis, & tempore, (quod quodlibet sensui manifestum continet interstitium, motum à perennitate seiungens) optimè restringitur, facillimè eius veritatem demonstrare licet.

Contrariè  
experimenta  
de integro  
animali, vel  
de motus pe-  
rennitate nil  
concludunt.

Suppono igitur primò, omnia experimenta tum Harueij, tum sequacium, vel nil de integro, ac sano animali, vel nil de motus perennitate, aut actu spontaneo concludere. Non primùm; quia multa, quæ ab ipsis proferuntur experimenta, per viam anatomem eliciunt; & sic in scisso, & agonizante animali, quod quantum à sano, & integro distet, cuiuslibet notum. Non secundum; quia quæcunque alia per ligaturas, incisiones, pressiones, tandemque per vim corpori illatam eliciunt, nil aliud, quam præsentaneum ostendunt motum, illumque violentum; qui à naturali dupliciter distat, vel ratione oppositi, nimirum, quæ sursum naturaliter tendunt, deorsum per vim commouentur, & è contra; vel ratione temporis, scilicet motus naturalis ordinatus, commodus, violentus inordinatus, præceps: is ad metam peruentus, quiescit; hic vel quiete caret, vel violenta potitur, vel à naturali motu refrangitur.

Et præsentaneum quidem; quia ablata ligatura, & incisione occlusa, motus cessat, exitus retinetur, tumor residet, coincidentia refurgit; Violentum verò, quia partes à naturali statu semouentur, & dolore, calore, seiunctione, compressione, diuulsione, tensione afficiuntur. Cætera autem, quæ in iudicijs, & coniecturis eliciunt, vel fallacia sunt, vel æquè contra retorquetur.

Ex iudicio.  
rum obsecra-  
tio negatur  
circulatio.

Ijs itaque omnibus seclusis, prout infra per nostras responsiones secluduntur, restat, ut quæ alia dictum circularem, ac perpetuum motum possent quoquo modo ostendere, indicia, abesse, ostendamus, ut sic inconcussa maneat propositio, quod nullo sensus, vel rationis argumento ostenditur circulatio.

Non adest  
venarum mo-  
tus.

Et primò non adest venarum actualis motus; & tamen in Philosophia certum est, nullum mouens naturale mouere immotum, ut ex *Arist.* 3. *Phys. tex.* 8., & 16. Illum verò non adeste, & ocularis inspectio, & tactus in venis exterioribus denotat, & ipsimet Harueijani fatentur. Neque hic obijciant, partes alimentum trahere, & tamen non moueri sensibilibiter: quia alius est motus alicui, alius fibrarum; alius alimenti, alius circulatoris sanguinis: is enim insensibilis est ob exiguitatem, & contiguitatem, & ratione sola comprehensibilis: hic verò sensibilis; quia velox, & per caua corpora, ut in excretionibus, deglutationibus, digestionibus, crustatio-

eruſationibus, fluxionibus, arteriacis motitationibus, peſtoris dilatan-  
te, comprimenteq; motu, & videmus, & ſentimus. Is forſan æquiuoca  
tractio eſt ad fruitionem, & vnionem, quæ immoto attrahente, cele-  
bratur, vt in magnete reſpectu ferri; hic autem potius veſtio diceretur  
ad ſolum tranſitum, quæ nunquam, vehente immoto, accidit.

Nec ſanguinis ipſius motus continuus in præſatis venis cognoscitur  
ſenſu exteriori: etenim, ſiue intentè aſpiciantur, ſiue attentè tangantur  
venæ, quæ nonnunquam in ſumma manu, aut pede gracilibus turgidæ,  
ſubliuidæ, & in candidis ſerè lucidæ ſunt adeo, vt in ijs contenti ſucci  
perreptatio, ſi fieret, nullo modo lateret; ne quicquam tamen intus mo-  
ueri aut viſu, aut palpatu dignoscitur. Non interiori ſenſu, cum homo  
ſanus nil de huiſmodi motu continuo in ſe ipſo perſentiat, & tamen can-  
tarrhos deſcendentes, fluxionesquæ alias ad partes determinatas non  
rarò percipiat. Non ratione tandem in ſano integroq; corpore: nam  
ſi aliqua dictarum venarum ſummæ manus, vel pedis ſiue vngue, ſiue  
alia ſubtiliſſe comprimitur ſic, vt claudatur cavitās, nihil tamen ver-  
ſus digitos turget, nec verſus lacertos inanitur; quorum quidem  
vtrunquæ fieri deberet, ſi ſuppoſitus fieret continuus ſanguinis mo-  
tus. Sed & ligetur totus carpus lato funiculo, ac ſi ſalua tellam tundere  
vellemus, videbimusquæ, aliquantiſper quidem ſtatim ex ligaturæ ex-  
preſſione verſus ſines ſuos venas in ſumma manu turgere, nil magis  
progreſſu inſtandas; ſupra verò ligaturam nil imminui eaſdem, ſicq; ſi  
altera deindè in gibbero ligatura fiat, eaſ itidem ſtatim turgidiores  
inter duas ligaturas euadere, ſiquæ ſeriantur, ſanguinem proijcere.  
Quod verbum ſtatim elidit ſimulatam tranſuſionem per arteriarum  
anaſtomofes in venas; Et quo experimento clarè cognoscitur, eis liga-  
turam venas non inaniri, vt vellent circulatorij motus amantes.

Non rubor perpetuus in toto corporis ambitu conſpicitur, qui ſan-  
guinis præſentiam comitari poſſet, ac deberet (: color enim ſimilis  
eſſoreſcit humoribus, niſi retroceſſerint, ait Hipp. primo de humor. 1.)  
cum multi candidi, alij triticei, alij plumbei, alij nigri (vt Aethiopes)  
naturaliter videantur, ruborq; in pluribus ſolum genas, labia, papillas  
&c. comiteretur. Poſſe autem, vel debere ad rubicundum cutem ver-  
gere, ſi talis fieret ad extrema per arterias iugis affluxus, cui libet con-  
ſtat, qui ſciat, in externis partibus innumeras arteriarum, venarumq;  
ſines inferi, & omnigenè inſinuari; & præcipuè ſi, vt opinatur Harueius,  
ſanguis non per anaſtomofes, ſed per carnis, & partium poros ab arte-  
rijs tranſfunderetur in venas: Videmus ſiquidem, ex affluxu ſanguinis  
ad cutem rubigines, phlegmonofa criſipelata, & rubicundos ignes  
enafci, qui per dies etiam integros perdurant, etiamſi pulſus adſit, &  
vehementior; quod ſignum eſt, aſſuſum ſanguinem vel non remigrare  
ad interiora, vel continuè nouum eſſuere: ſic ergo etiam fieret, ſi in na-  
turali ſtatu talis ſanguinis perpetuus fieret acceſſus.

Non quareò copioſus calor in tota corporis circumſerentia ſimilis,

Non ſanguis  
perreptatio.

Non corpus  
rubor.

Non conti-  
nuus, & e-  
qualis calor  
in toto.

Non corpo-  
ris motus co-  
tinuus.

Antiqua ve-  
ritas circa  
aliquis mo-  
tum.

Altera ad  
idem ratio  
à totius Or-  
bis propo-  
sitione delum-  
pta.

Tertia ratio  
à Naturæ or-  
dine in om-  
nibus serua-  
to.

ac vniiformis perſentitur; qui tamen deberet iugem eiufdem ſpirituofſi ſanguinis acceſſum, contactum, ac tranſitum comitari; cum dantur cor-  
pora, quæ ſana cum ſint, frigidiuſcula foris ſentuntur, ſicuti & plurimis  
volæ manuum, ac pedum calidiores alijs multis partibus obſervantur.  
Sic & in ſomno totum corpus frigidiuſ extat, vnde largiori indiget ope-  
ramento; quod provenit, quia in eo natiuus calor cum ſanguine intrò, &  
ad ima ſe recipit, vt docet *Ariſt. 2. de parti. ani. 7.* & ideò etiam pallidiuſ  
obſervatur. Non tandem continuæ agitationes, aut corporis perpetuus  
adeſt motus, qui videretur poſſe continuum ſanguinis, ac ſpiruum cir-  
culum ſequi, vt qui, præcipua ſunt omnium actionum, ac motuum in-  
ſtrumenta; quia ſaltem in ſomno animal omne quieſcit, & ab omnibus  
motibus otiatur perſæpè liberaliter.

Cum ergo indicia hæc omnia, quæ in ſano, integroq; corpore poſſent  
quoquo modo perennem ſanguinis motum à centro ad peripheriam, à  
peripheria ad centrum, arguere, abſint; iure concludere poſſumus, dictâ  
ſanguinis circulationem non dari; ſed imò per venas ſanguinem quietè  
deferri ad Cor, & ad ſingula membra, vt ex eo commodè alantur, vtquè  
ab ijs arteriæ ſimul cum Corde ſubtiliorem attrahere ſanguinem per  
anastoſes vbique intercedentes, & per cauæ oſculum reſpectivè poſ-  
ſint, ex quo non ſolùm alantur ipſa, ſed & per continuam pulſationem,  
reſpirationemq; ſpiritus tum vitales, tum animales perficiantur, qui ad  
vniuerſas particulas cum ſubtiliori ſanguine delati, foueant, & irrorent;  
moueant, & viuificent; roborent, & ad omnes actiones adiuuent.  
Hæcque certior veritas eſt, à primis vſque ad nouiſſima ſæcula dima-  
nata, auctoritatibus fulgidiſſimis roborata, rationibus ſuffulata, & expe-  
rimentis confirmata.

Et ſic omnis, quam homo cum toto Orbe congruentiam, vt micro-  
cosmos, habet, requirere, ac præſcribere quoque videtur: Sicuti enim in  
illo, pro totius machinæ complemento, non ſolùm decurrentes hinc  
inde fontes, riuſ, & flumina ſufficiant, ſed Oceanus etiam, & Maria, &  
Lacus, à quibus dicta mutuari, & ab irrigatione ſuperfluas retribuere  
aquaſ, credimus, ac videmus, requiruntur, & adſunt; ità & in humano  
corpore non ſolùm moti antes, & quoquò deferentes arteriæ, tamquàm  
labentes riuſ, & flumina ſubſunt; ſed & Caua, Porta, earumq; venoſa  
ſuboles, quæ veluti Maria, & Lacus, cruorem ijs vbique ſubminiſtrant,  
reciprocum recipiunt, quietumq; in ſe continent, niſi quatenus vel irri-  
tantur à tempeſtatibus, vel ab ijs attrahunt partes, & flumina reddunt.  
Sicuti ergo vanum eſſet aſſerere, vniuerſas Oceani, & Marium aquas in  
flumina, ac fontes per vnicum ductum abire, & in eadem circulariter ab  
his redire; ita meo iudicio vanum eſt, putare, vniuerſum venarum ſan-  
guinem per Cor in arterias fluere, ab hiſq; ad venas periodicè remeare.

Sic etiam rerum ordo, qui tam arctè in omnibus ſuis operibus à Natu-  
ra affectatur, vt ſine eo nil concinnum, nil durable, nil decorum fiat,  
ſeruabitur; qui alioqui, data ſimili circulatione, confunderetur: Nam  
ſic,

## CAPVT SEPTIMVM. 141

sic, Cor solum illum attrahet, ac in arterias reponet, corpori distribuendum halituosum sanguinem, qui à vigilijs, animi moribus, laboribus, & ambiente consumitur; Cordi verò à iecore (iecoriq; à ventriculo) suggeretur id, quod illi ad vsum prædictum opus est; quemadmodum & per venas toti corpori, quicquid de ipsismet viuentibus partibus lapsum, dissolutumque ab enuciatis causis fuit; Sicuti ex altera, toto sanguine in Cor abeunte, & ab eo in totum corpus processionaliter moto, nec ipsi cordi ad suas functiones aditus, nec partibus coquendi, assimilandi, & quiescendi locus, nec sanguini, ac spiritibus vicissitudinaria, omnibus alternandis rebus attributa, ac necessaria quies; nec appetentiæ modus, terminus daretur; sed è contra in cunctis superfluitas, nausæatio, instabilitas esset.

Quod si Harueij fautores sic circulum introductum interpretarentur, vt scilicet Cor, ac arteriæ sanguinem per Cauæ foramen, & per multas anastomoses partim recipiant, partim reddant, ita tamen, vt ne credant, totum venosum sanguinem sic circulariter moueri; iam & ego cum ipsis sum, & vniuersa Medicorum schola ab ipsis erit: Verum, quoniam sanguinem non à venis in membra (siue ab ijs commodissime moueatur, siue per eas ab his, ac à visceribus alendis trahatur) deriuari, vt docent Veteres; sed ab extremis, externisq; venulis ad earum truncos, ab his ad Cor, ab hoc in arterias, ab arterijs in membra, & à membris iterum in venas perpetuo circulo moueri, prædicunt, & continent: Ideo ab illis omnimodè dissentire cogor, & omnis Medicorum, saltè seniorum, chorus dissentiet.

Ne autem gratis loqui, sanguinisq; ad partes venosum iter, sola Veterum auctoritate ductus, nulla ratione, aut euentia fultus, & ad aerem, vt dici solet, collaudare videar; iam tempestiuum erit, re, quæ nunc nudis verbis prolata sunt, comprobare, incepto à venarum quicquid, naturaliq; itinere ad Cor ipsum, & ad omnes tum superiores, tum inferiores partes; inde vero ad arteriarum ipsarum delationem omnigenam, & vitalem deueniendo, prout sequentibus tribus capitibus videbitur.

## CAPVT OCTAVVM.

*Sanguinem non ad Cor solum, sed & ad membra omnia naturaliter migrare per venas, probatur, ex phlebotomia.*

**Q**uoniam verò iam per Harueianos omnes non solum conceditur, sanguinem per venam Cauam naturaliter ad Cor conscendere, sed imò simul contenditur (quamuis iniuste), per eam à singulis partibus illum continuè ad illud remeare totum; non est, vt in eo probando frustra tempus conteratur: Quare solummodò ad contrarium probandum non minus consuetum sanguinis per eundem ad membra iter me conferam.

Quousq;  
qualis circula-  
tio admitten-  
denda.



Et quod sanguis à maioribus venis ad minores, & ab his ad minimas naturaliter permeet, ac moueatur, multa, quæ tùm in venæ sectionibus; tùm in spontinis excretionibus; tùm pro corporis alitione obseruantur, & vrgent; suadere, imò certò comprobare videntur.

Prima ratio  
in venæ se-  
ctione à ce-  
leri iuuamē-  
to sumpta.

Nam, si secetur vena, quæ parti superiori, seu versus ipsius radices infirmæ communicet, multoties in ipso fluxionis, seu exitus actu, aliquando parùm post, clara sentitur subleuatio: Ergo supponendum, per venas superiores, venæ sectæ, & læsæ parti communes, fieri versus ipsam sectionem sanguinis illam partem affligentis fluxum, & extractionem. Pro cuius rationis clara explicatione, suppono affici phlegmone guttur, vel oculum, vel mandibulam dextram, & pro ijs curandis secari cephalicam eiusdem lateris; vel pleuram inflammari, & scindi basilicam è directo; vel laborare coxam, & aperiri saphenam lateralem. Tunc, & in his casibus ægrotantes sæpè in ipso fluentis sanguinis actu sensibilibiter partem subleuari, doloremquæ sedari, sentiunt; nonnunquàm paulò post. Si ergo tunc sanguis veniret vel à manu, vel à pede extremo per arteriarum anastomoses, vt sibi suadent circulationis partem tenentes, quomodo illa pars determinata, sine aliarum iactura iuuaretur? & quomodo sic citò? Non primum; quia, vt ipsi pònunt, arteriæ non habent vim à parte retrahendi, sed ad ipsam tantùm deferendi, quod à Corde suscipiunt; & sic manifestum, ipsas à Corde attracturas, hoc à Caua, hanc verò ab alijs venis, suis germinibus, sine partis delectu; præcipuè Sistetur Conringio, qui nullam aliam admittit viam sanguini à venis ad arterias, quàm per Cor, nullibiq; consentienti, à venarum anastomosis aliquid ipsis communicari: quod tamen, quàm sit à veritate longinquum, quilibet, qui consideret, anastomoses sine valvulis esse, & sic per ipsas mutuam patere viam, tam ab arterijs ad venas, quàm ab his ad illas, facile fatebitur. Non secundum; quia atequàm per tot gyros illa pars affecta leuetur, non potest nisi aliquid temporis consumi. Quare necessarii concludendum est, in tali phlebotomia per venas laterales, earumq; continuationes, & connexiones mutuas, non per arteriarum anastomoses fieri pro maiori parte dictam euacuationem. Indicio sit illud quoque, quod, si secetur vena oppositi brachij, vel alia non communicans, non nisi post longum à sectione tempus iuuat, teste Gal. de cur. rat. per sang. miss. cap. 16. praxiq; idem attestante.

Altera à mu-  
tatione san-  
guinis.

Idem si scindatur vena prope partem affectam, non solum per sentitur supradictum velox iuuamentum, sed & sanguinis color immutatur, & consistentia, itaut pro rubro fluus, vel ater, pro crasso tenuis, vel è contra exeat, id quod, in altera parte celebrata phlebotomia, non accidit. Ob id Hippocr. in pleuritide curanda dictæ mutationis expectationem, vena secta collaudat lib. 2. de rat. vict. acut. tex. 10. Quemadmodum, & Gal. lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 14., nisi aut virium obftet infirmitas, aut plegmones malignitas: interdum enim (ait ipse) nihil ab ea emittitur, sed inibi fortiter sanguis constrictus est.

Et hoc quidem ergo indicat, per venas sectioni superiores, læsq; membro per multiplicem venarum, lateralium viiionem communiore sanguinem ab ipso venire; cum arteriæ manus non ab oculo, gutture, vel pleura, nec arteriæ pedis à coxa, sed à Corde ipso, impellente (sic ait Harueius) sanguinem recipiant, & ad membra depellant.

Item ligetur brachium aliquantum strictè; ita tamen, vt arteria in suo pulsu non impediatur, feriatuq; iuxta iuxta styllum vena; tunc videbimus sanguinem, subito profilientem, paulò post lentè, ac guttatim exire laxetur aliquantum ligatura, & videbimus, statim velociter recillire, vt quotidie à me, & ab omnibus obseruatur. Signum ergo, sanguinem à superiori vena, quæ per ligamen impediabatur, non autem ab inferiori per arteriarum suppetias suppeditari. Nec valet dicere, ex laxatione arteriam à compressione liberari, vt inde liberius sanguinem impellat, vt excipit Conringius *cis. lib. cap. 29.* tum quia ipsa antea non occludebatur ob eius duritiem, & profunditatem, vt ex libero eius pulsu dignoscebatur, quicquid de vena esset molliori, ac exteriori. Et in hoc non Primirofius, vt ibi Conringius ait, sed ipsemet fallitur, qui potuit centies experiri, citra pulsus interceptionem, brachium strictiusculè vinculatum, vel parùm, vel lentè sanguinem, vena secta, emittere; Tum quia sic citò post mediocrem laxationem augetur fluxio, vt non sit possibile, antea sanguinem infra ad manum deuenisse, in venas transisse, & ad vulnus ascendisse.

Tertia à ligaturæ modo.

Conringii exceptio soluitur.

Item facta solita ligatura in brachio non valde stricta, sed moderata, fiat infra venam secandam alia ligatura strictior, itaut tollatur in carpo pulsus, inde feriatu, & videbimus, sanguinem latè exire; stringatur superior, & sistetur sanguis statim: Ergo non à manu, sed à superioribus sanguis venit. Neque dicendum, sanguinem tunc venire ab arterijs intra duas ligaturas per suas anastomoses sanguinem in venam pelentibus, vt Primirofio simile quid Harueio obijcienti responderet ibidem Conringius, & Vallæus: quia nō cernuntur adeo frequentes, & latè inter hæc vasa anastomoses, vt in quatuor digitorum spatio possit sic copiose ab vno ad aliud sanguis transfundi; alioqui quomodo sufficeret arteriarum sanguis pro tot exituris, & pro extremis? Adde, quod anastomoses non possunt esse, nisi inter arterias, ac venas coniuges: humerariæ autem venæ nulla ita comes arteria, vt ex Vesallio, & Rolincio *lib. 5. differtat. anatom. cap. 2. ad finem constat*, quinimò nec vlli ex eius ramis prætereum, qui interius in cubiti articulum tendit, *Gal. de diff. & ven. & art. 9.* Ergo, hac secta inter duas ligaturas, non per anastomoses poterit venire sanguis: igitur à trunco venæ superioris, cum inferiori via sit per inferiorem ligaturam intercepta. Dato autem, quod inser basilicam, & comitem arteriam in dicto spatio vna sit anastomosis, quid hæc, quæ visum, exigua, fugit ad sanguinis profilientis quantitatem?

Alia exceptio ex ligaturis.

Responsio Conringij soluitur.

Item ligetur cubitus, vt moris est, itaut intumescat vena, ex arteq; feriatu,

Alia & ligatura capetula.

feriatur, ac tunc ligetur infra vulnus brachium, vt a manu non possit ascendere inde laxatur ligatura superior, aut auferatur omnino, & nihilominus sanguis exibat, etsi nō adeo impetuose, vt cum ligatura; quia vt hic infra dicemus, ligatura vim fluxui addit versus extrema, ac germina, non è contra: Non est tamen, quin sic clarum appareat, sanguinem à superioribus venis, etsi tunc lentè, exire; quod nobis sufficit.

Quarta ratio ab exitus quantitate & velocitate

Sed & quod non ab arterijs, sed à venis, sanguis ille in venæ. Sectio, ne exiens transmittatur, fluxus quantitas, & velocitas suadent: quomodo enim imaginari possumus, tam citum, & tantam sanguinis transfusionem per arteriolarum vnus manus, vel pedis anastomoses, vel per carnis porulos, ad venam sectam fieri, vt, pulsu non mutato, ad libras breui hora possit extrahi? ne quidem si caro esset veluti cribrum, & anastomoses permultæ; præcipuè cum sanguinem in arterias venire, ipso cordis impulsu, astruant: si enim sic est, quomodo, si non augetur pulsus, nec in brachio, nec in Corde, poterit tanta sanguinis copia tam citò ad brachij arterias exprimi? manifestum quippe, impulsionem Cordis æquè in omnes fieri regiones, si modò pulsus æqualis in toto remanet corpore, & is aliud non est (secundum eorum sententiam) quam sanguinis impulsio.

Conringij responsio refutatur.

Respondet Conringius, eam esse amplitudinem, & quantitatem anastomoseon, vt facili negotio, & breui temporis spatio possit sanguinis ingens copia ab arterijs effundi in venas: Sed hæc sententia nemini ferè, nec Harueio ipsi, vel sensui accepta est; cum coniunctiones illæ osculorum adeo exiles sint, vt sensum omnino lateant, sola; ratione disponantur; Et ideo vbic eas admisit Galenus, supposit, per eas subtilioris tantum sanguinis, & halituosi portionem potius in arterias dilatationis introire, constrictione verò in venas repelli.

Alia Gasparis responsio adiecit.

Addit Gaspar Brauo *Resolut. Medic. par. 5. disput. 1. resol. 10.* quamuis inconspicui sint ij meatus, & experientiam conuincere, per venam sectam posse totum sanguinem, qui in arterijs est, permeare; & in telis linteis videmus, nullo apparente meatu, liquorem facillè percolari. Sed prior ratio nil conuincit de phlebotomia ordinaria, per quam sanguis in moderata quantitate, & celeriter mittitur: per eam enim, credendum est, sanguinem prius, qui est in venis, educi, & tandem, si in maxima quantitate extrahatur, etiam ab arterijs inaniri, non per anastomoses solas, quæ in extremitatibus venæ sectæ communicant, sed cæteras omnes, quæ venoso generi in corpore vniuerso conueniunt; sicuti, & secta arteria, etiam venæ omnes possunt euacuari. Exemplum verò telæ adhuc minus urgere videtur: quia verum est, per eam transcolari citò, sed non per vnum aut duo oscula in tubulum determinatum contiguum, aut insinuatum, sed per totam telæ vniuersitatem; ideo non quadrat casus nostrus, in quo prætenditur, in venarum tubulos non per totam arteriarum substantiam, sed per oscula paucissima exprimi? Hoc enim certissimum est, non omnes vnus manus, vel pedis anastomoses arte-

riacas venæ sectæ communicari, sed has his, illas illis venis, quæ sibi coniunguntur, annectuntur, & non cæteris. Quæ autem rationes illum suadent ad tenendum, sanguinem in vnas per anastomoses remeare, omnes ex suppositis, quæ falsa ostenduntur, deductæ sunt, nec, ut dixi, ab eo ibi pro phlebotomia adductæ, sed pro circulatione in genere.

His alia iungatur ratio à qualitate sanguinis exeuntis tum simpliciter, tum iuxta scissionis latitudinem: Etenim, si ab arterijs veniret, planum est, ipsum exiturum subtilem, & subtiliter semper, siue lata, siue stricta in vena fiat scissio; idque pluribus ex causis; videlicet quia, & talis in arterijs ut plurimum reperitur, cum ad eas per septum cordis, per arterialisq; venæ, at aliarum anastomoses veluti resudare cogatur; & quia in venam sectam iterum non nisi per cævas porositates, vel paritium, vel arteriarum ipsarum percolaretur; & quia arteriæ ipsæ tum magnitudine, tum cavitatis venis longè minores sunt. Sed contrarium experimur: nam si latum foramen fiat, crassus, & quantitate, & substantia exit adeo, ac lentus, ut nonnunquam, & citissime peluim impleat, & scissus durus valde euadat; quæ quantitas, & qualitas arterioso sanguini minimè omnino quadrant.

Tandem, si à finibus arteriarum in venas reponentibus sanguis veniret, velocius, & copiosius, vel saltè non minus velociter, & copiosè exiret, scissis venis manuum, ac pedum, quàm cubiti, vel cruris, ut quæ dictis arteriarum finibus sunt proximiores; non repugnante illarum exiguitate, cum nihilominus tantæ sint, & semper maiores, quàm arteriæ: Contrarium tamen experimur; quia plerunque, nisi balneum addatur, quamvis ligatura addit, sanguis per eas sectas venas non exit: Dissendum ergo, in phlebotomia sanguinem à venis interioribus, & maioribus præcipuè venire, & exire, non negato, interim ab arteriarum quoq; anastomosis aliquid effundi, & fluxui addi.

Sed quis forsan in medium afferet salientem motus exeuntis sanguinis concitationem, quæ arteriarum propria videtur: Verùm hanc a sola ligatura fieri, constat; cum ea ablata, hæc cesset, & apposta illa, hæc iteretur: quo enim posito, aliquid ponitur, & quo ablato, aufertur, illud causam esse, apud omnes in confesso est. Quam quoque concitationem ab arteriæ pulsus non venire, arguit æqualitas motus, quæ ab arteriæ motu aliena est, ut cui saltus, & subsidentia mutuo, & alternatim insunt.

Ligaturæ autem quatuor de causis impetum faciunt in venas versus extremam primò ob dolorem cum expressione allatum, per quem pars, ut viuens, expellere cum impetu conatur, & ut pressa, versus foramen emittit; & hoc in inferiori parte, seu versus extrema fit, quia illuc, nec ultra succus mitti potest ob venarum fines iam turgidos effectos: non autem in parte superiori, quia succus à cavitatibus multis potest acceptari, quæ maiores sese offerunt semper vsque ad Cavam. Cuius rei exemplum in aliquo exteriori tubulo membranco faciliè habemus: in eo enim, succo nec ad saturitatem pleno, si ligatura versus oclusum

Quinta ratio à qualitate exeuntis.

Sexta ratio à modo exeuntis.

Concitatō exitus à ligatura accedit.

Versus extremam concitatio fit à ligatura quatuor de causis.

caput fiat, vbi osculum in aliquo latere impictum sit, videmus succum eiaculari; si verò supra, vbi cauitas, vel longa sit, vel aperta, nulla eiaculatio fit, sed simplex exitus. Secundò ob co-dis, & corporis totius sympathicam compassionem, per quam partes superiores in surgunt, & ad eas, quæ affliguntur, partes, quæquæ ab ijs dependent, sanguinem, & spiritus transmittunt. Tertiò quia per moderatam adstrictionem constringuntur fibræ venarum eo ferè modo, quo in naturali earum pulsione tenduntur: pulsio autem fibrarum ad exteriora, vt plurimum fit, & cum impetu, vt in vrinæ mictu. Quartò cum pars ligata exprimitur, versus venarum fines, vnà cum venis ipsis intumescit; vnde os vulneris detinetur hians, & sic pars sanguinis aliam pellit, vt in vini exitu à pleno dolio: supra autem non intumescunt venæ, nisi pars doleat multum, vel alia superior ligatura addatur; quia longa nimis per totum corpus remanet venarum cauitas implenda; & ideo facillè cedit; nec hiat vulnus, sed concidit. His igitur omnibus de causis à ligaturis vis fluxus additur à truncis ad germina, à maioribus ad minora, à superioribus ad inferiora, non è contra. Sed nec semper dictus adest fluendi impetus: quia, si vena parua sit, vt in summa manu, alijsq; exilibus venis, sine saltu fluit, & aquæ tepidæ fotu, vel vaporazione, vel igne opus est, vt fluat.

Etiam eiaculari  
santes san-  
guinis motu  
à maioribus  
venis ad mi-  
nores conce-  
ditur.

Tanta verò est vis veritatis, vt nonnulli circulationi fauentes in eam currerint, asserentes, sanguinem quidem in venæ incisione posse à venis maioribus in minores ire, sicuti, & per arterias posse sanguinem à partibus læsis retrahi: sed hæc per vim, & præter naturam, ob sectionem, dolorem, aliamuè violentam causam fieri, contendunt. Hi verò non animaduertunt, cum naturas impugnant experientias, proprias magis lædere, vt contra quas optimè similis exceptio laborat, vt vrget. Sit pax nobiscum, vel æqua saltèm lorica induamur, lanceaq; pugnemus. Sint hæc violenta, erunt, & sua: Linquntur hæc ergo, & merè naturalia, spontanea; pro argumento sumantur.

## CAPVT NONVM.

*Sanguinem à maioribus venis ad minores, minimas, & extra naturaliter ire, à spontaneis excretionibus, & à partium alitionis natura arguitur.*

Sanguinis ex-  
cretionis in  
menstruis,  
hæmorrhoidi-  
bus &c. per  
venas sunt.

Non per ar-  
terias fieri,  
probat.

**S**imilis à venis maioribus, ad minores, & ad extrà migratio etiam in spontanis sanguinis excretionibus observatur egregiè: Nam menstrua per oscula venarum vteri, eiusq; cervicis hiantia naturaliter, & singulis exire mulieribus, Medicorum cætus promulgavit. Alijs salubriter per natium venas, alijs per os, & ab alijs partibus exire sanguinem, quotidiana docet experientia. Nec dici potest, quod per arterias: quia nec saltus multoties conspicitur, qui arteriarum excretionibus proprius esse videtur; nec tantus impetus, quin facillè, & ex seipsis, sæpius occludantur:

occludantur: arteriæ autem semper impetum faciunt, difficile clauduntur, nec ex seipsis; Et ideo dixit *Arist. 3. de part. anim. 5.* Interdum ex ore profluuium sanguinis sit sine dolore, non per vim, & ex arteria. ] Et vbi de his, quæ oculis non sic patent, dubitari contingat, nil saltem de alijs, quæ exterius quibusdam naturaliter conspiciuntur, nimirum per exteriores hæmorrhoides, per gingiuas, per crurum venas &c.: in his enim clarè, exitum à vena fieri, conspicitur. Similiter in vulneribus, vlceribusq; crurum, brachiorumquè videmus, sanguinem à superiori venæ cefæ parte magis, quàm ab inferiori, vel saltem non minus egredi.

Quæ veritas per vim quandam Conringio expuncta fuit, dum hæc cap. 38. dixit: Quamuis verò affluxio omnis per arterias fiat, in hæmorrhagijs, alijsq; humorum excretionibus: quin tamen præter naturam retrogredi quidquam ex venis nonnunquam possit, vbi valvulæ nullæ obstant, nihil dubitandum videtur. Verum, & illud perpauillum sit, oportet ob valvulas passim impediētes. ] Vocat hic retrogredi, quod venis congregi est, & præter naturam, quod naturalissimum, ne sibi inconstans appareat: quamuis quid præter nature leges fiat in erumpentibus menstruis, nulli adhuc innotuerit. His verò proximæ in quibusdam Viris excernentes hæmorrhoides sunt, & hæc sequuntur, quæ criticè per nares sanguinis sunt, plerumque salubres eruptiones.

Cum autem quæ clara sunt, obscurare difficile sit, statuit tandem, & ipse, hæc sanguinis effluxiones per venas fieri; sed affluxionem omnem tam sanguinis, quam aliorum humorum, per arterias venire. con- tendit, nimirum per anastomoses in venas ingredientes. Imò (subdit) verisimile est, eos, qui secundum naturam sunt, effluxus, apertis venarum orificijs, fieri, eo quod solæ venæ videantur ad extrema partium hiare, arteriarum sinibus per anastomoses cum venis coniunctis. ] Meræ nugæ; cum ex Anatomicorum cæterorum confessione non minus, quàm ex Galeno ipso, ut dictum est, ipsæ quoq; arteriæ suos habeant in extremis insinuatios fines: Pro qua tamen sua assertionem firmandam, da cap. 39. tres anastomosis modos medicatus, Primum, quando vnus extremitas coit, cum alterius quasi medio ventre; alterum, cum duarum venarum extrema coalescunt; & tertium vbi duo vasa, sibi mutuo incumbencia sui in medio vno communi patent foramine; Venarum, arteriarumq; anastomoses prioris, & posterioris modi, pleraq; esse, secundi autem ordinis per raras, rotundè pronunciat. Quorum aliam non addit rationem, quam quod superius docuerit (ut audisti) per venarum extrema orificia, & alimentitium sanguinem, & recrementa eiusdem excerni. Quis verò Demosthenes, quis Pericles cordato Viro suadeat, liquorem, ab alicuius tubi extremitate exeuntem, non ab illo tubo, sed ab alterius proximi tubi porositatibus provenire? Aliquam quidem ab ijs portionem vnà exire, vero consensum est; sed vel totam, vel plurimam, absque prioribus: Si enim arteriarum ora,

Idem sensu Conringius, sed ab arterijs fluxum venarum cõsentiens.

Tria anastomosen generat ex Conringio.



Acuti venarum, in cutem finiuntur, inanis illarum conatus fuerit in venas, dum per seipsas potest exitus perfici: si verò in venas, quomodo per eas ali corpus, benè statuitur Sed, utcumq; sit, vel hoc vnum certum est, eo in casu venas versus sua extrema, non intra se retrahere sanguinem, vt per nos contenditur.

*Sanguinem pro alitione maioribus venis ad minora peruenire probatur exemplo plantarum.*

*Exemplum fluuiorū pro alitione absonum.*

Alitionem quoque partium (pulmonibus exceptis) per venas communiter deportari, non autem per atterias, probatur ex modo nutritio- nis ad exemplum plantarum homini competente. In ijs enim videmus, humorem alimentitium à trunco ad ramos, à ramis ad germina, ab his ad frondes, non e contra manare. Sic ergo, & in homine statuendum est, à Cauæ trunco ad ramos suos, ab his ad venulas, à venulis in membra naturaliter sanguinem meare non e contra. Nec valet exemplum per quosdam deductum à fluuijs, qui videntur à riuis multis, & hi à fontibus procreari: quia in primis incogrua est comparatio rerum inanimatarum ad animatas; cumq; magis rerum, quæ in solo fluxu, sed decursu omnem finem habent, vt fluuij, ad eas, quæ non in fluxu, sed in alitione, fruitione, & vita finem suum sortiuntur, vt in hortulo aquæ distributio, in corpore sanguinis ductuum: Quare melius multò adaptatur plantarum exemplum, in quibus per radices minimas in maiores, inde in truncum, & ab hoc in quoslibet ramos, ac ramulos fertur alimentum.

Quod si aliquam propterea proportionem etiam adesse velis interfluuios, & sanguinis ductus, difficile non est iconem etiam in his similem inuenire: cum vndiq; à minimis Portæ germinibus in ipsius Caudicem, in Cauamq; tamquam in Oceanum, à quo iterum fontes ad riuos, & fluuios (per Cordis scilicet mediū, & per anastomoses multas in arterias, quoquò excurrentes) enascuntur, prout supra cap. 7. à nobis adnotatum est: tunc verò non alitionem, per quam pattes nutriantur, sed solam vitalem irrationem exprimes.

*Altera ad idem ratio à modo, quo fertur alimentum, scilicet attractione, & probatur quadrupliciter.*

Addio, alitionem partium, & totius corporis non impulsu fieri, sed attractu, contra quam sentiant Harueiani, & super venas, ex quibus facilimè trahitur, vt dicitur inferius, non ab arterijs, quarum propria magis videtur impulsio. Illud autem probatur quadrupliciter.

I.

Primò ex communi nutrientis facultatis natura, quæ certo certius dignoscitur in plantis: nam hæ, cum mera, ac simplici altrice facultate sine prædiæ, non alio modo, quàm attractione, cibum à terra capiunt, concoquunt, augentur, ac viuunt: (quæ enim in terra vis fingi potest, quæ humorem ad proceræ arboris cacumina per ligneas inuisibiles cauernulas impellat?) manifestum autem, vt docent Philosophi, eiusdem naturæ, imò perfectiorem facultatem in homine, quàm in plantis reperiri; sic habetur ex *Arist. lib. 2. de gen. ani. cap. 4.*

II.

Probatur secundò: Nam cum alitio sit quædam fructio cum voluptate, vel actio ab his non seiuncta, non à contrario, sed à simili sit: trahitur autem, quod simile est, propellitur, quod est aduersum: est enim tractio

tractio quædam sympathiæ, & similitudinis, pulsio antipathiæ, & dissimilitudinis argutio.

Probatûr tertio; quod variæ sunt partes alendæ, & diuersi temperamenti, & idcirco diuerso quoque quoq; egent alimento. At per impulsione non potest diuersificari, & separari materia iuxta diuersam recipiunt egestatem, ac naturam, sed potius iuxta amandantium auersionem. Ergo alitio melius attractione fiet, quam pulsione: sic enim probabile est, vnamquæque partem trahere, quod sibi magis placet, ac simile est; sicuti, & hoc facilius fieri à quietis venis, quæ molles quoq; sunt, & raræ, quam ab arterijs, vtpotè quæ densæ, ac crassæ, paucû, omnino sanguinem, eundem, vaporosum, vicinis partibus trahere permittunt. J quæ sunt formalia verba *Gal. lib. 6. de vsu part. cap. 10.*

Probatûr quartò: quia si impulsione deduceretur alimentum, solum illæ partium portiunculæ alerentur, in quas oscula, vel fines vasorum deferentium inferuntur, sicq; vel tota porosa vasa esse deberent, vel non omnes afferentur partes, cum non vbique sint ipsorum vasorum termini. Sed porosæ vbique esse venas, vel arterias, nec constat, nec licet. Ergo alitionem non impulsione, sed attractione fieri, dicendum: Sic namque partes à partibus, vasa à vasis, & contigua à contiguis tum per oscula, tum per tunicas ipsas, & per continuitatem attrahunt, & nutriuntur.

Hoc sic stante, alitionem ab arterijs communiter non deferri ad membra, sed quandam solam vaporosam vitalem irrorationem, quæ ipsa suffulsa omne nutritionis mabus, & actionis obeunt, indicant multa, ac probant. Ipsarum arteriarum structura crassior, ac durior, ex duplici, & multoties triplici, multoq; seû sextuplò crassiori membrana, quam venarum, constans, vt tradunt Galenus, Vesalius, cæteri; Anatomici omnes; & idèò neruacæ naturæ eas esse, non semel Aristoteles fassus est; Quod factum fuit, vt spiritibus continendis sufficerent, sic docente *Gal. 6. de vsu part. 10.* quicquid ex eo deducat Harueius in contrarium: Quare difficillimè ab ipsis attrahi, ac transcolari, seû exugi sanguis potest: Somnium namque est, & præter omnium mentem putatur, quod narrat Harueius de arterioliis, quas structura omninò venis similes esse, ait: cum eadem sit illarum, cum venulis proportio, quam cum venis maioribus maiores arteriæ seruant tum in crassitie, tum in capacitate. Quomodo ergo partes, quæ truncis arteriarum contiguae sunt, nec vlla ab ipsis arteriæ capillamenta recipiunt, sanguinem ab iisdem durioribus in eas transudabit sanguis? sic certè non nutrietur multæ.

Ipsarum motus continuus, qui potius aptus est interturbare partium coctionem, quæ quiete perficitur, & attractionem, quæ à stabilibus magis, quam ab inquietis obtinetur, ac permittitur, quam iuuare; quique magis ad impellendum, & subtrahendum, quam ad continendum, vel porrigendum id, quod trahi debet, idoneus putatur.

Ipsarum sanguis calidior, tenuiorq; plurimis ob id partibus, quæ sper-

III.

IV.

Alimentum  
ad membra  
non deferri  
per arterias  
probatûr.

Ab ipsarum  
substantie  
modo.

Ab eorum  
continuo mo-  
tu.

maticæ

Ab illarum  
sanguinis ca-  
litate, &  
tenuitate.

▲ Ricta ip-  
sarum cau-  
itate.

▲ pauciori  
ipfarum nu-  
mero.

▲ modo es-  
sum in ser-  
tione in par-  
te.

maticæ glutinosæ, crassæ frigidiore, vel temperatæ naturæ sunt, alen-  
dis improporionatus, ac dissimilis; Quæ causa mouit Galenum, vt pu-  
taret, hoc ideo solos pulmones arterioso sanguine connutriti, & ad hunc  
effectum eorum arterias venosa structura, à Natura fabricatas, sicuti, &  
eorum venas et contra arterioso corpore formatas esse, tradit *cit. 6. de  
usu part. 10.*

Ipfarum stricta cauitas, & earum sanguinis, etiam illius respectu, pau-  
citas, quæ deprehendi potest, si ligetur simul, & semel duobus in locis  
arteria, & inde inter duo ligamina secetur: obseruabitur enim, multò  
copiosorem in venis esse sanguinem; Quod factum est, vt liberè illæ  
pulsare possent, & spiritibus vitalibus velocius deferendus inferirent.

Ipfarum numerus, quàm venarum, paucior, vnde nonnullæ partes  
,, sine nutritionis delatorio tubulo essent: Inuenies enim (ait *Gal. 16.  
de usu part. cap. 13.*) venas quasdam sine arterijs, sed arteriam nullam  
,, sine coniuge vena. ] Cuius rei causam præclare annuit cap. antecede-  
,, denti per hæc verba: Causa verò huius est, quod partes omnes ali-  
,, mento indigent, calidæ, frigidæ, duræ, molles: vt autem calor  
,, natui modus ad auguem conseruetur non ampliùs similiter omnes  
,, postulant. ] Hac de causa, cum in ossa singula venularum capilla-  
,, menta ingredi, ratio omnis suadeat, & doceat *Gal. eodem lib. cap. 14.*,  
arterias in ea inferi, nec dictum, nec rationabiliter putatum tùm ob di-  
,, ctam causam, tùm quia ossis durities arteriæ dilatationem non admittit,  
,, hoc autem vsu sublatò, inutilis esset huius existentia. Penetrant ergo  
,, intra ossa, ait idem *Gal. lib. 16. de usu part. 10. iam cit.*, arteriæ, qua  
,, parte inter se committuntur. ] Quot verò partes sine arterijs, solisq;  
cum venis adsint, præcipuè exteriores, docet idem *lib. de differt. ven.,  
& art. cap. 9.* ibi enim inuenies eorum, manuum, abdominis, dorsi, colli  
superficiem arterijs carere, sicuti, & plures in brachio, in iccoris gibba,  
in septo, in pectore, & capite illas coniuges desiderare venas.

Ipfarum tandem insertionis modus in partes alendas: nam, vt oppor-  
tunè aduertit Conringius sæpè *tit. lib. de sang. gen., & motu cap. 38.*  
,, Neque arterias perinde, vt venas, cernere est, per omnem musculo-  
,, rum carnosam substantiam dispergi, sed pleræque earum quasi in  
,, summo finiuntur. ]

His opposita omnia in venis agnitu facillima sunt: Earum enim tu-  
nica vnica est, eaq; in iccore, alijsq; partibus tenuis, & facilè transpira-  
bilis, vt possit per eam subtilior quilibet succus per quandam diapede-  
sim exugì, & earum ora facilè aperiantur, ac concidant; tùm natura  
quieta est, vt quicquid libuerit, ab ijs furari, trahereq; liceat; tùm san-  
guis temperatior, crassior, & si sic dicere liceat, omnibus adaptabilior  
censetur; tùm cauitas maior, & copia succi in ijs grandior longè, vt  
vnicuique sit satis; tùm & illæ copiosius, & vniuersalius inferuntur in  
partes, sicuti, & altius ad inuima penetrant quocunque.

Quibus si addantur, quæ in primo Libro statuta sunt, nimirùm Iecus  
venarum

venarum esse principium, altricis facultatis sedem, sanguinis officinam, ab ipsoq; alimentosum succum in quaslibet partes, & in ipsum Cor deduci, facile conuinceretur, non quidem ab arterijs propriè, sed à venis in membra sanguinem pro alimento deferri. Et hoc adhuc magis conuincitur à nutritione factus in vtero; hunc enim nutrir per vmbilicalem venam, quæ non ab arterijs, sed à venis deducitur, & in eas per iecur inferitur, concedunt plerique, si non omnes.

*Ventis rectis  
à iecoris, &  
venarum fa-  
cultate.*

Additum verò non in vanum illud Propriè est; nam, si de quadam spiritosa, vitaliq; refocillatione loquamur, libenter admittimus, & sustinemus, eam commodissimè per arterias subministrari, non cæteris partibus solum, sed & Iecori, venis ipsis, earum, succo, & visceribus cunctis. In quem sensum intelligendus venit citatus à Conringio Galenus lib. 16. de vsu part. 10. Huius enim verba hæc in fine capitis posita, Nonnulla verò exigua etiam ad cutem necessariò peruadunt, alimentum partibus, quæ illic sunt, præbitura; J sicuti, & hæc paulò superius signata ibidem Siquidem vesicæ exigua, magna verò, ac duplicia matricibus vasa infixit, vt quæ non solas ipsas matricibus, sed factum etiam in ipsis matricibus concipiendum essent nutritura; J si benè legatur locutionis series; cum ibi Gal. promiscuè tractet de venis, & arterijs, patet, illa adaptanda esse, quibus illarum ex ipso nutritio competit, quæ cum ex Eo sint venæ, de illis quoque verba illa intelligenda esse, constat. Et hanc interpretationem ad Galeni mentem esse, constat ex primis verbis, quæ inferrent (si ad arterias referrentur), nonnullas exiguas ad cutem necessariò ferri, & tamen ex supra allato loco de differt. ven. & art. patet, per Eum nullas arterias ad exteriorem cutem crurum, summæ manus &c. peruenire. Possumus etiam dicere, Galenum pronunciaffe in genere de vasis, quod sint allatura nutrimentum, intelligendo eo modo, quo vtrique horum vasorum generi iam ad præparat in antecedentibus pluribus locis, nimirum, vt venæ partibus omnibus alimentum subministrant solidum, & ipsismet partibus congenue; arteriæ autem quoddam spiritosum, ac vitale sementum, seu refocillamentum natui, & ingeni spiritus.

*Vitalis, &  
spiritosa re-  
focilla à ab  
arterijs lub-  
ministratur.*

Vidit verò scopulum ineuitabilem Auctor hic; & ideo eodemmet capite Suorum moderatus, & interpretatus sententiam, stabilivit, per arterias quidem sanguinem ad partes deferri, sed inibi in venas quiescentes depositari, vt ex eo immediatè illæ alantur, vt supra cap. 6. diximus, & eius verba citauimus. Idem sensisse videtur Rolsius lib. 5. differtat. anatom. cap. 13. per hæc verba: Ex his omnibus tandem manifestum, venas delatum ab arterijs ad Cor reuocare sanguinem; tantum autem, quantum pro nutritione partium sufficit, in suis, vt partibus nutriendis communicentur, retinere extremitatibus. J sed quomodo prioribus à se positis cohererent hæc? Sit enim, quicquid vult, si in ijs venulis quiescit sanguis, vsquequò nutrantur partes, num interim arteriæ transmittent? iam ex eorum principijs hoc patet: quia

*Sanguinem  
Per arterias  
venire, sed  
in venas de-  
poni pro al-  
litione, statu-  
unt Conring.  
& Rolsius.*

*Tale com-  
mentum re-  
fellit.*

In qualibet arteriarum diastole, imò etiam in systole, vt idem ait Conringius, sanguis ad partes mouetur: Si ergo in venis ijs quiescit, & ab arterijs indefinenter confluit, cur non in tumorem eleuabuntur intolerabilem? nec enim coctio in instanti, nec deriuatus sanguis, per Eos in arterias retrocedit, nec poterit per venas remeare: Alias obiectiones non viliores simile subterfugium fugantes vide supra dicto cap. 6. in tertij absurdi trituratione. Dicendum, ergo, huiusmodi noua commenta falsa, & labilia prorsus, esse. Et sic satis probatum remanet, sanguinem per venas ad partes naturaliter deferri tum in artificialibus, tum in spontanis excretionibus, tum ad partes alendas, vt promissimus.

Quarta ratio  
ad exemplo,

Ijs rationibus si aliam addideris, ab exemplo deductam, completam, opinor, afferes huiusce propositionis probationem. Inuenies siquidem alias corporis communes ductus, aliaque delatoria instrumenta naturaliter à maioribus ad minora suas distribuere merces: Ergo, & sic in venis fieri, dicendum. Probatur antecedens ab arterijs, in quibus sic esse, & fieri, ipsimet Contrarij affirmant; à neruisque quorum influxus à truncis ad ramulos expanduntur, & ijs obstructas, in his subito prohibentur. Excipe tamen venas eas, quæ inconfectum succum in Iecoris officinam ferunt, & veluti radicum æmulæ, in tubum maiorem colligunt, vt inde cunctis distributio fiat.

Hinc forsitan occasionem arripiunt Iuniores sua fouendi inuenta, dum venas pro collectorijs riuiulis ponunt, ad Cor, tamquam in cisternam succos deferentibus, vt inde per arterias quolibet transferantur. Sed quàm futilis sit æquiparatio, cuique benè consideranti constabit. Quantum enim numero, capacitate, & succi copia venæ arterias superent, commonstrare superfluum est: Quis autem vidit vnquam in Natura Riuos flumina, hæc mare, à quo cunctæ distribuuntur aquæ, superare? Vel quis in Politicis horrea publica, Principis ærarium, à priuatis facculis, & Procerum crumenis euinci, vel copia, vel latitudine, sine monstrofitate cognouit?

Patiantur ergo cum suo Principe Circuentes, Maria, & lacus venas esse, fontes, ac flumina cor, & arterias, vt supra cap. 7. dictum fuit: Quæcunque enim ad contrariam opinionem suasere Iuniores sequentibus ponderabuntur capitibus, &, diuino iuuante flamine, conuincuntur,

## CAPVT DECIMUM.

*Per arterias etiam sanguinem versus Cor naturaliter moueri ostenditur.*

**P**Riusquàm autem ad hoc veniam, non inconsonum putauerim, tamquàm laciniam, hic pauca adnectere de motu sanguinis etiam in arterijs contra ab Harueio disposita; nimirum à circumferentia ad centrum, ab arterijs ad Cor. Et hinc quidem non longè abeunt Antiquorum placita: Nam per Hippocratem lib. de cord. num. 8., & 9. propte-

re à natura osculo Aortæ membranulas ocludentes disposuit, ne succus in ea fluitans in Cor introeat: ventrem enim Eam depasci, credidit. Galenus per arterias Cordi sanguinem arteriacum in fætibus aduenire, statiliuit *lib. 7. de vsu part. cap. 21.* Per Aortam venæ arteriali sanguinem pro pulmonibus aduenire, dixit *Falop. pag. 130.* Ex posterioribus Franciscus Vlms lib. de liene statuit, sanguinem in sinistram Cordis sinum per arterias à liene suppeditari: Quem sequuti sunt Constantinus Varolius *lib. 3. cap. 4.*, & *lib. 5. cap. 4. Anat.*, & *Aemilius Parisianus lib. 6. nobil. exercit. de subtilit. exercit. 2. cap. 3.*, ac alibi. Per arterias cerebri, veniculi, vteri, aiarumq; partium affectus sic citò, & violentè communicari Cordi, vt nonnunquam obseruamus, omnes communiter tenent Prædicantes, docentq; Auctores; quod non esset, si per eas continuè sanguis à Corde truderetur in membra: quippe ab ipso extra impetente succo quilibet simul raperetur, & retrotraheretur vapor.

Probat, & Hippocr., & Gal.

Idem ex In. aliorum quorundam sententia.

Ex facili particula affectum communicatione Cordi.

Sed, & per has intro, ac ad Cor sanguinè naturaliter ferri, quibusdam alijs, & euentibus, & rationibus probatur. Et primò si aliqua ex arteria sanguis exeat, concitata lypothimia, resistat; quod esse non potest, nisi quia retrò ad Cor abit. Secundò in timore, & horrore valido palescunt partes omnes, & refrigerantur: signum ergo, sanguinem concentrari. Tertiò si à aliqua arteria, mediæ horæ spatio vniuersus ferè exit corporis sanguis ex Harueio ipso: quomodo autem hoc, nisi supponamus, ad ipsam non à Corde solo, sed & à cæteris arterijs circumquaq; ad vulnus deferentibus, ac à venis vndique attrahentibus, fieri sanguinis communicationem? Quartò in admotione exterioris veneni, vel validioris medicamenti, nulla alia clarior causa adduci potest mortis, aut remedij operationis ad intra, quàm arteriarum motus, qui propriè ob dilatationem attrahere, & ob copiam spirituum intrò suscipere, aduare, & ad Cor deferre valet: nam, & *Gal. lib. 1. de simp. med. facul. cap. 12.*, & *3. de nat. fac. cap. 14.* docet, arterias ab ambitu corporis attrahere. Quintò in pudore sanguis repente ad genas volitat primùm, indeq; statim regreditur ad Cor; quod cognoscitur ex rubore statim ibi adueniente, & subsequente non minus raptim pallore. Hoc verò ex retrahentibus venis prouenire, rapiditas effectus minimè suadet: similis enim in exterius apparentibus motus nunquam agnoscitur: Ergo per arterias. Sextò in ira, & furore sanguis in principio ad Cor conuolat, vnde palescunt partes, quod per venas fieri, instantaneus euentus negat: ideo per arterias. Inde ad genas, oculos, & caput furenter irruit, vt ex rubore, calore, & alijs pathematibus conijciur, nec postea sic citò, aut sic facillè recurrit; esset necesse, si per venas, quod abit, retroire deberet, vt supra in pudore fieri, aduersò supponeret.

Ab euentibus idem probatur.

Probat etiam rationibus.

Ratio quoque idem nobis suadet: Si enim venæ, quamuis earum aliquæ nonnullis valvulis impediuntur, vtrunque iter habent naturale, vt supra ostensum est, multò magis arteriæ, quarum cavitates nullum naturæ obicem suere. Item sanguis fertur per arterias, vel per vim



motus earum pulsifici, vel fibrarum ope, vel vi spirituum, vel Cordis opera, vel virtute ipsi sanguini insita: Si primum, pater, in pulsu motus adesse sibi inuicem oppositos, nempe constrictionem, & dilatationem: si ergo per constrictionem pellitur, per dilatationem trahetur; si per dilatationem eijcitur, per constrictionem fugetur. Si secundum, eadem fibrarum tum in superioribus, tum in inferioribus arterijs insunt; ergo eundem efficere in utrisque motum possunt: Si ergo superiores versus caput mouent, cur non inferiores? si inferiores ad pedes vehunt, cur non similiter superiores? Et sic utrumque iter familiare habebunt. Si tertium constat, spiritus nonnunquam ad extra transmitti, nonnunquam intrò recipi: ergo, & sic sanguis. Si quartum, nullum in corpore membrum est, quod à se aliquid pellat, à quo, & aliquid ad se attrahat nequeat: ergo, & sic cor. Per eadem autem vasa, per quæ sit attractio, per eadem expulsio, & è contra, vt docet *Gal. lib. 3. de nat. facul. cap. 13.* Ergo, & Cor ab arterijs aliquando attrahet; non impediente Aortæ valvula; vt enim idem ait *Gal. cit. 6. de vsu part. cap. vlt.* Membrarum epiphysis non ad impediendum, ne nihil omnino, sed ne multum, neue repente in ipsum Cor quippiam immigret, formata est; Et vt *lib. de vsu puls. cap. 5.* non addò os magnæ arteriæ videtur obstruere inembranæ, vt nihil ex ea reddatur. Si quintum, quid vetat, quin per vasa libera, & leuia sanguis, & supra, & infra abeat, prout vltus illius postulat, & opera postulata requirit? Est autem arteriaci sanguinis præcipuus vsus vitalitas, qua non membris solummodo, sed & ipsi Cordi in angoribus, lassationibus, curis, vel laboribus, opus esse potest. Concludere itaque merito possumus, etiam per arterias sanguinem versus Cor naturaliter aliquando moueri.

Et arterias, & venas naturam libris sanguinis ad membra vehunt.

Cum hoc tamen certè mihi dicere, ac affirmare posse, videor arterias melius, facilius, frequentius, & naturalius versus extrema sua sanguinem, ac spiritus deferre; quemadmodum, & de venis quoque tenendum arbitror: nam omnia germina facilius à suis stipitibus, & truncis, sicuti vitam, & esse, ita & alimentitum humorem recipiunt, quàm his illa impartiantur, vel reddant: viuet enim stipes, abscisso germine, non viuet germen sic læso stipite; aget hic in illud facilius, & magis, quàm è contra. Prout, & in artificialibus clarè agnoscitur; in quibus multò agilius magnus canalis in varios canaliculos dispergitur, quàm è varijs canaliculis in magnam canalem humor excurrat. Sunt autem non magis arteriolæ maiorum arteriarum germina, quàm sint venulæ venarum, nec hæ minus, quàm illæ, Vt profectò ostendit idem ramificandi in utrisque modus, idemquæ ad membra progressus utrarumque; Vt propterea nec dissonum sit idem utrisque officium, vel simile assignare; contentum scilicet, sibi; impartitum succum ad membra omnia pro eorum quorumlibet iustitia deuehere: Vnde non immeritò Auicena in definitione febris pronunciauit esse calorem preter naturam diffusum à Corde per arterias, & venas in totum corpus, median-

tibus

tibus spiritu, & sanguine; Sic annuens eandem esse sanguini, ac spiritui semitam in arterijs, & venis, à maioribus scilicet ad minores, minimas, & membra.

## CAPVT VNDECIMVM:

*Adducuntur praeipua rationes Harueiani dogmatis.*

**E**X hucusque traditis, ac discussis, non omnino imperfectè (opinor) videbimur probasse, quis sanguinis in corpore detur naturalis motus; nempe omnigenus, non circularis, ut Neotericorum pars cum Harueio nouiter adinuenit, & affectat: Verùm quoniam non satis est veritatem vnius dogmatis ostendere, nisi, quæ obstant, funditus euellantur, nequæ hæc funditus euellantur, nisi, quæ ipsamet obstacula firmant, simul euertantur; Ideò hic nunc libet potissimas rationes, quæ pro circulari adstruendo sanguinis motu, ab Harueio ipso, & eius Sequacibus adducuntur, recensere; & inde, quæ pro earum dissolutione respondere liceat, singulatim asserre. Et primò

Planum est, à Corde pulsante in singula pulsatione aliquid sanguinis in magnam arteriam tradi, quod Harueius cum Conringio, ac alijs ad semunciam, vel saltè ad dragmiam, alij ad scrupulum, vel etiam minus ascendere putant: Cum autem singula hora plus quàm ter mille ictus fiant, non videtur, quomodo tantum sanguinis possit etià à voracissimo ventriculo suggeri, ut compensetur, ac reponatur id, quod à Caua in Cor, & ab hoc in arterias abiit, nisi per circulum sanguis ipse, progressus, in venas retroeat, iterum ad Cor iturus. Cuius rationis vim, ac fundamentum, ut probent, ad experimenta Anatomica veniunt, exuentes in viuo animali Cor ab omnibus inuolucris, ac inde arteriam pungentes: ex ea enim vident, sanguinem in singula eius pulsatione exire. Item ligantes Aortam ad radicem Cordis; & tundentes in iugulo arteriam, eam citò inaniri, venas autem repletas manere, Corq; statim à copia suffocari, obseruant. Secantes etià Cordis mucronem, vel Aortam præcidentes, singula auriculæ, aut Cordis pulsatione effundi sanguinem conspiciunt. Item, & Cordis pulsus nil aliud esse, quàm sanguinis in Aortam impulsus, per eius diastolem à vena Caua, & arteria venosa partim attracti, partim admissi, illud probat, quod, ligatis arterijs, longè à Corde, vident, eas versus Cor repleri, ac magis intumescere, versus verò extrema deprimi, & inaniri.

Quantitatem verò pulsus sanguinis venantur à capacitate ventriculorum, quæ ad illorum dicta vsque ad uncias duas sanguinis capit: ipsis verò leuiter etiam contractis, quid considerabile eiicitur. Ut autem id oculariter probet Conringius, ipsum Cor aliquo liquore implet, & ipso molliter compresso, videt, copiosum aliquid eiaculari. Item considerat sanguinis excretionem, quæ vulnerata qualibet arteria breui

Prima ratio à sanguinis à Corde in arterias impulsæ quantitate.

Singula pulsus, id est aliquod sanguinis peti, fundentia experimenta.

tempore magna cernitur; ad quam tamen sanguis per Eum totus in Cor transeundo concurret; tùm & eam, quæ, secto vsupra Cordis mucrone, vel Aorta seiuncta, aspicitur in Cane non minor semuncia quolibet istu exire.

Secundò Sanguis per arterias ad quæcunque membra continuè mouetur; ab his verò per venas continuato motu retrahitur, moueturq; versus Cor: dicendum ergo, necessarium esse, vt sanguis, qui arterias petit, à venis, qui has, ab arterijs veniat, & sic continuus in his circulus fiat. Et illum quidem motum per varia experimenta pariter comprobant: Cauam enim tenacula in viuo secto animante apprehendentes, aspiciunt, eam brevissimè versus Cor inaniri, Cor albidias inde fieri, & post languere; inde Cauam solucentes, Aortamq; ex altera vincientes, cernunt, Cor instaurari, rubicundum euadere, ac inde ferè liuidum turgere, itaut ex suffocatione pereat. Item, & venam à carne disunctam in crure viui animalis arctè ligant, videntq; propages illius venæ versus pedes tumescere, versus superiora detumere; sicuti, & idem in alijs venis omnibus tùm inguinum, tùm mesenterij, tùm emulgentibus experientur fieri; veluti, & in venis Cordi superioribus eas quoque versus cor inaniri, versus verò superiora, & latera impleri: Ex aduerso autem, ligatis arterijs, cernunt, eas versus Cortumidiore reddi, versus extrema flauescere. Ligant etiam in missione sanguinis brachium, vel arctè, vt pulsus non sentiatur in carpo, & ita vulnerata vena exit sanguis, sed breui retinetur; vel moderatè, itaut non auferatur pulsus, & tunc sanguis velociter exit: contra verò, si secetur vena supra ligaturam, non exit sanguis, imò eam versus Cor inaniri, declarant. Item, & in phlebotomia obseruatur, per pollicem infra sectionem brachio, vel cruri adhibitum sisti sanguinem, supra verò adhibito non sisti. Item in arcta ligatura supra ipsam sentiunt pulsus maiorem impetum, & quasi impediti sanguinis conatum, infraq; paulatim brachium refrigerari: laxata verò ligatura sub digitos quasi ruentis sanguinis motum persentiunt in arterijs, & frigiditatem illam carpi ad brachium ascendere. Quibus, & alijs experimentis sibi constare, arbitrantur, quod supra dictum est, sanguinem scilicet ad membra deduci per arterias, & ad interiora, seu ad Cor reduci per venas.

Est & existentia valvularum, quæ in venis passim obseruantur eo ordine, & forma dispositæ, vt in ijs, quæ à Corde infra descendunt, prohibeatur omnino sanguinis descensus, & ascensus admittatur; in alijs verò, quæ supra ad brachia, iugulum, & caput repunt, illius ascensus renuatur, feratur descensus. Quare cum natura nihil frustra faciat (inquiunt), ex hoc clarè deducitur, sanguinem non ire à maioribus venis ad minores, nec ab his in minimas, sed e contra ab his in illas: In arterijs autem nullas adesse valvulas, constat, præter eas, quæ in earum implantatione in Cor conspiciuntur, quæquè sanguinem quidem à Corde in arterias recipiunt, ab his autem in illud prohibent regressum.

Cum

Cum igitur per facta experimenta sanguis cōtinuè moueatur, debeantq; indefinenter ali partes, videtur, aliter esse non posse, quàm per arterias ad membra meatum, per venas verò remeatum ad Cor fieri; quæ quædam circulario est. Vt autem valvularum prædictum officium (cum de earum existentia non ambigatur) probent, multa iterum experimenta adducunt, quorum præcipuum illud est, quod adhibitus follis venæ axillari, insufflatoq; qua parte brachium respicit, non potest ventum intro pellere, sed imò in Cauam retrocurrit; sicuti, & in cassum illuc alia arte sanguinem compellere tentatur. Item ligato brachio in robustis, ac rusticis præsertim Viris, ob idq; inflatis venis videntur quidam ipsarum nodi (hic valvulas subesse ponitur), quos si digito versus superiora compresseris, videbuntur cedere, sanguinemq; ascendere in superiorem venam, obseruabitur: si verò versus manum premantur, nil inde posse detrudi, cernetur. Accedat, quod, si specillus in radicem venæ ponatur, & versus ramos immittatur, non valde longe imponi potest: si verò in ramos inditus versus radices adigatur, facillimè penetrat.

Valvularum  
usum addu-  
ctum proban-  
tia experimen-  
ta.

Nec deest finis dictæ circulationis optimus; Vt scilicet sanguis, qui in extremis venarum, arteriarumq; osculis reperitur, ab aere refrigeratus, longèq; à Corde inrudescens, ad ipsum Cor redeundo, recalsiat, ac recoquatur; nè oriosus marcescat, vt aquæ stagnanti accidit non raro, & sicuti in obstructis fieri, conuincitur; vt nutriendis partibus nouis semper sine illarum labore porrigatur sanguis; vtq; continuo illius motu eiusdem coagulatio impediatur, quæ alioqui in histericis, apoplecticis, & venarum interceptionibus contingit aliquando.

Quarta ratio  
à hinc,

Duas alias probationes, ex supradictis dependentes addit Gaspar Brauo *Resolut. Medic. Part. 5. resolut. 1.* quarum prior talis est: Omne Cor viuens debet habere necessariam causam, ob quam illi tribuatur aliqua portio sanguinis attrahendi in vnaquaque systole: Sed sola sanguinis circulatio est necessaria causa, ob quam potest sufficiens copia sanguinis præstari pro vnaquaque systole: Ergo sanguinis circulatio necessario est admittenda; Et maiorem quidem, ac minorem inquit euidenter conuinci Authopsia, & sensibus ipsis: constat enim, vt dictum est, singulo ictu pulsus, sanguinis aliquid exire; & alia superius adducta experimenta circulationem ostendunt; Sicuti & appensa vena Caua tenaculis, promptum est videre, eam citò versus Cor inaniri, Corq; inde emori, nisi, tenacula ablata, detur aditus nouo fluenti sanguini, vt Cor in pulsu perseveret.

Dum proba-  
tiones ex Ga-  
spare Brauo.

Altera huiusmodi est: Si non daretur sanguinis circulatio, maximè esset, quia omnis sanguis à iecore per venas sursum, & deorsum, & versus omnem differentiam corporis communicaretur: Sed ex dictis manifestè constat, quod potius sanguis non mouetur à iecore versus reliquas partes, sed ab omnibus partibus versus ipsum Iecur, & Cauam ascendentem ad Cor: Ergo necessario sanguinis circulatio est admittenda. Minor autem, in qua stat difficultas, conuincitur authopsia, per quam

quam obseruatur, venam sectam infra ligaturam sanguinem euacuare, supra verò ipsam nequaquam, vt videtur in vena inguinis in cane euidenter.

Hæ præcipuæ sunt rationes, quibus paucis abhinc annis cæpit tota distributonis, alitionis, motusq; sanguinis series contrario, quàm sentirent Veteres, modo concipi primùm, inde doceri, ac postmodum apud Exteros non solum, sed & nostrates quosdam ad rauium disputari, fortiterq; teneri; putantes, imò gloriantes, hoc inuento solo nodum soluisse Gordianum tot dubiorum, quæ de contrario chyli, ac sanguinis motu, de illius interceptione, quæ apoplexiam, subitâq; suffocationes, ac mortes minatur, & parit; deq; externorum venenorum, ac medicamentorum vi actuata iam per tot sæcula in Medicina latitabant, agebantur.

¶ *Quæ Authores ex Antiquis iuxta mentem Iuniorum circulationem hanc admitterint.*

Et ne omnino noua, improbabilis, ac authoritatibus destituta videretur huiusmodi Opinio, non de fuere inter Harueij Sequaces, qui opinati sunt, eandem Hippocrati probatam fuisse, vel saltèm non penitus ignotam; Vt quinon semel, præsertim *lib. de insomn. de diata &c.* circuli cuiusdam meminit. Item credere, Platonem, Erasistratum, ac Aristotelem saltèm in nube illam annuisse, & similitudinariè monstrasse. Sicq; generosa fronte sustinere conantur nonnulli, bis ad minus in die sanguinem totum circulariter eo, quo diximus, modo moueri, & per Cor transire; Alij singula hora; Alij citius crebriusq; Alij verò prudentius nil tale determinant, sed iuxta ætatem, naturam, anni tempus, motus, labores, animi passiones, ac similia, modò celerius, modò tardius dictum circularem motum finiri, ac perfici, autumant.

## CAPVT DVODECIMVM.

*Prima Harueiana ratio dissoluitur.*

¶ *Aliquid sanguinis quolibet pulsus ictu exprimit, negans.*

**A**ST ad contrarias hæc rationes promptum est, & per iam dicta, & per postea dicenda respondere: Nam ad primam, qua supponitur, à Corde aliquid semper, & quolibet ictus exprimi sanguinis in arterias, id expressè negatur, & iure: nam arteriæ paucissimo sanguine indigent, & spiritu magis (: ad alimoniam enim partibus deferendam, vt supra traditum est, sunt ineptæ) illumq; non à corde solum, sed à toto etiam venoso genere, cui per multiplicia oscula (anastomoses vocant) vbique conueniunt, excipiunt, attrahunt, vicissimq; reddunt; illud quidem in diastole, hoc verò in systole, prout in foliis fieri videmus: Non impellitur autem à Corde in eas semper, tùm quia simul, & semel cum ijs dilatatur, & constringitur Cor, ideoq; dicendum non est, quid ab eo in ipsas exprimi, sed potius vtraque sua naturali facultate, & dilatationis, compressionisq; vi, quod sibi opus est, trahere, quod lædit, grauatiù pellere; hæc verò vtraq; indefinenter adesse, ac semper in  
se nūquā

fenſiuo corpore prorsus irrationabile est; tūc etiam, quia, etsi quid vel exprimatur in eas, vel ab ipsis trahatur semper: putandum tamen non est, sanguinem esse semper; cum possit, & esse aer, vel spiritus, qui omnia corporis vacua replent, omnibusq; tūc compressionibus, tūc occlusionibus facillimè cedunt, & dilatationibus promptissimè auscultant; id quod sanguini corpulentiori non similiter competit.

Multò autem minus credendum est, tantum sanguinis exprimi, vel trahi, quantum arteriarum dilatata cavitās capit. Alioqui quomodo, cum arteriæ omnes semiduplò saltem fiant in dilatatione capaciores, poterit tantum sanguinis per Aortæ principium ingredi, aut à Corde suppeditari? & quomodo, aut quā statim in subsequeute systole totus attritus, vel immixtus poterit in totum corporis ambitum, & ad pedes vsque temporis momento eiaculari? simul enim, ac semel omnes in toto cum Corde pulsant arteriæ, nec aliqua tactu potest vnquam motuum consequentia, vt in peristalticis motibus, obseruari: Ergo, & hic rursus dicendum est, quod aer, spiritusq; potius sunt, qui, præter modicum suæ ipsorum subsistentiæ necessarium sanguinem, in diastole cavitatem implent, ac in systole reponuntur. Et hinc iure Galenus cum cæterorum Medicinæ Procerum consensu putauit, pulsus finem non quidem sanguinis circulum, sed natiui caloris euentationem, ac moderationem esse (vt libello de vsu puls. legitur); quæ optimè per frigidi aeris attractionem, calidarumq; fuliginum expulsionem obtinentur.

Neque enim fundamentum illud Harueij, quod supponit, in arteriarum dilatatione Cor adstringi, & in earum systole dilatari, subsistens est: quia ei sensus primò aduersatur: vbi enim arteria ferit tactum, dilatari dicitur ergo, & sic Cor: eodem autem tempore, quo in carpo, temporibus, ac pedibus sentitur arteriarum pulsus, eodem inquam, & Cor pectus percutit. Cui euidentia nihil detrahit, quod nonnulli obijciunt, nempe non Cor esse, quod pulsat in sinistro latere, sed Aortam: siquidem hoc obiectum manifestè resellit magnitudo moti corporis, quæ præcipuè in adausco calore exteriori tactu subtus ferire percipitur. Nec rursus aliquid detrahit, quod, Cordis aperto ventriculo, si digitus immittatur, sentitur perspicuè in illius pulsifico idu adstringi: quia hoc est proprium cuiusque partis sensitiuæ, se ad rei præternaturalis contactum, vt illam tentet abigere, retrahere, contrahere, & comprimere; tūc &, si in longitudine Cor contrahitur, in latitudine extenditur, si in hac arctatur, in alia elongatur, vt non multa sit capacitatis immutatio. Sed & huic assertioni nostræ assentitur, & vim addit ratio, quæ supra cap. 3. in sexta obiectione fuit allata. De hoc tamen adhuc clariùs, & fusiùs agetur cap. 18. vbi ex professo talis discutietur articulus: quæ enim vitia, vel necessaria sunt, etiam decies repetita iuuant.

Verum dato, minimè autem concesso, in arteriarum ampliacione Cor constringi, vel, si simul dilatentur, posse aliquid à Corde in arterias in communi adstrictione propelli, prout reuera potest, & forsan facit;

Nec tantum  
exprimitur,  
quantum di-  
latata cavitās  
capit.

In arteriarum  
dilatatione  
Cor adstrin-  
git, negatur  
ei sensus ob-  
iectio.



iam nec necessariò semper, & quolibet ictu sanguinem impelli, credendum: nam vel arteriæ plenæ sunt, vel vacuæ. Si plenæ, quomodo admittent? & quomodo sic celeriter, vniuersaliter, ac liberè constringentur? si vacuæ, quomodo circulatio? aut cur præcessis ictibus non admitterant? vel admissum cur subito eiecerant? si moderatæ, cur non replebuntur tandem? nec enim, nisi plenæ, se exonerabunt. Quod si dicant, se exonerare etiam si non plenæ, videtur absurdum: nihil enim à se expellit, quod sibi molestum, aut graue non est; non autem molestat, quod sibi à primordiis datum, vel congenitum est, nisi exuperet, aut à bonitate deficiat: Molestat (dicent) arterias sanguis, quamuis non impleat, cum earum liberum impediat, motum adstrictionis at cur ergo iterum recipiunt? ex impulsu Cordis, dicent, sed quomodo impulsus ille, qui fit in principio Aortæ, tanget in vno ictu oculi extremitates corporis omnes? & si minimè tangat, cur non replebuntur tandem arteriæ, nil amplius admissuræ? Attrahent, (dicetur) gradatim partes ipsæ: at non semper attrahent (respondeo), sed tunc solum, cum nutrimento, vel cautitatis idonea repletionem illis opus est; postea verò concoctioni, frui-tioni, excrementorumq; expulsionì vacabunt. Ergo non semper à Corde in arterias pelletur sanguis. Alias verò non inferiores rationes ad idem iam supra audisti cap. 1. adductas, quas non im merito hic volo subnexas.

*Nil nisi o-  
pinio non  
improbanda.*

Dato tandem, non tamen admissò, singulo Cordis ictu non nihil sanguinis simul cum spiritu in arterias propelli, illud sic exiguum erit, vt ferè insensibile sit, & quid halituosum. Propterea non omnino præter rem Primitosius in suo aduersus Harueium opere arbitrat, non plus quàm quartam grani partem sanguinis, quolibet pulsus ictu in eas ex-primi. Alij guttulam vnā, vel alteram metiuntur, inter quos Cartesius, Riolanus, Reichnerus &c. vt refert Bartholinus. Quæ quantitas an possit citra circulationem quotidie à cibis sumptis compensari, ac sug-geri, nemo non nouit. Sed simus generosiores nos, & concedamus grani dimidium, non ne ex pastu, in quo quatuor, quinque, & sex libre, cibi, potusq; assumuntur, ritè poterit subministrari? Dempto enim stercore, vrinaq; crudioris modico per emulgentes venas à renibus pri-mum attracto, necnon bilis, atræquæ fæcis pauxillo à liene, & selle ex-purgatis, quæ omnia simul iuncta in sano homine vix ad assumptorum quartam, vt sensui patet ascendunt; reliquum tùm feri, tùm bilis vtrius-que, ac pituitæ vnā cum sanguine (his enim omnibus massa sangui-neâ constat) venas peruadit, vsquequò refoculata fuerint omnia: ex-purgantur quippe postmodum tùm per venas, tùm per arterias serum, ab alijsq; partibus sordes, ichoræ, qui ab vltima coctione supersunt. Ponamus igitur, hominem mediocrem per cibum, potumq; quatuor succi libras accipere singulo pastu; dempta vnā, tres remanent, quæ iteratæ (bis enim plurimi cibantur) libræ sex erunt. Computat is vi-ginti quatuor horis pro die, iam tres vtiatæ pro earum singula erunt, quæ

*Plus quàm  
grani dimi-  
diū sanguis  
posse pro sin-  
gulo pastu  
ictu à iessore  
suggeri, pro-  
batur.*

grana

grana pendunt 1728. Nunc in numero ictuum vnus horæ, nec stemus Primirofio, qui, referente Conringio, septemcentum solos numerat, nec Conringio ipsi, qui ferè duobus millibus acquiescit, demusq; esse tres mille, & amplius; constat, magis, quàm dictum grani dimidium, pro quolibet ictu posse suggeri. Et quid de his, qui ter, quaterq; in dies singulos cibantur? quid de ijs, qui quinque, sexuè succi libras singulo pastu ingurgitant, & qualibet hora largissimè epotant? nec nisi semel in die, vel alternis diebus egerunt? Et quid si alternitantum ictibus expellat Cor, vt probabiliter supposuimus?

Neque hic mihi obijciant id, quod per nos singulæ partes per venas attrahunt: quia, si nobis stetur, sicuti nec totus sanguis in Cor abit, ita nec quolibet ictu attrahit Cor, nec rursus quolibet educit; sed tunc solum, & id, quo sibi, & cæteris indigere videtur; Qui arbitramur, pulsificum motum non propriè ad sanguinem trahendum, ac reddendum sibi Natura donatum (quippe naturali validissima facultate potitur), sed propriè ad aerem, spiritusq; tùm intrò ducendos, tùm cæteris communicandos: quamuis, vbi respiratione pectus priuatur, in anatomica pectoris confossione, cum ei non detur amplius per propria venalis arteriæ, & arterialis venæ oscula aerem inspirare, cogatur, & sanguinem in dilatatione suscipere, sic vacui natura ferente, & ipsummet reddere per Aortam, quousque ei cum vita talis conceditur motus; Cum verò gratis ponimus (minimè concedentes tamen) aliquid à Corde singulo ictu propelli, subintelligimus cætera etiam partis dogmata, nempe totum à lecore costum succum per Cauam ad Cor ascendere, indeq; per arterias toti corpori, & consequenter venis communicandum; quod fieri citra circulationis necessitatem posse, hic commonstrare tentauimus ad abundantem, & forsan peregrinum: Vnde secundum hæc valeant solummodò Aduersariæ rationes in præternaturam se habentibus, & his, qui non aluntur, vtpotè in quibus non suggeritur a iecore sufficiens sanguinis quantitas ad Cordis actioni inserviendum, vel ob inspirationem ablatam aer illumet per propria oscula attrahendus ob apertionem pectoris denegatur: minimè autem in sanis, & decenter cibatis, quibus Natura, cuncta ordinatè disponens, ea alimenta, potulentaq; appetere, capere, concoquereq; concedit, quæ ad corporis instaurandi, & viuificandi munus idonea, ac sufficientia esse, cognoscit; & ea inspiratione, expirationeq; vt disponit, quas ad pulvis manutationem, cordisq; euationem aptas esse, non ignorat.

Sed hæc pro abundanti sint posita, & vt Neotericis pateat, etiam cum fuisset thesibus Circulationem sanguinis a sanis hominibus esse arcendam. Et hic lubens prætereo opinionem Parisani, exultimantis, solos spiritus a Corde in arterias pelli, & e contra sanguinem ab Aorta in Cor pedetentim reponi; cuius fucinam in liene statuit: cum eam omnino inuilem, & rationi absonam arbitrer.

His prælibatis, non vrgent argumenta adducta: Nam ad primum dicitur,

Obiectio san-  
guinis per ve-  
nas in cor-  
pus euntis  
contra nos  
nil operatur.

Parisani opi-  
nio refelli-  
tur.

Responde-  
tur ad primū  
experimen-  
tum.

citur, illud nihil probare; primò, quia à diuersis non benè inferitur: non valet ergo argumentum à vase vulnerato ad integrum: certum enim, si vulneretur arteria, semper a liquid sanguinis in locum vacuati successuum vsquequò in corpore aderit; sic ferente vi vacui, doloris præsentia, agonis molestia, & calidi, spirituosiq; succi natura sibi exitum per patefactum à pulsu vulnus affectante: At, si integra sit, sicuti nil vacuatur, nec consequenter aliud confluet. Secundò quia Cor sanum adeo moderatè mouetur, vt ne quidem aliquando tactu foris in carioso habitu percipiatur: at, si lanietur, euellaturq; non pulsu solum, sed etiam saltu, & cum tensione mouebitur, itaut à manu apprehendente vix detineri valeat, & forcepe aliquando sit opus, vel tenacula. Cumq; ideo violentè se contrahat, non mirum, si in arterias quoque singulo ictu impellat, quæ ipso debiliores, adde, & fauciarum excipere tenentur, tum auidæ, vacui timore imò trahunt. Tertiò quia ob mortis horrorem totus ad Cor sanguis à partibus per venas demandatur; illud verò timore oppressum, ac se viribus concidere sentiens, latè excipit, ac in arterias, quæ sui veluti appendices sunt, quoad potest, fusè reponit; Et tandem, quia inspirati aeris commoditate labiata, tenetur Cor sanguinem necessariò in dilatatione excipere, & similiter in constrictione expellere; Quæ omnia cessant in sano, læto, integroq; homine, vt dictum est, & dicitur infra.

Responde-  
tur ad secun-  
dum experi-  
mentum.

Ad secundum pariter dicitur, quod ligata Aorta in radice, cessat, ac intercepti pulsus non tantum in vniuerso corpore, sed & pusillo potest in Corde ipso, quod transpirare prohibitum, statim à copia re- tenti spiritus suffocatur non secus, ac oclusa flamma, quæ aerem trahere, ac fuligines emittere vetita, subito interit: quare, si tunc feriatur iugularis arteria, statim quidem sanguis in ea existens vacuabitur, vt qui fluidus, calidus, & spirituosus, sibi aperto lancea foramine, spontè exit: à venis autem non educitur: quia ex his ab emoriente Cordè nec trahitur, nec à sepellitur quicquam, sed confunduntur omnia; nec ab arteria ipsa, vt quæ per ligaturam motu priuata est, per anastomoses allicitur aliquid: Ergo non quia simpliciter cesset Cordis impulsio, ideo suffocatur; nec quia à venis in arterias per anastomoses aditus non adit, idèd venæ plenæ remanent in similibus, vt malè opinatur Conringius: sed quia, & eidem spiritus libera transfluxio, vt strangulatis respiratio, & arterijs per motus ablationem attractio denegatur.

Responde-  
tur ad tertiu  
experimentu

Tertium experimentum multò magis claudicat: quantum enim differat vas integrum, & oclusum, ac plenum ab eodem rupto, aperto, vel inani, neminem latet: sicuti namque integrum, oclusumq; quamuis vacuum, non nisi pedetentim, & ebulliendo, per solitarium foramen li- quorem supra innatantem recipit, sic aere locum sibi, ac exitum quæ- rente, vt in cadis vino implendis, si lateris foramen clauditur, quotidie practur; vbi si infra, vel alibi vas ruptum, vel cæsum sit, voraciter, & affatim recipit; sic etiam illud idem plenum, quamuis apertum, & affluenti

affluenti humori peruium extet, vel nil, vel id minimum, quod intus deest, recipit; vacuum verò introeunti succo optimè locum præbet. Tale quid in Corde puta. Si integrum sit, sanguinemq; sibi necessarium, vt in sano homine putandum, quantumuis aperiatur osculum versus Cavam sanguine plenam, vel nil, vel minimum recipiet; illud quidem, vbi vena arteriosa, oclusa a sygmoidibus, nil ob pulmonis in expiratione arctati compressionem à corde exceperit (quod saltèm alternis pulsus ictibus, ob respirationis duplo saltèm tardiozem motum, & interquietem sic longiotem, contingit), hoc verò, si quod illa in sui dilatatione inspirationem consequente exceperit: resistit enim introituro succo, & sanguis, & spiritus, capacitatem occupantes, nihil dilatatione iuuante, ab aerem ab inspirante pectore præcurrentem: clauditur namque Cordi arteriali, non confestim, quò ingreditur aer (vt ait *Hipp. lib. de Cord. num. 10.*) Si verò excisus cordis mucro sit, quotiès, quanta, & quam diuturna fiet osculi Cavæ dilatatio, totiès, & tantum sanguinis ingreditur, nihilo introitum prohibente, introgresso autèm siue sanguine, siue spiritu foras immediatè labente.

Idem de Aorta pensita: in eam enim, si integra sit, cum iam sanguis, & spiritus pro sua capacitate adsint, sitq; illius os tricuspidibus membranæ communita, quantumuis à Corde pellatur sanguis, aut nil, aut modicum acceptabitur; illud scilicet, si plena ad salubritatem extet; hoc autem, si aliquid dissolutum, aut dissipatum, vel vltro missum fuerit; Nil diastolis dilatatione releuante, ad quam, vti festinatissimam, & à subsequente constrictione subito occupatam plerumque spiritus, vel aer, vel quid subtilissimi succi volitat ab vndique positis poris, anastomosis, & hiantibus oscillis; nilq; systolis constrictione obstante, cum per arterialem venam possit introgressus aer in occlusionem retrogredi; Quæ omnia, præcissa arteria, cessant, vtpotè cum nec membranulæ, nec inclusus spiritus, nec sanguis, nec parietum adstrictio obstant, sed sanguis ex se ipso, statim ingressus, effundatur, & labatur improspere, & spiritus euanescat omnis.

Ad quartam verò, quò manifestam Cordis impulsione probare autumant, sic respondeo, quod ligata arteria longè a Corde, quamuis tendatur, ac intumescat versus Cor. versus verò extrema dimittatur; non tamen id ordinarium sanguinis impulsus a Corde in illam arguit; cum huiusmodi distensio a solis spiritibus adauctis ob inreceptam, ac decurtatam solitam viam possit prouenire; illa verò demisso ab ipso rum dissolutione. Quod autem à spiritibus tendantur, ac turgeant arteriosa vasa, nouum non est in viuente, in quo videmus penem, vterum, mammarum papillas a spiritu citissimè inflari, & spiritu dissoluto, vel abeunte, deijci actutum.

Posito verò, non autem admissio, quod à sanguine hoc esset, dico, arterias esse tamquam Cordis germina, ac appendices quosdam, & ideo ad recipiendum omne, quod ipsum contrahat, aptissimas: Ipsum verò

Responde-  
tur ad ques-  
tum experi-  
mentum.

tunc molestat sanguis, qui à toto corpore ob mortis horrorem ad illud tamquam in vitæ Arcem præcipitose consilio per venas impellitur. Et hæc nunc causa erit, cur venæ versus Cor, Cor autem versus arterias sese tunc temporis indefinenter exonerent, quando opera Naturæ ob violentiam nimiam sibi illatam, vel silent, vel peruertuntur, vel præcipitantur omnia; quæ de sanitatis tempore, ac constitutione arbitrari, omnium vetatur tùm à Natura ipsa, ordinatè, ac suauiter cuncta disponente; tùm à vasorum positu, capacitate, forma &c., secundum quæ id solum pellunt, & excipiunt, quod sibi congruit, prodest, intenditur, contenditur.

Responde-  
tur ad quin-  
tum experi-  
mentum.

Quintum experimentum non magis cæteris fidum existet, si consideretur, Cor mortuum quantum à viuo differat, & in sua constitutione, & in aëtiuitate: nam quoad primam, nulli dubium, viuum Cor circumquaque ob calorem diffusibile, vt ideo possit pro sui dilatatione vndique spiritus, aeruè, citrà succi necessitatem, intromitti, & in constrictione similiter educi; quod, mortuum, restringitur densatur, & diffationi ob frigiditatem ineptum redditur. Quoad secundam quoque manifestum est, Cor viuum ab intelligentia sua naturali non errante ad intromittendum id solum, quod sibi expedit, pellendumq; similiter, quod molestat, duci: mortuum verò id omne recipere, quod capacitas sua fert, & educere id, quod constructio allata importat: Ideo incongrua comparatio, incongruum experimentum. Verùm cum his omnibus, supposito primùm, in viuo corde non plurimum sanguinis admitti, tùm quia spirituum minera est: tùm quia sic corporis equaliter pulsanti competit; tùm quia nec vlla alia corporis cauitas ad satietatem, & ad tensionem impletur, sed ad quandam mediocritatem, Naturæ benè visam, reliquo spiritibus, propriæq; libertati donato, vt videmus in venis, ventriculo, intestinis &c., æqualis, vel similis fiat experientia in Corde extincto, & inueniemus, non benè à capacitate ad contenti, & excreti quantitatem argui. Cor igitur sanguine, aut alio succo ad quandam mediocritatem impletum, ad quandam quoque turgorem diastolæ analogum spiritu inflemus, inde modicùm restringatur, itaut systolem pro posse imitemur, & videbimus spiritum, vt volatiliorem exprimi, succo intus relicto. Sic Cordi vsu venire viuenti, ratio omnis dicitur: non enim vtrius instar succo solo adeo oppletur, vt in leui sua constrictione conijciendum sit, sanguinem eiaculari semper, nedum in quantitate semuncie ab Harueio, & alijs quibusdam præsentia.

Responde-  
tur ad sextum  
experimentum.

Sextum autem experimentum minus adhuc efficax ad concludendum, vt aduersò supponunt, existimabitur à quolibet meditante comparationis inæqualitatem: Sexta namque arteria sanguinem fundet primò, qui in se ipsa, sibi quæ continuus ramis iam continetur proculdubio; cum arteriæ simul omnes in cauitate concurrant, succumq; labilem non solum, sed spiritosum, & fugacem contineant. Secundò eum, quem à corde recipit non solum, sed imò ob vacui timorem validissimè trahit.

Tertiò

## CAPVT DVODECIMVM. 165

Tertiò quem simul à venarum anastomosibus, vbiq; simul conspirantibus, sineq; valvulis, vtrinque peruijs, attrahit; quæ in assumpto Conringiano probando cessant: integris enim arterijs, & Corde naturaliter pulsante, impossibile, nedum difficile est, tantum à Cordis impulsu sanguinem ex pelli.

Vltimi autem experimenti fallacitas iam supra ex responsione facta eidem, per quod tentabant probare expulsionem sanguinis ad quemlibet pulsus ictum, manifesta est: eadem enim ratio, quæ de numero inconcludens illud monstrabat, de quantitate quoque continua valet.

Videat nunc ergo Conringius improprietatem exemplorum, per quæ vallet deducere necessitatem, ac velocitatem Circulationis suæ, & quàm immeritò Primirofium arguat dicentem, cardiacæ pulsionis ad arterias, quantitatem esse ex Anatome inuestigatu impossibile; tum & præcipuè spiritus à Corde propelli: ex supradictis enim intelligere poterit, quàm leuia sint, quæ ad retundendas illiusmodi propositiones, attulit propugnacula.

## CAPVT DECIMVM TERTIVM.

### *Secunda ratio Harueiana dissoluitur.*

**S**ecunda aduersaria ratio quàm sit à veritate longinqua, ex ijs, quæ supra capitibus octauo, nonoq; dicta, & sufficienter probata fuere, patet; quicquid videantur contrarium annuere speciosa ex illius parte adducta experimenta, quæ si incudi tradantur, videbuntur inutilia. Et vt in genere aliquid ijs respondeatur, maximè animaduertendum est, valde labilem, ac ambiguam haberi fidem à signis tormentorum vi, & mortis imagine extortis: non secus enim, vt historiæ tradunt, & Leges sanciunt, inefficaces, ac debiles depositiones à testibus torturæ traditis habentur; vt propterea eas extra tormenta repeti, siuè ratificari, sit opus, quò indubia, & fidelis existimetur confessio. Eodem prorsus modo quæcunque de sanguinis, aliorumque naturalium succorum motu à viuentis corpore, sectionum, vellicationum lacerationum, torsionum, pressionum, necisq; spectaculorum medio experimentosa indicia desumuntur, vel nullam, vel omnino leuem fidem merentur. Natura siquidem irritata præcipitat, perterrita confunditur, dilaniata aberrat, euieta fatiscit, cedit, turbatur, omniaq; præpostero modo sua ferè molimina monstrat.

Signa tormentorum, necisq; vi extorta infidela sunt.

Ergo quid fidelitatis signi sperandum est ab animante, cui pectoris os confossum, crudelique cultro apertum sit; Cor a pulmonibus seiunctum, à pericardio diuisum, forisq; manibus, aut tenaculis dirè tractatum; totum corpus diris ligaminibus vinctum; sublata interim gemitus quoque, & lamentantium vocum commoditate? An tunc naturaliter ipsum pulsare, trahere, pellere, agere, excipere, aut retinere putandum?



tandum? Peream ego, si putem, quid ordinatè, & secundum Naturæ leges circa sanguinis motum, ac pulsus in similibus succedere: Vt enim natura ordine gaudet, omniaque suauiter disponit, ita violenta, præternaturaliaque modo, naturalique ordine carent. Vt ideo non parùm admirer, doctissimos Viros adeo Autopsiæ in viuis animantibus cæsis adhibitæ confidere, vt omnia, quæ in sic dilaniatis victimis succorum, sanguinisque motuum signa conspiciuntur, pro tot demonstrationibus eorum, qui in sanis, hilaribusque sunt, habeant, & fateantur.

Hoc responso omnibus fermè adductis; adducendisque experimentis satisfactum puto: Sed vt ad particularia descendam, primum experimentum ad secundam Harueianam rationem firmandam deducum, nihil probat: Nam, præterquam quod in Galenica disciplina omnibus confessum est, Cauam venam à iecore ascendentem Cor versus, & ad omnia superiora membra (sicuti, & alteram ad inferiora) sanguinem deferre; ideoque mirandum non est, illam, tenaculis apprensam, versus Cor inaniri, & infra turgere, cum talis sit eius naturalis, & ordinarius motus, ac vsus; Dicitur etiam, tunc temporis venalem sanguinem præcipuè ad pectus, vbi per sectionem illi exeundi commoditas datur, conuolare tum quia talis est natura fluentis succi, vt suam continuitatem seruet ad possibile, & ob id consecutione ad id, quod educitur, etiam in exterioribus per planum à manufactis tubis succus transiit; tum quia naturaliter pars parti compatitur, & ad succurrendum spiritus sanguinemque transmittit; tum quia Cordi maxima inest attrahendi facultas, vt ait *Gal. 6. de usu part. cap. 15.*, & maior, quò magis indiget, vt in sanguinis, ac spirituum effusione, in Anatome fiente. Ea autem omnia vel cessant, vel sensim videntur salutis tempore, quo nec vulnus aperitur, nec pectus patitur, nec Cor præternaturam indiget. Ex illo ergo experimento non arguitur, sanitatis tempore Cauæ, ac venarum sanguinem in Cor tam breui, ac totum abire: nam præter iam dictam disparitatem occasionum tunc, & alias vigentium, hoc etiam considerandum; Cor videlicet sanum moderatè moueri, ac pulsare, & sic moderatè quoque attrahere, moderatèque pellere, & per consequens id solum, quod ex quotidiana refocillatione subministratur: Ianiatum verò, ac impiè adactum, sicuti validius mouetur, ita & validius tum trahere, tum pellere, ita dilatationis, constrictionisque pulsficæ natura operante: Vnde non sine causa ad illud venalis totus tunc confluit sanguis.

Contra hanc  
Conringij ob-  
iectio.

Dissoluitur.

Hanc responsum opprimere sibi videtur Conringius cap. 36.; dum aduersus Primrosium solis verbis negat, Cor in Anatome validius moueri, qui hac forsan ratione fretus sic pronunciauit; nempe quia in-  
consonum videtur, partem afflictam, ideoque ægram validius agere: Sed frustra hæc obijcit primò, quia in principio luctæ anatomice, dum vires validæ sunt (sana namque animalia, non ægra cultro subijciuntur) verissimè validius mouetur Cor, ad sibi illatam violentiam propulsandam non secus, ac homo iniuriatus, aggressusque, qui ferocius, vehementiusque;

## CAPVT DECIMVM TERTIVM. 167

mentiusq; impetit, quàm quietus, ac pacificus. Secundò quia ubi non validius, eo quod ex dissolutione spiritus, ac sanguinis ob dissectionem insequente vires facillimè fatiscunt: frequentius tamen, celerius, & magis Cor pulsat, sic à spiritu, sanguinis, corporisq; varijs agitationibus, & animi commotionibus aucto calore poscente; exemplo febricitantium, in quibus, et si ægris, sonoq; debilioribus, pulsus maiores, citatiores, crebrioreq; observantur: hoc autem ad maiorem sanguinis attractionem, ac pulsionem sufficit: quia si aduersarijs dogmatibus insistendum, sola maior, vel minor dilatatio, & constrictio, sicuti, & iduum crebritas, non validitas pro pulsione, & attractione attenditur. Tertiò quia, citiam si verum esset, quod nec validius, nec magis moueretur Cor in laniatis; hoc tamen non efficit, nec vetat, quin cum eodem pulsu possit validius, & voracius in his trahere ob effusionem sanguinis, & auctum calorem: non enim sola vi motus, sed & naturali sua magnetica facultate, quam omnium membrorum validissimam possidet, Cor (sicuti, & arteriæ) trahit ex *Gal. lib. 3. de nat. facult. 14., & 15.* iam citatis; sicuti, & ob validissimam suum calorem, quem Conringius ipse cap. 42. inter circulationis causas adnumerat: à nullo autem alio naturalis facultas ad trahendum magis inducitur, quàm à penuria alimentitij succi; nec ab alio calor innatus acuitur magis, quàm à laboribus, & motu. Quartò & ubi quis mordicus teneat, Cor in similibus, vti afflictißimum, debilius esse, sicq; & debilius moueri, & segnius trahere, prompta responsio est, ex hoc quoque non benè ad Cor sanum, ac validum argui: quia sicuti hoc, vt secundum vegetumq; toti corpori suas largè grãcias impartitur; ita illud, vti oppressum, vel in se cuncta reuocat, vel saltem, quicquid grata membra omnia errabundè retribuant, & præcipitanter reddunt, recipere, & in sua æraria, quæ arteriæ sunt, insatiabiliter reponere cogitur non aliter, ac ventriculus in fame canina dicta, in sui inexhausta, in labentibus præ angore viribus nonnunquam peragere cernitur.

De Aorta autem, quod sanguinem, ac spiritus à Corde recipiat, vt dictum quoque est, non ambigitur: sed quod sic præcipiti modo, & singulo istu, cum sanum, & lætum corpus est, recipiat, & deuehat, vt in conuulso, ac laniato accidit, id prorsus irrationabile duco, satq; in præcedenti capite oppositum digito monstraui. Quinimò in indigentis ipsomet Cor attrahere sanguinem ad sui nutritionem, non à Caua tantum, sed & ab Aorta, non dubito: seruatur enim in similibus ea proportio, quam Galenus insinuat, vt scilicet validiora membra trahant à minus validis, vacua à plenis, vsquequò ad omnium imbecillima sit peruentum, non renuente caruncularum, sed membranularum epiphyfi, quæ non prohibet, sed solummodò remoratur ingressum.

Neque maioris momenti illud est experimentum de venis exutis, ac ligatis, quæ versus Cor videntur inaniri, versus verò membra intumesce-  
Ad alterum experimentum responso.

sum

sum valet; nimirum alius motus spontaneus, ac naturalis, alius coactus, & violentus est: contraria namque hæc sunt, siue opposita, à quibus non bene infertur, nisi ad oppositum. Huiusmodi verò motus violentos esse, patet ex causa, quæ violentiam naturæ infert, nempe ligatura.

Ligatura duplex, simplex & complicata.

Duplex quippè ligaturæ consideratio, sicuti, & administratio est, scilicet, vel simplex, & cum modico, vel nullo dolore; vel complicata, hoc est cum excorticacione, dolore, terrore, concussione &c. Vtraque autem quid præter naturam est; cum corpori per eam addatur compressio, & aliqualis molestia, quæ reuera naturalia non sunt: Differunt tamen inter se, quod quæ sine ullo, vel pusillo dolore est, pusillam quoque naturæ violentiam affert, itaut, illa ferè spreta, à suis ea motibus naturalibus non absterreatur, imò potius illi stimulus aliquando addatur, quo motus suos cum maiori energia, & efficacia perficiat. Quæ verò cum diuulsione, dolore ingenti, animiquè terrore complicata est, sicuti Naturæ nimiam violentiam infert, ac ferè deterret, ita & illius naturales motus adeo deprauat, vt vel in oppositum ferantur, vel præcipitanter, & inordinatè edantur. Simpliciter igitur ligatura brachio integro, crurivè adhibita, neque cis, neque vltra depletur vena. Quinimò, nisi arctè nimis adstringat, ex vtraque repletur parte; id quod in pedibus, vel manibus detentis in compedibus, & manicis ferreis, quæ vtrinque intumescunt, videre est. Causam verò, cur versus extrema concitet ligatura supra

Quid simplex ligatura efficiat.

Quid complicata fiat,

visa est cap. 8. At si, excorticato membro, venaque euulsa, cum cespitæ cultri, & necis apparatu, comporeque ferociter arctato, aliqua vena ligetur, non mirum, tunc eam versus Cor inaniri, versus verò membra tumescere: duplex enim tunc causa insurgit, ex angore cordis oborients; eiusdem scilicet ab omnibus partibus velox attractio sanguinis, & spirituum; tum & omnium membrorum ob compassionem ad idem, vt opem ferant, impulsio: compatiuntur siquidem Principi membra omnia, & suppetias mittere arbitrantia, suo se fori spoliant, & ad illud proprias dirigunt merces. Hinc vltra turgor, illinc citra demissio oboritur.

In arterijs oppositum accinitur tribus de causis.

At cur, inquit, in arteria non idem, sed contrarium experimur motum? Triplex huius adduci potest causa, quarum prima ea est, quam in capite antecedenti tetigimus; nimirum arterias esse propria Cordis germina, ac veluti appendices illius, ideoque ad recipiendum omne id, quod Cor contristat, aptissimas: cum ergo tunc Cor ad angorem leuandum insatiabiliter sanguinem à venis recipiat, consequenter in illas sese exonerat; veluti, & ventriculus, indeficienter epotans, vel comedens, in intestina quoque indeficienter eructat. Altera est, quod non solum sunt aptissimæ ad recipiendum, quæ illud molestant, sed & veluti eiusdem æraria sunt, in quæ tempore sanitatis suas opes, spiritus nempe, ac sanguinem depositat: ergo nec mirum, tunc temporis, quando vniuersus sanguis per venas ad Cor, veluti ad arcem, confugit, in arterias, vti in proprias cauitates, reponi. Tertia est, quod arteriæ Cordi innata

vasa,

## CAPVT DECIMVM TERTIVM. 169

vasa, illius passiones citissime sentiunt, vt cognoscitur in animi affectibus, per quos subito alterari pulsus, sentimus; tñ & eodem prorsus modo, quo Cor, moventur: quare tamquam illi distantes ancillæ, ad ipsius nutum non recipiunt solum, sed & simul se dilatantes attrahunt, vt & illud imitentur, & simul subleuent. His verò, & quartam addamus causam a Parte admissam, nimirum valvulas in principio Aortæ adnatas, quæ versus Cor clauduntur, aperiunturq; in arteriam, contra quam sit in sine Cavæ, quæ in Cor aperitur, clauditur verò in venam: quare cum in Anatome viui animalis ob summam violentiam in motu sint omnia, necesse est, vt exitus ab ijs. quærat, prout loci natura, & necessitas simul suadent non è contra. Silent autem omnia hæc in Natura pacifica, quæ comiter omnia ducit, & per determinatos, ductus ordinatè, quæ sola moueri debent mouet, quæ quiescere habent, retinet, quæ superfluà, vel molesta sunt, repellit, vel expellit: Male ergo ab his, motibus, qui luctant, & turbationis tempore conspiciuntur, eos, qui sanitatis tempore vigent, mensurant, arguunt, limitant, comparant Neoterici: quantum enim belli, præliq; motus à pacis, & pacati regiminis motibus differunt, tantum lanienæ motus à salubris Naturæ motibus distat: Est quippe in Anatome pugna inter Naturam, & vim, inter Vitam ac necem; quæ salutari in dispositione abest, totaq; in gaudia, fructiones, nutritiones mutatur, & desinit.

Quæra ad  
idem addi-  
tuc causa.

Tertij v. rò experimenti inutilitas ex ijs, quæ supra cap. 8. declarata, descripta, & conclusa sunt, sat superq; constat: Ab ijs enim, & huius declaratio promptè habetur; quod nempe in arcta ligatura, si vena secetur inferius non diu sanguis fluit, quia intercepta sic via est venis superioribus, per quas, & a quibus fluere possit sanguis: in moderata autem fluit cum impetu, quia liber simul, & cum citatione, à ligatura impellente, per easdem venas fluenti sanguini datur aditus. Supra ligaturam verò si vena secetur, & parum, & sine impetu exit; quia ligatura, non versus truncos, sed versus germina, impetum facit, ideoque vena concidit, nisi sanguis iusto calidior in corpore febrili sit: tunc enim, & sine ligatura, & supra ipsam vena incisa sanguinem effundet.

Ad testium  
experimentum  
tunc respon-  
do.

Quod autem supra ligaturam vena non inanitur spontè, patet visui, vt supra cap. 7. dictum fuit: nam si in summa manu, vel alibi vena aliqua exterior vngue, aut alia subtilire prematur adeo, vt occludatur, videbimus, eam supra prementem rem (adde, & infra) eandem manere, nec detumescere, quod melius adhuc videbimus, si superius alia ligatura addatur: sic namq; statim, si latus funiculus sit, in spatio intermedio illam aliquantulum turgentem obseruabimus; signum, sanguinem in illa commorari, non aufugere. Sed &, si secta ibidem (nempe superius) vena sanguinem fundit, vt omnes admittunt (et si modicus exeat, ac lente) an vacua vena dicenda ibi est?

Supra signa tu  
cum venam  
sponte non  
inaniri pre-  
batur.

Minus facit id, quod adlitus pollex infra venæ vulnus statim sanguinem fluentem sistat, quasi sic sanguis ab extremis veniens inhibeatur:

Ad quorum  
experimentum  
respondo.

hæc enim vera causa non est consentiæ; sed bene quia sic melius uniuntur vulneris parietes, & quia statim, simulq; ligatura tollitur. Et illud quidem patet: quia si bene pollice superius adaptato, vulnus unia-  
tur, ligatura sublata cessabit exitus: ea verò non sublata siue superius, siue inferius, pollex adhibeatur, non sistetur fluxus, nisi vulnus ipsum aut pollice, aut fascia obturetur. Addunt ergo Chirurghi pollicem infra, non quia inhibeat sic sanguinis impetus melius, quam supra adhibito; sed veriùs, quia sic commodior illis, & ad manus, & ad oculos succedit vulneris adaptatio, medicatio, & alligatio, ut cuique consideranti, & experienti patebit.

Ad quintum  
experimentum  
religiosum.

Vltimum experimentum inefficax quoque est: nam si strictè brachium ligetur, sentitur supra ligaturam quidam veluti sanguinis impulsus, seu nixus, & calor, non solum quia arteriæ, sed etiam quia venæ implentur, ob impulsam scilicet in partibus superioribus à dolore, & angustia ligatæ partis sibi naturaliter contiguæ, & ab illis dependentis concitatum: compatiuntur enim membra membris, seseq; mutuo spiritibus, & sanguine fouere contendunt. Laxato autem ligamine, sentitur sub digito sanguinis excursus non in arteria quidem, quæ profundior plerumque deridet sensum, sed in vena, quæ cuti proximior, non tactui soli, sed & disui ipsi in gracilibus sese præfert. Refrigerabatur equidem paulatim manus ex interceptis spiritibus, influenteq; calore præcipue, sed & secundariò, quia natiuus partis calor, arteriarum pulsus, illius moderatore priuatus, veluti suffocatus languescebat. Influxit autem ad partes calor à Corde, non solum per arterias, sed & per venas, ut sensatè monstrat Gal. lib. de usu puls. cap. 3. Proinde si sola arteria ligetur, non valde illud membrum patitur, ut cap. 2. priùs dixerat. Ascendit inde, laxato vinculo aliquantum refrigeratio illa, non quidem ex ascensu refrigerati sanguinis per venas, sed à qualitate ipsa, à parte post partem communicata.

In summa quicquid à sensatis his experiencijs conantur pro illius propositionis verificatione elicere, potius acutiem iudicii, & ingenij solertiam ostendit, quàm probatam veritatem. Quantumcunque enim omnia, ut ab ijs ponuntur esse, admittantur (licet de multis ambigi fas sit), nihilominus quid aliud probant, quàm presentem motum? Is tamen à circulari quàm abest! quàm à perenni! quàm tandem à naturali, & salubri!

### CAPVT DECIMVMQVARTVM.

*Tertia Harueiana ratio soluitur.*

**N**unc ponderanda veniunt, quæ pro tertia ratione afferebantur, ut certò cruatur, num pro circulatione concludat. Et quod ad-  
fiant in quibusdam venis, præcipuè artuum, quædam membranulæ non-  
nunquam

## CAPVT DECIMVM QVARTVM. 171

nunquam solitariae, nonnunquam binæ, & mitrales, vel seminulares, à quibus versus extrema claudatur cauitas, & aliquo modo impediatur sanguinis transitus ad ea versus; id conceditur: sic enim multi posuere Auctores, & de hoc patet sensui. Quibus membranarum propterea à suis adinuentoribus valuularum nomen inditum est, sumpto nomine à similitudine officij illis assignati, quam cum ostiorum, ac fenestrarum valuis ipsas possidere, tradunt, claudendi scilicet transeuntibus exituram.

Sed his concessis, quid tum sequetur? num propterea sanguini omnino negabitur transitus commodus, & competens pro necessitate alendarum partium? non quidem: huiusmodi enim offendicula formauit natura non quidem, ut sibi via tollatur omnino; quæ scit, & per carunculas, & per membranas, & per ossa ipsa, nedum per valuularum rimulas, transmittendo succo aditum parare; sed solum modò, ut à violentis moribus, & ab ea non intentis fluxibus illas saluet cauitates, utq; sibi iacetis sit aliquod frænum, non retenticulum; iuuamen, non impedimentum; angustia, non obturatio. Sic gutturi operculum, epiglottis dictum addidit, quò res bibicas, & comestas inhiheret, aeriq; frigido ingredienti aliquo sanè modo occurreret, ne scilicet affatim ingrediens plus æquo refrigeraret: à quo tamen nec illæ omnino, nec hic aliquatenus ingredi vetantur. Sic inter Cordis ventriculos septum fabricauit, ne libera præberetur via sanguini, sed ut per illud huius pars tenuior, & spirituosior tantum lentè pertransire, vel potius exugi, sed percolari cogeretur. Sic in iecore ipsius carnem inter venæ Cauæ, & Portæ radículas (si Galeno, alijsq; per multis stetur) interiecit, ut moram transeunti, & sanguificando chylo, non transitus prohiberem pararet. Sic in vasīs spermaticis varios gyros molita est, ut lentitiem, non fluendi impotentiam gignendo semini exhiberet. Ergo adsunt quidem valuulæ in venis; non ut impediatur tamen, sed ut modificetur sanguinis ad exteriora fluxus.

Et sic esse, multa clarè indicant, & deducunt; Et primò quod illas frequentiores reperire est in brachijs, & cruribus, quam alibi; quod prudenter admodum Natura patrauit: Nam tot moribus, & brachia, & crura dicata, fuisse, ut nisi huiusmodi adessent offendicula, dubium esset, ne totus ad ea rueret sanguis, sicq; vel priuata, vel eo indigente Caua, viscera, & Cor ipsum pateretur, vel extrema ob nimium sanguinis incursum inflammarentur sæpissimè. Secundò quod, ut ipsemet ait Harueius, nonnullæ ipsarum valuularum viam omnino non obturant; id quod de ijs dicendum maximè est, quæ vnica membranula constant; cuius structura, qualiscunque, & quantacunque sit, nunquam poterit magis claudere versus vnā, quam versus aliam partem, quin eadem à sanguine defluente deflectatur. Sed & in alijs, quæ duabus mitralibus, vel semilunaribus membranarum constant, idem supponendum est; cum sic figurata corpora non possint adeo committi, quin aliqua ex parte conuincant, prout de simili membrana valuula, ori arteriæ venosæ ad-

Ad quid valuulas natura efformauit.

Valentis adscriptum officium probatur.



ante, insinuat *Gal. 6. de vsu part. 16.*, quid eam excrementis fuliginosis, quæ à Corde feruntur ad pulmonem, dare transitum oportebat; Qui imò tùm ibi, tùm cap. 21. etiam in alijs Cordis orificijs, quibus valvulæ tribus membranis constantes præsent, testatur, fieri non posse, quin aliquid, siuè dum clauduntur, siuè etiam clausis illis, refluat per ipsas sanguinis. Tertiò quod liber nihilominus sanguini transitus datur per multas, infinitasq; ramusculorum cum ramulis connexiones, & coniunctiones osculorum, per quas omnes ferè venæ sibi inuicem, veluti rete quoddam, varijs modis communicant, inseruntur, connectuntur internæ cum externis, superiores cum inferioribus, laterales cum laterilibus, vt optimè de multis describit Faloppius in  *suis Anatom. obseruat.* Et quarto, quod huiusmodi valvulæ non in omnibus venis reperiuntur; imò plures sunt venæ, in quibus non adsunt, quàm in quibus adsunt.

▲ valvula  
non benè  
sanguinis mo-  
tus ad Cor  
arguitur.

Ex his ergo elicitur, non benè à valvularum existentia argui continuum motum ad Cor: sic enim frustra essent; cum nil differat, Portæ valvulas adesse semper patentes, & non adesse. Quinimò contrarium arguitur: Natura enim hæc non fabricasset obstacula, nisi cognouisset motum sanguinis ad illa esse, hunc verò vel compescendum, si libeat, vel frænandum, si sit opus. Alioqui, vbi futurus opposito modo fuisset motus, isq; continuus, ac irrefrangibilis, melius quidem erat (vt in arterijs), liberas omnino cavitates esse, quàm ijs membranulis toties iter arctari; vel si necesse erat penitus inhibere sanguinis talem defluxum, debuisset in omnibus eas constituisse venis, non in quibusdam tantum.

ad contraria  
experimenta  
genericè re-  
spiciuntur.

Nec verò ex aduerso allata experimenta quicquam hanc veritatem labefactant: Nam nusquam Ars assequitur fines Naturæ. Sumatur arbor viuens, certissimum est, ipsam è terra sursum rapere alimentum; & tamen, etiamsi excidatur, & tentetur via per quam humor naturaliter ingreditur, ne folle, nec chlystere, nec catethere, aliouè impingente instrumento humorem, aut aerem intromitemus. Tentet quis in animali vrinam, vel alium homorem per renes vi in vteretres immittere, roridum succum in ossa insinuare, aquam per cutem trajicere, nec consequenter inuentum: Naturæ tamen opera quotidiana sunt hæc. Vt exinde quisque videre possit, quàm inualida sit illa positio. Quod non potest vis, minus posse Naturam; cum vis, & Natura opposita sint, nec quid simul esse possit naturaliter, & violentè. Si igitur Naturæ opera multoties Ars non assequitur, quæ Naturæ tamen vbique æmula, & imitatrix dicitur, quid de violentia dicendum, quæ illi e diametro opposita est.

Item & aliud est viuum tractare animal, aliud cadauer: in eo enim propter spiritus, & natiuum calorem omnia dilatantur, omnia communicant, omnia à seipsis manent, & inuicem reguntur cuncta, nilq; alteri graue est, non caro ossibus, non ossa cuti, non pes cruri, non collo caput &c.: In cadauere autem ob frigiditatem omnia adstringuntur, omnia separantur, & inuicem torpent cuncta; muscoli, & caro comprimunt.

## CAPVT DECIMVMQVARTVM. 173

primunt venas, ossa arterias, membranæ, & glandulæ neruos: Non ergo bona consequentia ab ijs, quæ in mortuo phænomena habentur, ad ea, quæ in viuente natura contingunt, vnquam sequitur. Et hæc sunt quæ in genere ad experimenta, quæ contra allata fuerant, obijci, & responderi possunt.

Ijs igitur præmissis, mirum non est, quod per aptum instrumentum insufflando, vel manu trenendo, non possit à vena axillari propelli aer, vel alius succus versus brachiales venas, qui imò in Cauam retroeant: Nam si in cadauere hæc tententur, planum est, brachij venas non solum concidere, sed à musculis, & cuta comprimi, simulq; in varios ramulos semper angustiores abire, scum è contra Caua, multò latior, crassiorq; difficilius concidat, à pectorisq; costis, & spina arctari, comprimiq; prohibeatur: Si verò in adhuc viuente eadem tententur, sanguis ipse ob Cordis angorem ad interiora repens, & aerem, & succum faciliè retropellent. Hinc experimenti fallicitas.

Primum experimentum inæficax.

Quod, ligato brachio, præsertim rusticorum, intumescantium venarum nodi, in quibus valuulas subesse, volunt, si premantur versus superiora, cedant, ac inaniantur, si verò versus extrema, nequaquam; id verò ex nimia extremarum venarum plenitudine accidit, quæ ideo alium difficilè admittit humorem, vt quæ per venarum capita seu fines, vbi semper in angustiora abitur, & itineri finis adscribitur, deponi nequit; Et è contra versus superiora, semper in latiora, & per longa curricula itur, & propterea adactus humor facillimè excipitur. Fit autem in similibus, & in phlebotomandi occasione prædicta vesus extrema iam dicta plenitudo tum ob præcessos brachiorum labores, motus continuos, & ad inferna pensilitatem; tum ob frictionem, quæ à venæ tunsore præmittitur; tum ob ligaturam, quæ præcipuè, vbi moderata sit, versus exteriora sanguinem exprimit ex causis cap. 8. adductis.

Secundū experimentū vana ratio adducitur.

Quod item specillus in venam immisus non possit versus extrema multum longè introduci, nil facit: nam primò, vt iam dictum est, alia naturæ, alia Artis, vel vis potentia est; secundò venæ semper ramificantur magis, & quo magis ad extrema pergitur, eo exiliores, & angustiores fiunt, Tertiò in diuaricationibus quoquo pacto, vel intercipitur, vel intorquetur cavitates. Quare mirari non debemus, stilum non sic faciliè ob diuaricationes, & angustias versus membra impingi, quod succus facillimè fluit, vel (ni aliud) transudat, & præterlabitur.

Tertius experimenti invaliditas ostenditur.

## CAPVT DECIMVMQVINTVM.

*Soluitur quarta ratio Harueiana.*

**N**Vnc sese præfert considerandus finis, qui pro dicta circulatione aduersò supponitur: nam si necessarius inueniatur, admittenda, & ipsa procul dubio est; sin minus, ad quid tot gyros naturali, corruptibilibiq;

biliq; succo præscribere? & cur infatigabili rotæ labilem, alterabilemque humorem subicere? Porro si consideretur Naturæ, summique Opificis sapientia; ac providentia summa, non nisi admiratione dignam, & in proprijs creatarum rerum disponendis actionibus vndique suspiciendam, inueuiemus; Id quod si in cæteris optimè elucet rebus, in homine, qui

*Aeris frigiditati quæ Natura pro animalium edmodo opposuit.*

ad Dei similitudinem plasmatus fuit, manifestissimè conspicitur. Qui igitur aeris frigiditati, quæ tantopere pro natiui animalium caloris attemperacione expetebatur, si in aliquo corporis ambitum lædere poterat; eutem, ac cuticulam opposuit; hisq; dedit, vt in brutis indurescerent, vel squammas, vel pilos, vel pennas sibi in tegumentum comites asciscerent, & his rursus, vt iuxta indigentia rationem ferrentur, deponerentur, crescerent, innouarentur, vt in dies fieri videmus; Soli homini naturalia hæc tegumenta ob illius maiorem venustatem, ac pulchritudinem cum denegasset; eorum tamen defectui pro solita sua prudentia ritè providit, additis scilicet vestimentis, quæ Natura ipsa docet, æstate deponere, autumno assumere, hyeme duplicare, prout vel calidus, vel tepidus, vel frigidus aer perferuntur; Et vbi quis ob paupertatem nequeat se necessarijs operire vestibus, videmus, ei callescere eutem crebescere, augeri; pilos, vel a frigiditate, vbi magna sit, extremè pati, nisi alijs vijs sibi industrius homo a Natura cõsilijs prouideat. Cui quidem incommodo non sanguinis circulationem mederi, sed alia, nempe motum, ignem, restrictionem, frictiones, fatusq; naturaliter subuenire, videmus. Signum Verò manifestum est, adaucto sine, hæc naturaliter appeti, quæri, augeri; immينو imminui; ablato, tolli; Sicuti contra contrarij ob adauctum calorem sine insurgente, contraria quoque, ventilationem, quietem, aquas, ac alia refrigeria, desiderari, & adiuuari. Eodem prorsus modo bruta omnia suis cutaneis passionibus, naturali instinctu ducta; consulendo, hyeme in latibulis, speluncis, stabulisq; libenter degunt; æstate autem ad flumina, fontes, ventos, umbratos lucos, & locos conuolant.

*Quid in homine ad id institutum sit.*

*Quid in homine ad id institutum sit.*

*Probat suppositum in homine, & brutis.*

*Circulationis finem non esse languinis recalcificationem, rationem, ratio prima.*

Et quod sanguinis recalcificatio non sit circulationis finis, nonnulla demonstrant; Et primò quia in omnibus naturalibus (vbi se habeant naturaliter) videmus, ablato sine, siue cessante finali causa, cessare, & effectum, sicuti, & illa vigente, hunc vigere, illaq; languere, & hunc languidum esse. Hoc assumptum vltra prædicta aptè probant tum respiratio, tum pulsus in animalibus: siquidem cum ea ad refrigerandum, siue euentandum natiuum calorem a Natura instituta sint, manifestò videmus, si ex motu, cibo, aere, potu, medicamento, animi impetu, vel alia aliqua præternaturali causa adaugeatur in Corde, & corpore calor, protinus proportionabiliter, & respirationem, & pulsus augeri, crebescere, accelerare, nisi instrumentorum obset defectus, vel robur virtutis elanguat: Si verò è contra ab otio, cibo, potuq; refrigerantibus, animi pauore, aeris algore, medicamento, vel aliqua morbosa causa diuiset natiuus calor minuitur, ea quoque, respirationem scilicet, & pulsus,

pulsu imminui, rarefcere, morari, vel aliter demitti iuxta maiorem, vel minorem tum instrumentorum, tum virium Naturæ cognitam dispositionem; sicuti, & deficiente calore, vt in vteri suffocatione, syncope, interitu, ea quoque statim deficere, comperimus. At in circulationis supposito fine non sic accidit, imò è contra: Ergo male is assignatur. Patet antècedens: nam sicuti, refrigerato corporis apibitu, magis deberet augeri, crebescere, & accelerari circulatio, non refrigerato, vel potius calefacto, imminui, vel etiam cessare; ita è contra potius videmus, eo refrigerato imminui, calefacto, adaugeri: Ex pulsu siquidem circulationem metiuntur Harusiani; ut hic sub Cane, & Orientalibus plagiis non minor, non rarior, sed maior, & crebrior tangitur; hyeme autem, & Aquilonibus in Prouincijs non maior, non frequentior, sed minor, & rarior.

Dicent fortasse, sanguinem non minus inerudescere à magno actu ob spirituum dissipationem, quam à frigore ob contrariam qualitatem: sicuti enim hic positio, illic priuatiua inducitur frigiditas. *Quidam obiecto totum: Hoc datur:* sed quod si temperatus, & sanguini conferens Aer Vere sit? numquid tunc refrigerabitur? non quidem: atuerò nihilominus non minor, non cessans, sed maior, sed vehementior hoc annit tempore cernitur pulsus.

Secundò si talis esset periodi sanguineæ finis, & in febribus synochis, ardentibus, ac alijs dari non deberet, vtpotè in quibus sanguis potius nimio calore vbique flagrat, vnde potius refrigerio illo aeris opus habet, ab eo; si frigidus pareretur, non modicum iuuatur; Et tamen, si in sanis es pulsus rite circulationem dimetiuntur, cum in talibus is maior, crebrior, ac citator fiat, longè celeriorẽ quoque circulationem fieri, dicendum erit, quod fini contrariabitur. Eademmet ratio vigeret in externis erysipelaceis, phlegmonosis, & calidis affeçibus: in ijs enim dubium non est, sanguinem in ambitu refrigerari, vt in quo potius calidior seruandus sit, quam in centro: at nec in ijs deficit pulsus, nec minuitur, sed è contra. Ergo vel ille non est circulationis finis, vel in similibus dicendum, est circulationem non fieri, nec pulsus esse circulationis auctorem, nec eius indicem.

Neque dicendum, in præternaturalibus affeçibus corrumpi causarum essentiam; & per consequens etiam effectum: nam vbi affectus naturæ minimè superet, neque quicquam corumpitur agnitiui finis, & sic neque effectus: videmus enim, salubriter febrientibus sitim, frigidamque respirationis appetitum inesse, calida verò tum actu, tum potentia renui; sicuti algentibus contrarios tum appetitus, tum renus inesse; quæ sicuti in potentijs animalibus elucescant, ita rationabiliter putandum est, in puris naturalibus vigere similiter, quemadmodum, & de pulsu supra tactum est, & in cæteris facile esset ostendere.

Tertiò nec talis finis circulationi necessarius assignari potest: quia non adeò à Corde distant partes omnes, quin possit sine ipsius contactu, vel reditu ad ipsum, eiusdem calore, ac spiritibus quoquo per arterias,

ac venas dispersis, in venulis, arteriolisq; illarum calidis asseruari sanguis, accedentibus maxime tegumentis, natura, & arte cuti admotis. Sed quidquid tandem sit, hæc valeret causa, hicq; insurgeret finis solummodo in partibus remotissimis manuum, pedum, nasi, ac similibus, quæ frigoricæteris sunt obnoxia magis; vel in externis tantum, & cute: non autem in propinquis, ut pectore, collo, abdomine; nec in profundis, ac vndique a cute, membranis, ossibus, musculisq; obiectis, ut iecore, liene, mesenterio, intestinis, ventriculo, diaphragmate &c. multoq; minus in Cordis ipsius, & pericardij circumferentia: At cur, si in his finis deest, pulsus tamen in ipsis quoque sit, & sanguinis idem, qui in cæteris per Anatomen venarum reddititius motus obliervatur? vel quæ mens pulsui præset, ut in illis circulet sanguinem, in his nequaquam? Constat ergo inanem esse hunc finem ab Harueio, & sequacibus circulationi sanguinis assignatum.

Conseruare sanguinem à putredine non esse circulationis finem. Ratio prima.

Secundus finis erat, ne sanguis deses putresceret: At nec hic est necessarius: nam, ut dicebatur superius cap. 3. vnumquodque in sua minera illæsum conseruatur: vnde, & aurum, & argentum pura in suis fodinis seruantur, quæ alibi ætæ indita contrahunt situm. Idem de aqua dixeris, quæ pura in originariis fontibus, lacubus, ac Mari sititur, quicquid de paludibus sit. Est autem vena, sicut, & arteria, proprius sanguinis locus tum generans quodammodo, tum conseruans.

In obstructa parte nec vna, nec sanguis naturaliter se habent.

Neque valet dicere, in obstructa parte, sicut, & in arctè ligata sanguinem putrescere, quod indicat, motus interdictionem putredinis causam esse: nam si de obstructa loquamur, respondeo, tunc nec venas, illius, nec sanguinem naturaliter se habere. Non illas, quia earum cauitas libera non est, ut ideo nec possint cum cæteris communicare, nec a suo principio, quod deest, est, naturalem, ac sanguificam energiam recipere. Non hunc, quia is naturalis non est, sed pluribus excrementis, vel pituitosis, vel melancholicis (qualis esse solet is, qui venas obstruit) conspurcatus, ita ut nec probe a natura regi possit, nec præternaturalibus causis obistere; tum & is sibi ipsi viam præcludit naturalium, vitaliumq; spirituum, adde, & animalium, qui omnes eius proprium, ac innatum calorem foueant: Non valet autem argumentum ab ægro ad sanum, neque exemplum a dissimili ad dissimile.

In non motus defectu, sed in inspiratione prohibita sanguis putrescit.

In similibus enim dicendum est, sanguinem non quidem ex motu defectu, sed ex prohibita transpiratione putredinem nascisci, quam solam putredinis causam attulit Gal. lib. 11. meth. med. cap. 10. Si verò de ligata loquimur parte, vel arctè, vel inodena, ea ligatur. Si arctè, respondeo, tunc non sanguinem solum, sed & simul totam partem paulatim corrumpi, idq; ad defectu spirituum & pabuli, quibus via à ligatura præcluditur; apparere autem prius in sanguine, vtpotè fluido, & facilius putrescibili, corruptionem: Si verò moderatè, neque sanguinem, neque partem corrumpendam, nisi via præcludatur spiritibus, aut obstruantur venæ, quo casu eadem viget ratio, quæ de obstructa parte allata est.

Cur prius in sanguine corruptio apparet.

Neque

Neque ergo ex motus defectu, sed alijs ex causis in huiusmodi putredo sanguini contingit.

Quinimò nec ob desidiã sanguis in sano homine putrescere possit, quandoquidem ipsum vndeque varijs, & per venas, & per arterias motibus moueri necessariò ob varios tum corporis, tum animi motus, manifestum est: sine horum namque aliquo corpus vigilans diu manere non potest. Et vbi quilibet alius motus negetur, nonne per somnum sanguis in interiora abit, in vigilijs ad exteriora ruit? Hac sola ratione moti Doctores vnanimiter in principijs febrilium accessionum somnum damnant, vigilias imparant. Sed & quatenus omnis alius motus cessaret, ea sola omnium corporis partium attractio, quã sanguinem ad se pro quotidiana dissolutione separanda alliciunt, sufficiens motus est ad desidiã, & torporem sanguinis arcessendum.

Hic autem dicit forsan aliquis, circularem motum, quamuis non simpliciter, esse tamen sanguini conseruando quodammodò, siue ad bene esse, vt dicitur, necessarium: Verùm ille salitur: quia ad præcauendam putrescentiam non circularis, in quo ad idem semper fit reditus, & omnia simul miscentur; sed quilibet alius potior, siue aptior est motus; qui imò, quò multiplicior, eò efficacior: sic enim obseruamus, aerem, quò pluribus ventis exponitur, ac mouetur, eò puriorem, ac salubriorem manuteneri; sicuti, & aqua si recta confluit, vel omniuaque dispergitur; à corruptela preferuatur, quã si in breuem gyrum solummodo agiretur, facillimè corrumpitur.

Verum enimverò quid est, quod quilibet calidus, & euaporans succus non motu, sed obturatione indiget, vt in suo vigore conseruetur? imò motu euanesceat, & corrumpitur facillimè? Considerentur vinum, & oleum, quæ obturata centenos seruantur in annos, motu verò vigorem omnem deponunt, & faciliò obeunt. Sanguis etiam vix aeri exponitur, quod vim omnem, & naturalem consistentiam amittit. Nonne ergo, quò minus mouebitur, minus de illius vi dissipabitur, minusq; aeris iniurijs obuiam ibit? Adde, quod per motum sanguis facillimè accenditur: vnde ex ira, mærore, horrore, terrore, amore, ac similibus occasionibus sanguinem commouentibus in dies accendi febres, vi fitur: quare opportunè inter causas caloris motum Galenus, & alij adnumerarunt; & inter februm, ac inflammationum remedia, quæ sanguinis motum compescunt, ac illius quietem, & segnitiem parant, non immeritò reponuntur. Hæc verò obiter, & tamquam perfunctoriè enūciata habeantur, & ad hoc solum, vt videant contra opinantes, quantum irrequieto motui pro supposito conseruando sine sit deferendum.

Tertius finiserat, vt nouus semper nutriendis partibus sine earum labore sanguis porrigatur: sciant verò omnes, vtilem, & eligibilem esse laborem, qui veram voluptatem, vitamq; ministrat; inutilem, ac odiosam quietem, quæ aliorum indiscretionis subiacet, & labile nimis solatium parat. Melius itaque pro partibus nutriendis iure merito fuit, vt

Ratiocorundam.

Circulatio nec ad bene esse est necessaria.

Ratio contra.

Impugnatio rectius à parte supposita.



vnacuatque, quæ sibi suauiora videntur, & vtiliora sunt, ad se traheret, quàm otioando expectare, vt ab alijs indifferenter, & sine propria electione, quæ imò illi onerosa sunt, ad se transmitterentur: Vnumquodque enim naturale pro se, quod sibi magis placet, & familiare est, eligit, & allicit; alijs verò, quæ sibi vel grauiasunt, vel quoquo modo superflua, impartitur. De hoc autem, & quemadmodum trahatur facilius, quod quiescit, quàm pertransiens, potiusquæ à molli, raro, ac tenui vase, quàm à crasso, denso, ac duro, iam supra capite nono disertum est.

Quartus quoque finis re-  
gallicus.

Quartus tandem finis erat, vt continuo motu sanguinis coagulatio impediatur: Sed nec hic necessarius: quod enim sanguis in venis, ac arterijs consistens, & circumquaque ab innato, & à Corde mutuo calore septus possit sine circulari motu congelascere in corpore, cuius propria energia in caliditate actuali fundatur adeo, vt ea cessante, cesset vita; id verò vilis timiditas est: cum nulla nos ratio credere cogat, ad huiusmodi præseruationem circulum, vel alium continuum requiri motum; qui videmus, ceram, ac sebum, quæ aeri exposita subito concresecunt, semel ab igne fusa, etsi non agitentur, solo calore liquida seruari: Quid ergo de sanguine, qui non sic subito ab aere concrescit? qui; in obstructa parte conclusus non coagulum, sed putrescentiam, & calorem contrahit? Quod si in apoplexia, vel aliquo alio affectu visus vnquam fuit concretus sanguis; vel extra vasa, vel corpore extincto, nunquam in adhuc viuo intra vasa repertus fuit. Dato etiam, continuum motum ad hoc postulari, huic egregiè alij satisfaciens motus, ad alia necessarij, absque quod circularis, in multis superfluous, eligeretur.

Concludamus ergo, nullum ex suppositis finibus legitimum, ac necessarium esse; sed sanguinem quidem sic in venis præcipuè, & in arterijs contineri, foueri; vt cuilibet, vel minimæ, corporis parti pro salutari nutrimento inferuiat, utq; quodcunque opus sit, & clamitet necessitas statim conuolet, tam supra ascendendo, quàm infra petendo, tam extra erumpendo, quàm intro se condendo; vel attractus, vel impulsus, vel utroque modo à partibus adactus; prout reuera hoc hominem, à Deo in omnibus liberum creatum, decebat.

### CAPVT DECIMVMSEXTVM.

*Alia duæ probationes diluuntur, & ad oppositas authoritates respondetur.*

Prima impugnetur pro-  
positio.

**S**Vccedunt nunc examinandæ aliæ duæ probationes ex D. Gaspare Brauo eodem cap. 11. adductæ. Ad quarum verò primam prompta responsio est, negando ambas præmissas: siquidem nihil est, quod vrangeat, dari necessariam causam, ob quam Cordi suggeratur sanguis in singula eius systole (melius diastole dixisset) attrahendus; Et primò quia dicta attractio simpliciter necessaria non est, neque vt efficiens, ne-  
que

que vt consequens. Non vt efficiens: nam sine sanguinis attractione Cordi pulsus inest propria illius virtute, vt in Corde è corpore euulso conspicitur, quod sine sanguinis vlla, nec minima successione per aliquod tempus pulsat. Non vt consequens: quia sufficit aer, vel spiritus ad dilatatam cavitatem implendam. Secundò quia vbi necessaria ad bene esse sit, non solum circulatio causa necessaria non est, sed imò superflua, cum sine illa optimè Cauæ possit sanguinis quantitas à Iecore quotidianas cibrationes concoquente subministrari, quæ sani, lætq; Cordis pulsationi satisfaciât.

Ad illarum autem probationem adducta Autopsia non concludit: vt cunque enim, fauciata arteria, vel Corde ipso dissecto, sanguis singulo pulsus ictu profluat, non arguit necessitatem aduenientis sanguinis in integris iisdem: quia ex vulnere, seu reclusione ipsa, singulo pulsus ictu dilatata causa exitus prouenit; quæ ideo in integro minimè aderit: signum verò est, in Corde euulso, cui ad dilatationem sanguis non succedit, neque ad singulum ictum sanguinem proflire.

Experimen-  
ta pro ad-  
ducta decla-  
rantur.

Aliud verò experimentum insufficiens, & ipsum ad probandum intentum declarabit, quicunque pensitauerit, tunc ex ténaculæ adhibitio-  
ne, si Cauæ probè Cor fiat, non sanguinis solum, sed cuiuscunque etiam spiritosi aereiq; corporis, venis ipsis minimè denegari, vt præclare statu-  
it Gal. 6. de vsu part. 16. (horum autem alterutrum pro dilatatione  
supplenda sat est) attractionem denegari, & sic sequi suffocationem  
ipsius, vt in cohibita respiratione, in arteriosæ venæ, & venosæ arteriæ  
obturatione, seu deligatione contingit. Si verò aliquantulum infra Cor  
ligatura fiat, non sic citò pulsandi munus desistere, sed quoad vires va-  
leant, subsistere, cernimus: ablata autem ligatura, aliquid pulsus re-  
surgere, non ex fluentis sanguinis corporeitate euenit primò, sed ab  
illius vitalitate, per quam vires paululum reficiuntur.

Ad alteram verò probationem, ab eodem Brauo deductam, apte re-  
spondebitur, negando minorem: quia, vt supra capite nono probaui-  
mus, per venas sanguinem ad membra omnia naturaliter, sicuti, & ad  
Cor, ite, verissimum est. Neque Autopsia contra adducta fidem facit  
de homine integro, ac sano, cuius status ab anatomizati statu, sicuti lux  
à tenebris, distat. Quemadmodum etiam, quid valeat argumentum à  
ligatura dolorosa, ac horrida, sicuti, & à phlebotomia desumptum, iam  
ibidem & capite decimotertio visum est.

Secundo im-  
pugnatur pro-  
batio.

Reliquum ergo tandem fuerit, vt auctoritates, quas pro circulatione  
facere, a quibudam prædicatur, conciliare, vel e contra, si licet, retor-  
quere conemur. Et vt ab Hippocrate incipiam, si de nomine, vel alio  
quodam accidentario velamine loquamur, fateor, ipsum multoties cir-  
culi, circuitusue meminisse: At si de essentialibus, nempe de Harueia-  
na sanguinis circulatione; nil tale vnquam ab ipso scriptum, vel con-  
ceptum, confirmo: longè enim aliud pro circulo in citatis libris de in-  
somnia, & de diaeta intelligi debere, quàm qui nunc vellet institui, faciliò

quiuis

Hipp. circula-  
tioni con-  
trarius oren-  
ditur.

quiuis lector illorum accuratus perspiciet. Sed imo, quantum is ab introducta circulatione alienus fuerit, demonstrat is idem *lib. de cord. num. 8.*, & *9.* ubi mentem in sinistro Cordis ventriculo constituit, statuens, eam nutrirî pura, & illustri substantia ex sanguinis discretione nata hoc modo, nempe radios suos in proximam sanguinis cisternam (scilicet dextrum Cordis ventriculum) immittendo, & illam depascendo; qui propterea etiam autumauit, viam ex Aorta Cordi à pelliculis ocludi, ne à fluctuatione sanguinis, qui in ipsa est, obrueretur: magnam enim arteriam ventrem depasci, ac intestina, ibidem literis comendauit. Is etiam *num. 2.*, quamadmodum, & *lib. de hom. struct.* sanguinem à Corde non solum per arterias, sed & per venas in totum corpus promanare, conscripsit; ibidemq; in dextro Cordis ventriculo sanguinis, in sinistro spiritus locum collocauit. Quæ cuncta quantum à fundamentis, pro circulatione positâ, aliena sint, facili quiuis conijciat.

Hec Plato,  
nec Aristote-  
les circula-  
ti fauerit.

De Platone, & Aristotele idem statuendum est; circulationem scilicet in homine prætersam Eos non admisisse vnquam. Imò, vtrunque autumasse, sanguinem similiter à Corde in venas, sicuti, & in arterias progredi, latè probauit Conringius *lib. cit. de sang. gener., & motu cap. 31.* Et Plato præterea venis generationem sanguinis adscripsit: quomodo autem posset talis ab ipsis generari succus, si continuè moueretur? ad coctionem siquidem quies requiritur. Hic si circulationis meminit, non aliam, nisi eam, quæ in inspiratione, & expiratione aeris contingit, circumuolutionem memorauit, vt in *Timæi tex. 19.*, & *20.* legitur, sic Galenus interpretante in libris de *Hip.*, & *Plat.* decretis. Illa autem de picta vaporum, ac pluuiæ circularis transmigratione, quam ex Arist. asserunt Harueiani, minimè omnium circuitioni sanguinis competit, eamq; potius, quæ sit in capite vaporum concrementia, & ex qua somnus, & oris irroratio producit, sub exemplari ænigmate præfiguratur.

Quod si circa hos aliquid dubitari contingat, illud nos debet è dubio dimouere, quod Galenus, vbique Hippocratis, & Platonis commendator, Aristotelis autem insectator egregius, nunquam illorum sensum, & opinionem descripsit; quod neququam Vir perspicacissimus, ac solertissimus illorum Interpres, huiusq; Aduersarius, omisisset.

Hec Aristoteles  
circulationis  
contrarius.

De Erasistrato quid dicendum? Porro si quis alius, omnium maxims hanc circulationem ignorauit, & vt melius dicam, impugnavit: cum in arterijs solum spiritum naturaliter detineri, & per illas ferri, asseruerit, itaut Galenus coactus fuerit, vt alibi diximus, aduersus Eum libellum conscribere, in quo probauit certis experimentis, in arterijs ipsis non spiritum solum, sed & sanguinem contineri, ac morari.



*Quod non sola contractio, sed & dissentio in pulsu sit Cordis, & arteriarum actio probatur.*

**Q**uoniam verò non sufficit, argumenta ipsa, & rationes contrarias confutare, sed necesse est, fundamenta quoque illarum euertere, vt sic omnis replicationi locus adimatur: Ideo pedetentim nonnullas ex Harueianis suppositionibus ponderare, & ad nihilum, si possibile est, reducere opus erit. Eam igitur antiquissimam Harueius innouans de Cordis pulsatione opinionem, quam Herophilo attribuit *Gal. lib. 4. de diff. puls. cap. 10.* statuit, solam systolem esse Cordis propriam actionem, diastolem verò, vel esse quandam ipsius concidentiam, & ab opere cessationem, vel reditum ad naturalem statum; Eumq; sequuntur pluriimi circulationis amatores, & in specie Deusingius, Plempius &c. Hoc probant primo.

*Marcellana opinio ex Herophilo, quod sola systole sit Cordis actio.*

Quia motus cordis motui muscutorum respondet (cor enim ex Hippocrate *lib. de cord. num. 4.* musculus quidam fortis non neruo, sed carnis densitate est): Sed horum actio contractio quædam est, cum laxatio sit potius ab actione cessatio: Ergo eadem de cordis motu supponenda sententia est.

*Ratio prima.*

Secundò: Per systolem vi exprimitur à Corde sanguis in arterias, quæ ideo actio quædam propriè dici meretur: per diastolem autem potius sanguinem in se aliunde confluentem Cor recipit; quæ idcirco verius passioni cuidam respondet.

*Ratio secunda.*

Tertiò: Contractio ope fibrarum perficitur, virtute ipsarum intrinseca agente: quare, & actio est: dilatatio autem accidit, vbi in pristinum suum statum fibræ redeunt, quod citra actionem euenit, & sponte Ergo &c.

*Ratio tertia.*

Quartò: Si causam ponamus, qua Cor ad sanguinem impellendum insurgit, quæ ex Deusingio est quædam sanguinis efferuescentia, ac turgentia, vt ait *lib. de motu cord. & sang. sect. 1. num. 11.*, & alibi sæpius; idem dicemus: nam hæc expultricem solam mouet facultatem, quæ contractiōne vitur, non atteratricem, quæ illi contraria contrariam arguit causam; Si ergo sine facultatis motu dilatatio succedit, cum eo verò contractio fit, non illa, sed hæc sola, actio dicenda est.

*Ratio quarta.*

Atuerò huic opinioni in primis altera è diametro aduersatur, per quam statuitur, solam dilationem esse, & cordis, & arteriarum actionem; contractiōnem verò ex spontina caui corporis concidentia citra aliam virtutem prouenire, Cuius Author fuit Asclepiades, sic loco citato referente Galeno. Pro qua opinione nec suæ desunt rationes satis verisimiles. Harum prior est, quod

*Opinio contraria ex Asclepiade.*

Magis proprium actionis opus est, cum aliquid seipsum maius efficit, quam

quam

Pro hoc apl.  
nitione ratio  
prima.

Ratio secun-  
da.

Ratio tertia.

Ratio quarta

Potiores  
videntur ra-  
tiones pro di-  
latione, quā  
pro constric-  
tione.

quā cum minus: Sed dilatatio est quædam sui adauctio, saltē in capa-  
tate; systole verò imminutio: Ergo potius propria actioni est dilata-  
tio, quā constrictio. Maior probatur: quia dilatari, & augeri semper  
agentem claram supponit causam; constringi autem, & minui non sem-  
per: concidunt enim in se ipsa multa sine aliqua motiua facultate, vt  
venis accidit; tabescunt alia non ex actione, sed defectu.

Insuper: Si motus Cordis, seu arteriarum, illorum actio dici debet,  
ille tuis potius existimandus est, quimelius, vt talis, sub sensum cadit:  
Huiusmodi verò est dilatatio, non constrictio: Ergo &c. Maior de se  
patet: quia quod sensu percipitur, alia probatione non indiget. Minor  
probatur, quod, cum motus sit sensibile commune, siue tactum, siue au-  
ditum, siue visum spectes, magis natura apta sentiri est dilatatio, quā  
restrictio; Vtpotē sub hos omnes sensus cadit facilius maior acquisita  
moles, quā minor; vt exinde iuxta Galeni dicta lib. 1. digno. puls. 3.  
Agathinus cum Erasistratijs multis diceret, pulsus contractionem mi-  
nimē sentiri posse, & Galenus ipse capitibus seqq. consteatur, non  
cuius pulsus posse contractionem sentiri; nec quorum possit, proinde  
omnium esse claram. Cuius causam reddit, quod facile sentimus  
affectus corporis nostri, & deinde; quæ hos induxerunt, obiecta mente  
percipimus; & ideo pressionem carnis nostræ, ab arteria pulsante fa-  
ctam, facile percipimus, ipsam verò recedentem non semper, nec in  
omnibus, & non nisi mentis magna attentione adhibita cognoscimus:  
Cur ergo negare actionem in manifestis, admittere in occultis? Si nullum  
in pulsu sentitur mouens, sed tantum motus ipse; & hic in diastole, quid  
aliud arguere, quā propriam in ea se mouendi virtutem?

Item: Neque quid se mouet localiter, quin spatium aliud ab eo, quod  
actu obtinet, occupetur: Sed hoc in dilatatione accidit, non in adstri-  
ctione: per eam enim amplior occupatur spatiositas, per hanc minor,  
quæ in maiori actu continetur, cum minus in eadem re sit pars maioris:  
Ergo dilatatio verius motus est, & in ea impetus actionis elucet magis;  
constrictio autem potius cessatio ab actione est censenda, quā secus.

Tandem: In cæteris cauis corporibus sola dilatatio veluti actio con-  
spicitur; constrictio autem sine vlla actione cognoscitur: Ergo sic, &  
in Corde. Cognoscitur antecedentis veritas in ore, in œsophago, in  
vesicæ collo, in vtero &c.: in his enim videmus ex seipsis, ac sine vlla  
vi dictas partes dilatatas constringi, dilatationem verò cum manifesta  
actione, quæ in voluntate quodammodo consistit, perfici, & exerceri.

Et equidem, vbi statuendum esset, alterum horum motuum esse quasi  
cessationem ab actu, vel, si sit motus uterque, esse vnum eorum redditum  
quendam spontaneum ad statum naturalem, vt volebant Veteres, vel  
coactum à re instante, vt in arterijs velle videntur Neoterici; mea sen-  
tentia potiores sunt rationes, quæ pro dilatatione, quā quæ pro con-  
strictione videntur adducæ: Siquidam, vt dilatur, & pulsus arteria,  
virtus requiritur, vt constringatur, quolibet etiam languidissima, sufficie

vis, & vbi valida sit virtus, valde dilatatur. si debilis, parum; contractionis autem terminus idem semper est, dilatationi tamen necessario respondens.

Neque hic obijciant mihi, aliam esse dilatationem arteriæ, aliam Cordis: quia eandem esse, procul dubio patet tactui, & in sequentibus probabitur: Sed & quatenus eadem numero non esset, eadem tamen specie erit verissimè, & sic valebit ratio.

Atuerò hanc opinionem vnà cum priori manifestè oppugnat *Gal. lib.*

„ 4. de diff. puls. cap. 2. vbi ponit, Pulsus esse peculiare actionem præ-  
 „ cipuè Cordis, deinde arteriarum, quæ distentione, & contractione  
 „ mouentur à facultate vitali, quo caloris natiui mediocritas retineatur,  
 „ generetur autem in cerebro spiritus animalis ] Est quippe vnaquæ-  
 „ que pulsus partium actio propria Cordis, secundariò autem, & per com-  
 „ municationem arteriarum, quæ tùm frigidus trahitur aer, tùm spiritus  
 „ cum sanguine ad omnia truditur membra, & si quæ fuligines adsunt,  
 „ foras pelluntur. Cuius quidem opinionis potiores rationes sunt huius-  
 „ modi; Et primò,

Pulsus des-  
 critio ex Gal.

Quod siue dilatetur, siue restringatur Cor, in vtroque sit motus; cum  
 in vno maior cauitas, in altero minor sensibilibiter efficiatur: Horum autem  
 motuum, vel vterque spontaneus est, ac à propria facultate moti corpo-  
 ris peractus, vel alter horum naturalis, alter coactus. Si primum, vterque  
 motus, actio erit procul dubio. Si secundum, necesse est, in vno eorum  
 (nempe naturali) actionem elucescere, in coacto passionem: Sed hæc  
 incompatibilia sunt: Ergo primum. Et probatur hæc minor: quia ali-  
 ter actio, & passio in eodem subiecto, & eadem illius causa esset, quod  
 non dari, notum; cum idem, vt idem, & secundum idem non possit simul  
 agere, & pati. Et tamen sic in pulsu daretur, quod esset absurdum.  
 Forsitan quis dicet, non simul, sed alternatim in pulsu vigere actionem,  
 ac passionem, nimirum Cor in systole agere, in diastole pati, vel è con-  
 tra, & sic iterum ac iterum, donec à nece dissoluatur mutus hic agendi,  
 & patiendi periodus: Verum enim verò, impossibilia hæc sunt: quia si  
 dilatatio cordis à sanguine impulsio fit, cur inde sanguis ipse à corde  
 arctatur, ac pellitur? Et si hic arctatur, cur postmodum iterum insur-  
 git, Cor euincit, & ampliat? Adde quod, & ad hoc necesse esset, vt  
 aliud daretur membrum corde validius, & similiter quidem, sed con-  
 trario tempore pulsans, vt de corde respectu arteriarum censet Har-  
 ueius. Sed & hic iterum aliud requiretetur illo validiore validius, con-  
 trariòq. motu motum, à quo, & illud moueri posset, & sic processus in  
 infinitum. Si verò dicatur, vtrunque quidem motum spontaneum esse,  
 sed in vno tantum actionem esse, velut in systole secundam Harueium,  
 vel secundum Asclepiadem in diastole; in altero autem nec actionem  
 nec passionem adesse; error est: quia vel motus ille est, vel quies; si is,  
 nullus motus sine mouente fit vel intrinseco, vel extrinseco, & sic actio,  
 vel passio necessariò erit; si quies, non ergo erit motus, quod falsum.

Vtriusque pul-  
 sus partem  
 actionis esse  
 ratio prime.

Alia



Altera ad  
idem ratio.

Alia ratio est, quod vterque est eiusdem partis motus; alter alteri mutuo succedens ordinatè, æqualiter, eodem temporis spatio peractus, mutuaq; ab inuicem quiete distinctus; quorum nihil esset, si vnus à facultate, alter à casu; vnus ab intrinseco, alter ab extrinseco; vnus ex se, alter ab alio esset; Nam non semper eodem modo quid ab alio afficitur; nec actio in alterum sic ordinata cadit, quin multoties tum intentione, tum tempore varietur, prout modo maior, modò minor agentis potentia, vel patientis resistentia inuenitur: At in pulsu sanorum conspicitur, dilatationi respondere constrictionem, tum magnitudine, tum frequentia, tum celeritate. Et vt ratio declaratur ad cuiusvis intelligentiam, ponamus, Cor validissimum esse; tunc si sola constrictio cordis actio est, manifestum, quod validè quidem, & vehementer constringetur, parùm verò dilatabitur, vtpotè validè aliorum impressioni obflans: si verò sola dilatio actio eiusdem sit, validè quidem dilatabitur, molliter autem constringetur, vti deciditlæ (quæ quandam redolentem inbecillitatem) repugnans. Contrarium dicis si Cor fuerit imbecillum nam in actione eneruatum, in passione, vel deciditlæ promptum obseruabitur; Sicq; nullus rhythmus, nulla proportio inter diastolem, ac systolem, nullaq; inter priorem, & posteriorem quietem seruabitur, cui tamen oppositum cognoscitur ordine.

Idem en-  
piscatur re-  
do.

Idem ratio  
ad idem.

Adde his, quod constrictio, & dilatio contrarij sunt motus: Ergo à contraria causa fiunt: At si contraria causa est, ergo sub eodem genere posita systole secundum Herophilum, & Harueianos, à cordis facultate procedit, secundum Aselepiadem dilatio. Igitur vtraque à facultate fiat, quæ essentialiter quidem, genereq; eadem est, nempe motiua, virtute autem, ac potestate contraria, nempe motus oppositos generans; & sic vterque horum motuum actio erit. Eandem autem genere esse facultatem, quæ oppositos motus in viuente edat, patet; quia eisdem vtitur instrumentis, id est musculis, ac nervis in voluntarijs motibus, fibris autem in naturalibus; quæ tamen iisdem inter se oppositis vel figura, vel positu, rectis scilicet, obliquis, ac trasuersis; super oribus, inferioribus; dextris, sinistris; anterioribus, & posterioribus vtens, oppositos quoque motus edere nouit: Idem namque, & in cæteris motibus, sicuti & in sensibus esse videmus: eadem enim parte inspiramus, & expiramus; acutam, & grauem; altam, & submissam edimus vocem; claudimus, & aperimus os, oculos, vnum, vesicam; deglutimus, euomimus. Eodem sensorio calidum, & frigidum; humidum, & siccum percipimus, vti, & in cæteris sensibus apparet. Sed, & hoc in naturalibus actionibus fieri, concludit Gal. lib. 3. de rat. facult. cap. 13. Potissimum quia oppositio, quæ in similibus est motibus, ac perceptionibus, non intrinsecè; & per se, sed extrinsecè, & per accidens est, scilicet loco, seu latione, obiecto, & accidentaliter alio modo opposita; itaut dictamet abusiue vocentur contraria, nec incongruat ab eadem virtute dicto modo oppositas exerceri actiones. Quid igitur de corde dicemus? nùm hoc solum

## CAPVT DECIMVMSEPTIMV. 185

unicam ex se tantum habebit actionem? Et, cum omnium nobilissimū sit, ad minora, quā cætera, valebit?

Amplius: Qui motus magis, & minus, intensius, & remissius sunt, vel à propria, vel ab aliena virtute, procedunt, secundum cuius tenorem variatur, & disponuntur: Sed huiusmodi in pulsus tūm diastole, tūm systole sunt: Ergo, vel à propria, vel ab aliena virtute promanant: Atqui non ab aliena; ergo à propria. Prior probatur: quia quæ, ut pura naturalia, vel concidunt, vel eleuantur, semper eodem tenore iuxta propriam grauitatem, vel leuitatem mouentur, nec vllō tempore (nisi ab externo, vel detineantur, vel incitentur) segnius, aut celerius: sic ergo, & in animalibus existimandum, cum Natura in omnibus eadem, & eodem modo se gerat. Minor tūm in Corde, tūm in arterijs manifesta est: experimur enim quotidie ob varios animi affectus, aut corporis dispositiones diuersas diuersè quoque tūm in systole, tūm in diastole circa temporis, ac intensiōis modum fieri motum.

Hoc nunc consito, quod Cordis pulsus in genere non fiat ab aliena virtute, probatur ex eo, quod, cum Cor omnium membrorum sit validissimum, verisimile non est, vllam partem, aut aliam rem ipsum mouere, & euincere posse. Item quia exutum Cor, & a corpore euulsum, adhuc multoties vtroque motu mouetur per aliquod tempus, ut in superioribus quoque diximus; ex quo arguitur, non à sanguine ingrediente, non à neruo, non ab alio in summa, sed a sua ingenta vi moueri, ut optimè aduertit Galenus lib. 7. de anatom. administrat. cap. 8., & ad notat Galtrucchius in sua Physica partic. disputat. 2. cap. 5.

In specie autem probatur de dilatatione primū, quod ab aliena actione non proveniat, nec ab alio. Non à sanguine ingrediente, ut quidam vellent; primò quia Cordis dilatatio natura præcedit dictum introitum; ergo huius illa est causa, non è contra: causa enim præcedit, non consequitur effectum. Secundò quia ingressui obstant valvulæ, quæ in systole clauduntur, & ni Cor sponte dilataretur, non aperiantur, à sanguinis autem motu dilatari non possunt, si Cor contra agat. Tertiò quia si à sanguinis impetu dilatatio fieret, esset quid coactum, rerum naturalitati indecens; & inordinatum iuxta maiorem, vel minorem ipsius impetum, & maiorem, vel minorem alterius resistentiam. Quartò quia sanguinis mollietis, & fluxibilitas non videtur posse corpus durum cogere ad dilatationem. Tandem quia ex se non mouetur sanguis.

Non à Caua impellente; quippe sic asserendum esset, Cauam Corde esse validiorem, quod nemo forsan dicet; Tum etiam, vel necesse erit, eam facere interpolatos impulsus, vel continuos: si interpolatus, ergo deberet, & ipsa, ut Cor, pulsare, sed contrario modo, nempe constringi, quando Cor dilatatur; quod à nomine vsque adhuc notum. Si continuos, nec Cor se poterit constringere, & ab impulsu præcauere; quia illi obstarent valvulæ, quæ aperiantur in ipsum; & quid maius videtur

Quæstio ad  
idem ratio.

Pulsus non  
ab aliena, sed  
propria sit  
virtute.

Non ab aliena  
fieri probatur  
duobus  
rationibus.

Probat de  
dilatatione,  
quæ à sanguine  
fieri non  
potest.

Nec à Caua  
debentur  
interpolati  
impulsus.

dilatari, quàm dilatatum, teneri. Sed & hæc adesse falsam: Ergo nec à  
 Cause venæ Causæ venæ  
motus propè  
Cor non pro-  
prius, sed co-  
ciliæneus. Caua continuè impellitur. Neque obijciant, Cauam propè Cor moue-  
 ri: motus enim ille non pulsificus, non impulsiuus, sed tremulus est; nec  
 ipsi proprius, aut insitus, sed consecutaneus, & cordis motum sequens  
 ob contactum: sic enim ex pectoris dilatatione, & constrictione mouen-  
 tur in respiratione abdomen, collum, ac reliqua adiacentia membra, &  
 à Cordis pulsu mouetur mammilla sinistra; & ab arteriæ percussione  
 cutis. Itaque cum proprius non sit, nec propriam arguit virtutem;  
 multò minus validiorem suo Auctore.

Nec dilata-  
tio ob conci-  
dentiam fit. Nec verò dicendum, quod ex coincidentia, vt prætendunt nonnulli,  
 illa proueniat dilatio: implicat enim contradictionem, quid dilatari,  
 & concidere: concidere namque dicuntur, quæ dilatata se constringunt,  
 non quæ se iunguntur magis: conceditur autem ab Harueio, & omnibus,  
 cordis ventriculos in diastole fieri latiores. Præterea cordis pulsus ar-  
 teriarum pulsui respondet ex omnium voto: at hæc in diastole non dicun-  
 tur concidere, sed eleuari: ergo & sic Cor.

Nec in ea sit  
reditus ad  
statum natu-  
ralem. Item nec dicendum, Cor in diastole ad naturalem statum ex seipso  
 redire, vt musculis accidit, vbi à constrictione laxantur: quia si sic esset,  
 non daretur maior, vel minor dilatio, sed semper eadem, vt de arterijs  
 arguit *Gal. lib. de vsu puls. cap. 6.*, quod experientiæ, & euidentiæ repu-  
 gnat: nam si statum naturalis is est, qui motu cessante, & mortuo animali  
 videtur, in viuorum diastole maior Cordis, arteriarumquæ sit dilatio,  
 & adhuc longè maior, si vel ex febre, vel ex alio corporis aut animi  
 affectu calor augeatur, & finis vrgeat.

Constric-  
tionem negi-  
ti à virtute el-  
renius, proba-  
batur. Nunc de constrictione, quod nec ipsa ab alieno mouente, sed agente  
 fiat, probatur ex eo, quod, si sic esset, nil verisimilius Cor adstringeret,  
 quàm adiacentia corpora: huiusmodi autem pulmo in primis est, quo nil  
 in corpore, præter pulsifica instrumenta mobilius cernitur: Sed hunc  
 posse Cor adstringere, somnium est: illius enim spongiositas, mollitiesq;  
 Cordis autem stabilitas, ac durities huic repugnant credulitati. Dato  
 autem, quod posset, id fieret in sui constrictione, quæ expirando accidit.  
 Sed si sic esset, deberet expirationi systoles, inspirationi diastoles respon-  
 dere, quod non fit; cum vni expirationi duæ saltem pulsus systoles, vni  
 inspirationi duæ ad minus diastoles respondeant, & consequantur, vt  
 quicuis in seipso carpi tactu potest experiri. Quid verò de arterijs dice-  
 mus? à quonam comprimuntur? à circumpositis partibus? nil mouet  
 immotum? ex repercussione forsan? Carnis, cutisque mollities reper-  
 cutere nequit.

Eandè nega-  
tioni ex con-  
cidentia, nec  
reditus ad sta-  
tum natura-  
lem. Nec item dicendum cum Asclepiade, constrictionem siuè Cordis,  
 siuè arteriarum esse, vel ex spontanea parietum coincidentia, vel reditu ad  
 naturalem statum; tum quia nec Cor, nec arteriæ, mortuo animali, in  
 se concidunt adeo, vt altior infimum cavitatis parietem contingat; cum  
 tamen, validè pulsando, se contingant non raro; tum quia semper  
 eodem modo se constringerent, quod sensui repugnat, cum sentiamus,  
 à maiore

à maiore vi magis Cor constringi, à minore minus.

Tandem : eadem est ratio pulsus, ac respirationis : vtrorunque enim idem finis ( vt proprio dicetur capite ), & idem mouendi modus per reciprocam dilatationem, & constrictionem : Sed in hac tam inspiratio, quam expiratio à facultate fiunt : Ergo, & in pulsu. Minor constat, cum eadem in vtraque respirationis parte ( ni quid impediatur, aut alio distrahatur mens, & voluntas ) temporis, intermissionis, & vehementiæ seruetur qualitas, quantitas, intensio.

His itaque visis, rationibusq; euidentibus probatis, reliquum nunc est, vt ad contrarias, tum primæ, tum secundæ opinionis rationes respondeamus. Ad primam igitur pro Harueio adductam rationem respondeo cum Gal. 7. de anatom. administrat. 8., & 9. Cor verè musciculum non esse ; cum non à voluntate eius regatur motus, vt ex eodem habetur lib. 2. de motu muscul. cap. 5. sed illi, vt dictum est, sic connaturalis, & ingenuus ( à corpore enim auulsum adhuc pulsatur ) ; item quia musculus alijs longè durior, compactiorq; cernitur eius substantia ; ventriculos intus continet, ossibus non alligatur, tot nervosis propaginibus non exornatur, fibris verò omnigenis, contra ac plerique muscoli, imbutur, vt idem ait Gal. 6. de vsu part. 8. Ideo non valet similitudo motus huius cum illorum motibus, qui insuper non ordinati, ac perennes ( vt insunt Cordi ) ; sed voluntarij, & interrupti : non dilatantes, ac reciproce adstringentes, sed contrahentes, & elongantes ; exceptis, orbiculatis quibusdam, vt æsophagi, ani &c., quos constringi, ac dilatari, conspiciamus, prout voluntas exigit, vel irritata insurgit. Ad Hippocratem eutem, vbi Cor musciculum vocauit, dicimus, illum id similitudinarie pronuniasse, vt ex dictione illa ( quidam ) colligitur ; differentiam verò annuissè, dum dixit, non neruo quidem, sed carnis duritiæ musciculum fore esse ; Et vbi musculus dicendum esset, illi peculiarem esse motum ingenuum, independentem, perennem, ab aliorumq; musculorum motibus dissidentem, Hippocrati non repugnat, qui nullibi contrarium affirmavit.

Ad alteram dicitur, quod, dato etiam, per systolem sanguinem, vel spiritum à Corde in arterias expelli, tantundem tamen per diastolem ab eodem attrahi, dicendum est, siuè id ratione vacui euicandi, siuè ratione naturalis igneitatæ, quæ, vt lychnus oleum, nutrimentolum succum allicit, siuè ratione familiaritatis substantiæ, quæ à nutrienda parte appetitur, euenire, credatur : omnibus enim hisce modis, vel aliquo istorum Cor validissimè omnium trahere potest. Cum ergo non minus actio dicenda sit attractio, quam pulsio, iure vtrunque pulsus motum actionem nominabimus : monstratum enim est, non ingressui sanguinis Cordis dilatationem, sed huius dilatationi illius ingressum esse adscribendum. Quare non possum non mirari, peritissimum Deusingium, qui pluries confirmauerat à Corde sanguinem ex toto corpore, Antiquis inuicem, allici, in huiusmodi descendisse sententiam, vt dilatationi ( quæ attractionis

Vtrunque  
pulsus parè  
esse actione,  
ratio quinta

Responde-  
tur ad primam  
Haruerianam  
rationem.

Responde-  
tur ad secundam.

causa est) actionis nomen denegarit.

*Respondetur  
ad tertiam.*

Ad tertiam dicitur, si constrictio ope fibrarum euenit, dilatationem ipsarum quoque ope perfici, vt apertissime commonstrat *Gal. 6. de usu part. 8.* vbi, quod rectis fibris, seu quæ secundum longitudinem disperguntur, tensis, cæteris verò otiantibus, dilatatio Cordis oriatur, e contra verò, his relaxatis, & quæ secundum latitudinem sunt, seu transuersis se contrahentibus, restrictio fiat, clarè ostendit.

*Respondetur  
ad quartam.*

Ad quartam respondeo, si Cor, vt opinatur Deu singius inducitur à turgescentia, & effervescentia sanguinis ad se coustringendum, & expellendum, eidem superuenientem defectum illud ad se dilatandum, vt nouum attrahat succum, inducere. Et sic si in vno motu agit, in alio nõ oriatur, si in hoc adest causa, in altero non deest. Veruntamen (sit autem obiter dictum) potius contraria, vel alia causa tùm dilatationis, tùm constrictiõnis ponenda est: si enim hi sunt motus præcipuè, vt innatum calidum ventiletur, moderetur, roboreturq; vt Galenus euidentissime *lib. de usu puls.* concludit, manifestum est, ab effervescentia potius ad dilatationem Cor induci, vt aere sic attracto, refrigeretur; ad constrictiõnem verò à frigore inducto, quod calor continuetur. Id quod etiam ab effectibus caloris, cuius proprium videtur rarefacere, ac dilatari, sicuti frigoris densare, constringereq; potest rationabiliter suaderi. Et hoc idem aperte docuit *Aristot. lib. de respirat.* Resilitio (inquit) est facta obuiatio ad frigidi compulsionem: Pulsatio autem humidi calefacti inflatio. ¶ Vtunque sit, planum est, non deesse causam dilatationis, nec casu illam fieri, itaut Cordis actio dici non mereatur.

*Respondetur  
ad primam  
pro Atelepsia  
de rationem.*

Veniens modò ad alias rationes, quæ solam dilatationem actionis nomine dignabantur, non minus promptum est ad eas respondere: quandoquidem, Si prima consideretur, facilis cadet responsio, si dixerimus, contractionem, & distensionem esse motus merè oppositos, quorum neutrum sine actione vel propria, vel aliena fieri, rationabile est: nec enim quid a contrario in contrarium sine mouente mouetur, quicquid sit de motibus, qui ab extremo ad medium, vel ab alieno ad proprium locum spontè etiam in inanimatis fiunt (quos à natura tamen fieri, docet *Aristot.*) Patet autem, in pulsu vicissitudinarium fieri Cordis motum ab opposito ad oppositum: ergo non sine actione id fieri continget; quæ cū aliena esse non possit, vt monstratum est, remanet, vt propria statuatur. De reliquo non verum, quod magis actionis proprium sit dilatare, quàm constringere: nam si multa sine facultate motiua constringuntur, non minus multa si dilatantur. Imò si de inanimatis loquamur, videbimus multa in seipsa pressa, aut per vim constricta, quæ sine alterius ope facillimè ampliantur.

*Respondetur  
ad secundam.*

Si verò secunda, dicendum est, propositionem primam esse falsam, quia rei alicuius existentia siuè sensu, siuè ratione, siuè vtroque probetur, per hoc nec magis, nec minus acquirit, nec secundum hoc præeminentiam, vel humilitatem adipiscitur vllam. Pateat ergo Cordis con-

strictio

## CAPVT DECIMVMSEPTIMVM. 189

Alitio solis Anatomicis, solisq; pulsum obseruatoribus egregijs, nou minus ob id actionis nomen merebitur alias nec coctio, nec nutritio, nec alia id genus naturales operationes sensui incognitæ actiones dicendæ essent; quæ tamen excretionibus, quamuis sealatis vel hoc ipse, quia solo rationis lumine discernuntur, nobiliores censentur.

Si autem tertia, dicere possumus, corpus cauum, siue dilatetur, siue arctetur, spatium aliud à priori occupare, cum reuera aliud spatium sit illud cavitatis internum, in constrictione obtentum, aliud externum à dilatata superficie occupatum; & ideo in vtraque motione elucescere diuersæ spatio sitatis occupationem. Nec dicendum, minus spatium in maiori virtualiter contineri, cum vnū ab altero possit realiter distingui.

Respondetur ad tertiam.

Tandem ad quartam respondetur, quamuis constrictio illarum partium videatur sine vlla actione esse; reuera tamen, & veriolem, quam in dilatatione actionem inusculorum in ea fieri, vt docet *Gal. 2. de motu muscul.* 8. vbi propriam illorum actionem constrictioem, & retentionem nominat; dilatationem verò, & excretionem non nisi secundum accidens, quatenus scilicet ab actione oriuntur. Et huius indicium manifestum hoc est, quod, ijs resolutis, excrementa inuoluntariè, & intempestiue prosiliunt. Quod si in egestionem, & mictionem videtur conatus, & vis actionis adesse, non illorum annularium muscutorum opus huiusmodi est, sed aliorum epigastrii, ac abdominis, qui, cum diaphragmate contra præmentes, illos dilatari, & ab actione desistere cogunt, vt ibidem legitur.

Respondetur ad quartam.

## CAPVT DECIMVM OCTAVVM.

*Quod eodem prorsus modo, ac tempore pulsant arteriæ, quo Cor.*

Simili autem modo, eodemq; prorsus tempore, quo Cor. moueri arterias, simulque cum eo dilatari, sicuti, & constringi, quicquid Heraclitæ, & Harueiani contradicant, certo certius est; idq; probant tum sensus, tum ratio. Et sensus quidem, quia, si tactu Cordis regio, & carpus simul tangantur, percipimus, vnicum, & vniuocumq; esse amborum idem, prout & quiuis in seipso, vel sano, vel febricitante potest experiri. Hucusque consentiunt Neoterici, sed vterius progrediendo dissentient, contententes, dum Cor pectus ferit, illius hunc esse systolem. Et hoc visu in primis innitentes probant: Cor enim viui animalis dissecti exuunt, aspicuntq; , vel aspicere imaginantur, Cor, quando eleuatur, constringi, ac quodammodo elongari, itaut cuspis aliquantis per sursum retracta costas percutiat; sic ait Harueius, nec longè abest Deuisingius. Tactu etiam idem patefaciant: nam Cor ipsum scindentes, digitumq; imponentes, sentiunt tunc temporis digitum premi, & flaccescente corde, laxari.

Cor, & arterias eodem modo sensu probatur.

Neoterici ob objectionem.

Sed verò, his non obstantibus, priori assertioni insistendum: quia, si, Refellendum



Hipp. circula-  
tioni con-  
trarius osten-  
ditur.

quiuus lektor illorum accuratus perspicit. Sed imo, quantum is ab in-  
troduc[t]a circulatione alienus fuerit, demonstrat is idem *lib. de cord. num.*  
8., & 9. vbi mentem in sinistro Cordis ventriculo constituit, statuens,  
eam nutrir[i] pura, & illustri substantia ex sanguinis discretione nata hoc  
modo, nempe radios suos in proximam sanguinis cisternam (scilicet dex-  
trum Cordis ventriculum) immittendo, & illam depascendo; qui prop-  
terea etiam aurumauit, viam ex Aorta Cordi à pelliculis ocludi, ne à  
fluctuatione sanguinis, qui in ipsa est, obrueretur: magnam enim arte-  
riam ventrem depasci, ac intestina, ibidem literis commendauit. Is etiam  
*num.* 2., quamadmodum, & *lib. de hom. struct.* sanguinem à Corde non  
solum per arterias, sed & per venas in totum corpus promanare, con-  
scripsit; Ibidemq; in dextro Cordis ventriculo sanguinis, in sinistro spi-  
ritus locum collocauit. Quæ cuncta quantum à fundamentis, pro cir-  
culatione posit[is], aliena sint, facillè quiuus conijciat.

Hec Plato,  
nec Aristote-  
les circula-  
tio si suent.

De Platone, & Aristotele idem statuendum est; circulationem scili-  
cet in homine prætenfam Eos non admisisse vnquam. Imò, vtrunq[ue]  
autumasse, sanguinem similiter à Corde in venas, sicuti, & in arterias  
progredi, latè probauit Conringius *lib. cit. de sang. gener., & motu cap.* 31.  
Et Plato præterea venis generationem sanguinis adscripsit: quomodo  
autem posset talis ab ipsis generari succus, si continuè moueretur? ad  
coctionem siquidem quies requiritur. Hic si circulationis meminit, non  
aliam, nisi eam, quæ in inspiratione, & expiratione aeris contingit, cir-  
cumuolutionem memorauit, vt in *Timæi tex.* 19., & 20. legitur, sic  
Galenus interpretante in libris de *Hip., & Plat.* decretis. Illa autem de  
picta vaporum, ac pluuiæ circularis transmigratio, quam ex Arist. affe-  
runt Harueiani, minimè omnium circuitioni sanguinis competit, eamq[ue]  
potius, quæ sit in capite vaporum concrefcentia, & ex qua somnus, &  
oris irroratio producitur, sub exemplari ænigmate præfigurat.

Hæc Aristote-  
les circula-  
tio non est.

Quod si circa hos aliquid dubitari contingat, illud nos debet è dubio  
dimouere, quod Galenus, vbique Hippocratis, & Platonis commenda-  
tor, Aristotelis autem insectator egregius, nunquam illorum sensum, &  
opinionem descripsit; quod neutiquam Vir perspicacissimus, ac soler-  
tissimus illorum Interpres, huiusq; Aduersarius, omisisset.

De Erasistrato quid dicendum? Porro si quis alius, omnium maxi-  
s hanc circulationem ignorauit, & vt melius dicam, impu-  
gnauit: cum in arterijs solum spiritum naturaliter detineri, &  
per illas ferri, asseruerit, itaut Galenus coactus fuerit, vt  
alibi diximus, aduersus Eum libellum conscribere, in  
quo probauit certis experimentis, in arterijs ipsis  
non spiritum solum, sed & sanguinem  
contineri, ac morari.



## CAPVT DECIMVMSEPTIMVM.

*Quod non sola contractio, sed & distentio in pulsu sit Cordis, & arteriarum actio probatur.*

**Q**uoniam verò non sufficit, argumenta ipsa, & rationes contrarias confutare, sed necesse est, fundamenta quoque illarum euertere, vt sic omnis replicationi locus adimatur: Ideo pedetentim nonnullas ex Harueianis suppositionibus ponderare, & ad nihilum, si possibile est, reducere opus erit. Eam igitur antiquissimam Harueius innouans de Cordis pulsatione opinionem, quam Herophilo attribuit *Gal. lib. 4. de diff. puls. cap. 10.* statuit, solam systolem esse Cordis propriam actionem, diastolem verò, vel esse quandam ipsius concidentiam, & ab opere cessationem, vel reditum ad naturalem statum; Eumq; sequuntur plurimi circulationis amatores, & in specie Deusingius, Plempius &c. *Haruelana: opinio extra Herophilo: quod sola systole sit Cordis actio.*  
Hoc probant primo.

Quia motus cordis motui musculorum respondet (cor enim ex Hippocrate *lib. de cord. num. 4.* musculus quidam fortis non neruo, sed carnis densitate est): Sed horum actio contractio quædam est, cum laxatio sit potius ab actione cessatio: Ergo eadem de cordis motu supponenda sententia est. *Ratio prima.*

Secundò: Per systolem vi exprimitur à Corde sanguis in arterias, quæ ideo actio quædam propriè dici meretur: per diastolem autem potius sanguinem in se aliunde confluentem Cor recipit; quæ idcirco verius passioni cuidam respondet. *Ratio secunda.*

Tertiò: Contractio ope fibrarum perficitur, virtute ipsarum intrinsicæ agente: quare, & actio est: dilatatio autem accidit, vbi in pristinum suum statum fibræ redeunt, quod citra actionem euenit, & sponte Ergo &c. *Ratio tertia.*

Quartò: Si causam ponamus, qua Cor ad sanguinem impellendum insurgit, quæ ex Deusingio est quædam sanguinis efferuescentia, ac turgentia, vt ait *lib. de motu cord. & sang. sect. 1. num. 11.*, & alibi sæpius; idem dicemus: nam hæc expultricem solam mouet facultatem, quæ contractionem vituit, non attracticem, quæ illi contraria contrariam arguit causam; Si ergo sine facultatis motu dilatatio succedit, cum eo verò contractio sit, non illa, sed hæc sola, actio dicenda est. *Ratio quarta.*

Atuerò huic opinioni in primis altera è diametro aduersatur, per quam statuitur, solam dilatationem esse, & cordis, & arteriarum actionem; contractionem verò ex spontanea caui corporis concidentia citra aliam virtutem provenire; Cuius Author fuit Aesclepiades, sic loco citato referente Galeno. Pro qua opinione nec suæ desunt rationes satis verisimiles. Harum prior est, quod, *Opinio contraria ex Aesclepiade.*

Magis proprium actionis opus est, cum aliquid seipsum maius efficit, quam

Pro hac op-  
mione ratio  
prima.

quàm cum minus: Sed dilatatio est quædam sui adauctio, saltem in capa-  
citate; systole verò imminutio: Ergo potius propria actioni est dilata-  
tio, quàm constrictio. Maior probatur: quia dilatari, & augeri semper  
agentem claram supponit causam; constringi autem, & minui non sem-  
per: concidunt enim in se ipsa multa sine aliqua moriua facultate, vt  
venis accidit; tabescunt alia non ex actione, sed defectu.

Ratio secun-  
da.

Insuper: Si motus Cordis, seu arteriarum, illorum actio dici debet,  
ille tuis potius existimandus est, quimelius, vt talis, sub sensum cadit:  
Huiusmodi verò est dilatatio, non constrictio: Ergo &c. Maior de se  
patet: quia quod sensu percipitur, alia probatione non indiget. Minor  
probatur, quod, cum motus sit sensibile commune, siue tactum, siue au-  
ditum, siue visum spectes, magis natura apta sentiri est dilatatio, quàm  
restrictio; Vt potè sub hos omnes sensus cadit facilius maior, acquisita  
moles, quàm minor; vt exinde iuxta Galeni dicta lib. 1. digno. puls. 3.  
Agathinus cum Erasistratijs multis diceret, pulsus contractionem mi-  
nimè sentiri posse, & Galenus ipse capitibus seqq. confiteatur, non  
cuiusvis pulsus posse contractionem sentiri; nec quorum possit, proin-  
de omnium esse claram. Cuius causam reddit, quod facile sentimus  
affectus corporis nostri, & deinde, quæ hos inducerant, obiecta mente  
percipimus; & ideo pressionem carnis nostræ, ab arteria pulsante fa-  
ctam, facile percipimus, ipsam verò recedentem non semper, nec in  
omnibus, & non nisi mentis magna attentione adhibita cognoscimus:  
Cur ergo negare actionem in manifestis, admittere in occultis? Si nullum  
in pulsu sentitur mouens, sed tantum motus ipse; & hic in diastole, quid  
aliud arguere, quàm propriam in ea se mouendi virtutem?

Ratio tertia.

Item: Neque quid se mouet localiter, quin spatium aliud ab eo, quod  
actu obtinet, occupetur: Sed hoc in dilatatione accidit, non in adstri-  
ctione: per eam enim amplior occupatur spatiofitas, per hanc minor,  
quæ in maiori actu continetur, cum minus in eadem re sit pars maioris:  
Ergo dilatatio verius motus est, & in ea impetus actionis elucet magis;  
constrictio autem potius cessatio ab actione est censenda, quàm secus.

Ratio quarta

Tandem: In cæteris cauis corporibus sola dilatatio veluti actio con-  
spicitur; constrictio autem sine vlla actione cognoscitur: Ergo sic, &  
in Corde. Cognoscitur antecedentis veritas in ore, in æsophago, in  
vesicæ collo, in vtero &c.: in his enim videmus ex seipsis, ac sine vlla  
vi dictas partes dilatatas constringi, dilatationem verò cum manifesta  
actione, quæ in voluntate quodammodo consistit, perfici, & exerceri.

Et equidem, vbi statuendum esset, alterum horum motuum esse quasi  
cessationem ab actu, vel, si sit motus vterque, esse vnum eorum reditum  
quendam spontaneum ad statum naturalem, vt volebant Veteres, vel  
coactum à re instante, vt in arterijs velle videntur Neoterici; mea sen-  
tentia potiores sunt rationes, quæ pro dilatatione, quàm quæ pro con-  
strictione videntur adductæ: Siquidam, vt dilateretur, & pulset arteria,  
virtus requiritur, vt constringatur, quælibet etsi languidissima, sufficit

Potiores  
videntur ra-  
tiones pro di-  
latione, quæ  
pro contra-  
ctione.

## CAPVT DECIMVMSEPTIMVM. 183

vis, & vbi valida sit virtus, valde dilatatur. si debilis, parum; constrictio-  
 tionis autem terminus idem semper est, dilatationi tamen necessario  
 respondens.

Neque hic obijciant mihi, aliam esse dilatationem arteriæ, aliam  
 Cordis: quia eandem esse, procul dubio patet tactui, & in sequentibus  
 probabitur: Sed & quatenus eadem numero non esset, eadem tamen spe-  
 cie erit verisimile, & sic valebit ratio.

Atuerò hanc opinionem vnà cum priori manifestè oppugnat *Gal. lib.*

„ 4. de diff. puls. cap. 2. , vbi ponit, Pulsum esse peculiare actionem præ-  
 „ cipue Cordis, deinde arteriarum, quæ distentione, & contractione  
 „ mouentur à facultate vitali, quo caloris natui mediocritas retineatur,  
 „ generetur autem in cerebro spiritus animalis ] Est quippe vnaquæ-  
 „ que pulsus partium actio propria Cordis, secundario autem, & per com-  
 „ municationem arteriarum, quæ tùm frigidus trahitur aer, tùm spiritus  
 cum sanguine ad omnia truditur membra, & si quæ fuligines adsunt,  
 foras pelluntur. Cuius quidem opinionis potiores rationes sunt huius-  
 modi; Et primò,

Quod siue dilatetur, siue constringatur Cor, in vtroque sit motus; cum  
 in vno maior cauitas, in altero minor sensibiliter efficiatur: Horum autem  
 motuum, vel vterque spontaneus est, ac à propria facultate moti corpo-  
 ris peractus, vel alter horum naturalis, alter coactus. Si primum, vterque  
 motus actio erit procul dubio. Si secundum, necesse est, in vno eorum  
 (nempe naturali) actionem elucescere, in coacto passionem: Sed hæc  
 incompatibilia sunt: Ergo primum. Et probatur hæc minor: quia ali-  
 ter actio, & passio in eodem subiecto, & eadem illius causa esset, quod  
 non dari, notum; cum idem, vt idem, & secundum idem non possit simul  
 agere, & pati. Et tamen sic in pulsu daretur, quod esset absurdum.  
 Forsitan quis dicet, non simul, sed alternatim in pulsu vigere actionem,  
 ac passionem, nimirum Cor in systole agere, in diastole pati, vel è con-  
 tra, & sic iterum ac iterum, donec à nece dissoluatur mutuus hic agendi,  
 & patiendi periodus: Verum enim verò, impossibilia hæc sunt: quia si  
 dilatio cordis à sanguine impulsio sit, cur inde sanguis ipse à corde  
 arctatur, ac pellitur? Et si hic arctatur, cur postmodum iterum insur-  
 git, Cor euincit, & ampliat? Adde quod, & ad hoc necesse esset, vt  
 aliud daretur membrum corde validius, & similiter quidem, sed con-  
 trario tempore pulsans, vt de corde respectu arteriarum censet Har-  
 ueius. Sed & hic iterum aliud requireretur illo validiore validius, con-  
 trarioq; motu motum, à quo, & illud moueri posset, & sic processus in  
 infinitum. Si verò dicatur, vtrunque quidem motum spontaneum esse,  
 sed in vno tantum actionem esse, velut in systole secundum Harueium,  
 vel secundum Asclepiadem in diastole; in altero autem nec actionem  
 nec passionem adesse; error est: quia vel motus ille est, vel quies; si is,  
 nullus motus sine mouente sit vel intrinseco, vel extrinseco, & sic actio,  
 vel passio necessario erit; si quies, non ergo erit motus, quod falsum.

Pulsus des-  
 criptio ex Gal.

Vtriusque pul-  
 sus partem  
 actionis esse  
 ratio prima.

Alia

Altera ad  
idem ratio.

Alia ratio est, quod vterque est eiusdem partis motus, alter alteri mutuo succedens ordinatè, æqualiter, eodem tempore, spatio peractus, mutuaq; ab inuicem quiete distinctus; quorum nihil esset, si vnus à facultate, alter à casu; vnus ab intrinseco, alter ab extrinseco; vnus ex se, alter ab alio esset: Nam non semper eodem modo quid ab alio afficitur; nec actio in alterum sic ordinata cadit; quin multoties tùm intensio, tùm tempore varietur, prout modo maior, modò minor agentis potentia, vel patientis resistentia inuenitur: At in pulsu sanorum conspicitur, dilatationi respondere constrictionem, tùm magnitudine, tùm frequentia, tùm celeritate. Et vt ratio declararetur ad cuiusvis intelligentiam, ponamus, Cor validissimum esse; tunc si sola constructio cordis actio est, manifestum, quod validè quidem, & vehementer constringetur, parùm verò dilatabitur, vtpotè validè aliorum impressioni obstans: si verò sola dilatatio actio eiusdem sit, validè quidem dilatabitur, molliter autem constringetur, vti decidit læ (quæ quandam redolentibus inbecillitate) repugnans. Contrarium dicis si Cor fuerit imbecillum nam in actione enervatum, in passione, vel decidit læ, promptum obseruabitur; Sicq; nullus rhythmus, nulla proportio inter diastolem, ac systolem, nulla; inter priorem, & posteriorem quietem seruabitur, cui tamen oppositum cognoscitur omne.

Quarta ratio  
ad idem.

Adde his, quod constructio, & dilatatio contrarij sunt motus: Ergo à contraria causa sunt: At si contraria causa est, ergo sub eodem genere posita systole secundum Herophilum, & Harucianos, à cordis facultate procedit, secundum Aselepiadem dilatatio. Igitur vtraque à facultate fiat, quæ essentialiter quidem, genereq; eadem est, nempe motiua, virtute autem, ac potestate contraria, nempe motus oppositos generans, & sic vterque horum motuum actio erit. Eandem autem genere esse facultatem, quæ oppositos motus in viuentē edat, patet; quia eisdem vtitur instrumentis, id est mīsculis, ac nervis in voluntarijs motibus, fibris autem in naturalibus: quæ tamen iisdem inter se oppositis vel figura, vel positu, rebus scilicet, obliquis, ac trasuersis; super oribus, inferioribus; dextris, sinistris; anterioribus, & posterioribus videntur, oppositos quoque motus edere nouit: Idem namque, & in cæteris motibus, sicuti & in sensibus esse videmus: eadem enim parte inspiramus, & expiramus; acutam, & grauē; altam, & submissam edimus vocem; claudimus, & aperimus os, oculos, vnum, vesicam; deglutimus, euomimus. Eodem sensorio calidum, & frigidum; humidum, & siccum percipimus, vti, & in cæteris sensibus apparet. Sed, & hoc in naturalibus actionibus fieri, concludit Gal. lib. 3. de nat. facul. cap. 13. Potissimum quia oppositio, quæ in similibus est motibus, ac perceptionibus, non intrinsecè; & per se, sed extrinsecè, & per accidens est, scilicet loco, seu latione, obiecto, & accidentalī alio modo opposita; itaut distamet abusuē vocetur contraria, nec incongruat ab eadem virtute dicto modo oppositas exerceri actiones. Quid igitur de corde dicemus? nūm hoc solum

vnicam

## CAPVT DECIMVMSEPTIVM. 135

unicam ex se tantum habebit actionem? Et, cum omnium nobilissimū sit, ad minora, quā cetera, valebit?

Amplius: Qui motus magis, & minus, intensius, & remissius sunt, vel à propria, vel ab aliena virtute, procedunt, secundum cuius tenorem variatur, & disponuntur: Sed huiusmodi in pulsus tūm diastole, tūm systole sunt: Ergo, vel à propria, vel ab aliena virtute promanant: Atqui non ab aliena; ergo à propria. Prior probatur: quia quæ, ut pura naturalia, vel concidunt, vel eleuantur, semper eodem tenore iuxta propriam gravitatem, vel leuitatem mouentur, nec vllō tempore (nisi ab externo, vel detineantur, vel incitentur) segnius, aut celerius: sic ergo, & in animalibus existimandum, cum Natura in omnibus eadem, & eodem modo se gerat. Minor tūm in Corde, tūm in arterijs manifesta est: experimur enim quotidie ob varios animi affectus, aut corporis dispositiones diuersas diuersè quoque tūm in systole, tūm in diastole circa temporis, ac intensiōis modum fieri motum.

Hoc nunc consilio, quod Cordis pulsus in genere non fiat ab aliena virtute, probatur ex eo, quod, cum Cor omnium membrorum sit validissimum, verisimile non est, vllam partem, aut aliam rem ipsum mouere, & euincere posse. Item quia exutum Cor, & a corpore euulsum, adhuc multoties vtroque motu mouetur per aliquod tempus, ut in superioribus quoque diximus; ex quo arguitur, non à sanguine ingrediente, non à nervo, non ab alio in summa, sed à sua ingenita vi moueri, ut optimè aduertit Galenus lib. 7. de anatom. administrat. cap. 8., & adnotat Galtrucechius in sua Physica partic. disputat. 2. cap. 5.

In specie autem probatur de dilatatione primum, quod ab aliena actione non proveniat, nec ab alio. Non à sanguine ingrediente, ut quidam vellent; primò quia Cordis dilatatio natura præcedit dictum introitum; ergo huius illa est causa, non è contra: causa enim præcedit, non consequitur effectum. Secundò quia ingressui obstant valvulæ, quæ in systole clauduntur, & si Cor sponte dilatetur, non aperiuntur, à sanguinis autem motu dilatari non possunt, si Cor contra agat. Tertiò quia si à sanguinis impetu dilatatio fieret, esset quid coactum, rerum naturalitati indecens; & inordinatum iuxta maiorem, vel minorem ipsius impetum, & maiorem, vel minorem alterius resistentiam. Quartò quia sanguinis mollities, & fluxibilitas non videtur posse corpus durum cogere ad dilatationem. Tandem quia ex se non mouetur sanguis.

Non à Caua impellente; quippe sic asserendum esset, Cauam Corde esse validiorem, quod nemo forsan dicet; Tum etiam, vel necesse erit, eam facere interpolatos impulsus, vel continuos: si interpolatus, ergo deberet, & ipsa, ut Cor, pulsare, sed contrario modo, nempe constringi, quando Cor dilatatur; quod à nomine vsque adhuc notum. Si continuos, nec Cor se poterit constringere, & ab impulsu præcauere; quia illi obstarent valvulæ, quæ aperiuntur in ipsum; & quid maius videtur

Quæritur ad  
idem ratio.

Pulsus non  
ab aliena, sed  
propria sit  
virtute.

Non ab aliena  
fieri probatur  
duobus  
rationibus.

Probat de  
dilatatione  
à  
quæ à sanguine  
fieri, non  
potest.

Nec à Caua  
impellente



Causa vna  
motus propè  
Cor non pro-  
prius, sed co-  
suetudineus.

dilatari, quàm dilatatum, teneri. Sed & hæc adesse falsam: Ergo nec à Caua continuè impellitur. Neque obijciant, Cauam propè Cor moueri: motus enim ille non pulsificus, non impulsuus, sed tremulus est; nec ipsi proprius, aut insitus, sed consuetudineus, & cordis motum sequens ob contactum: sic enim ex pectoris dilatactione, & constrictione mouentur in respiratione abdomen, collum, & reliqua adiacentia membra, & à Cordis pulsu mouetur mammilla sinistra; & ab arteriæ percussione cutis. Itaque cum proprius non sit, nec propriam arguit virtutem; multò minus validiorem suò Auctore.

Nec dilata-  
tio ob coinci-  
dentiam fit.

Nec verò dicendum, quod ex coincidentia, vt prætendunt nonnulli, illa proveniat dilatactio: implicat enim contradiccionem, quid dilatari, & concidere: concidere namque dicuntur, quæ dilatata se contrahunt, non quæ se iunguntur magis: conceditur autem ab Harueio, & omnibus, cordis ventriculos in diastole fieri latiores. Præterea cordis pulsus arteriarum pulsui respondet ex omnium voto: at hæ in diastole non dicuntur concidere, sed eleuari: ergo & sic Cor.

Nec in es fit  
reditus ad  
statum natu-  
ralem.

Item nec dicendum, Cor in diastole ad naturalem statum ex seipso redire, vt musculis accidit, vbi à constrictione laxantur: quia si sic esset, non daretur maior, vel minor dilatactio, sed semper eadem, vt de arterijs arguit *Gal. lib. de vsu puls. cap. 6.*, quod experientia, & euidentiæ repugnat: nam si status naturalis is est, qui motu cessante, & mortuo animali videtur, in viuorum diastole maior Cordis, arteriarumquæ sit dilatactio, & adhuc longè maior, si vel ex febre, vel ex alio corporis aut animi affectu calor augeatur, & finis vigeat.

Constric-  
tionem neque-  
si à virtute al-  
terius, proba-  
batur.

Nunc de constrictione, quod nec ipsa ab alieno mouente, seu agente fiat, probatur ex eo. quod, si sic esset, nil verisimilius Cor adstringeret, quàm adiacentia corpora: huiusmodi autem pulmo in primis est, quo nil in corpore, præter pulsifica instrumenta mobilius cernitur: Sed hunc posse Cor adstringere, somnium est: illius enim spongiositas, mollietisque Cordis autem stabilitas, ac durities huic repugnant credulitati. Dato autem, quod posset, id fieret in sui constrictione, quæ expirando accidit. Sed si sic esset, deberet expirationi systoles, inspirationi diastoles respondere, quod non fit; cum vni expirationi duæ saltem pulsus systoles, vni inspirationi duæ ad minus diastoles respondeant, & consequantur, vt quicuis in seipso carpi tactu potest experiri. Quid verò de arterijs dicemus? à quonam comprimuntur? à circumpositis partibus? nil mouet immotum? ex repercussione forsan? Carnis, cutisque mollietis repercutere nequit.

Eandè neque  
fieri ex con-  
cidentia, nec  
reditu ad sta-  
tum natura-  
lem.

Nec item dicendum cum Asclepiade, constrictionem siuè Cordis, siuè arteriarum esse, vel ex spontina parietum coincidentia, vel reditu ad naturalem statum; tum quia nec Cor, nec arteriæ, mortuo animali, in se concidunt adeo, vt altior in sinum cauitatis parietem contingat; cum tamen, validè pulsando, se contingant non raro; tum quia semper eodem modo se constringerent, quod sensui repugnat, cum sentiamus, à maiore

à maiore vi magis Cor constringi, à minore minus.

Tandem: eadem est ratio pulsus, ac respirationis: vtrunque enim idem finis (vt proprio dicetur capite), & idem mouendi modus per reciprocam dilatationem, & constrictionem: Sed in hac tam inspiratio, quam exspiratio à facultate sunt: Ergo, & in pulsu. Minor constat, cum eadem in vtraque respirationis parte (ni quid impediatur, aut alio distrahatur mens, & voluntas) temporis, intermissionis, & vehementiæ seruetur qualitas, quantitas, intensio.

Vtrunque  
pulsus parit  
esse actionē,  
ratio quina

His itaque visis, rationibusq; euidentibus probatis, reliquum nunc est, vt ad contrarias, tū primæ, tū secundæ opinionis rationes respondeamus. Ad primam igitur pro Harueio adductam rationem respondeo cum *Gal. 7. de anatom. administrat. 8., & 9.* Cor verè musculum non esse; cum non à voluntate eius regatur motus, vt ex eodem habetur *lib. 2. de motu muscul. cap. 5.* sed illi, vt dictum est, sit connaturalis, & ingenuus (à corpore enim auulsum adhuc pulsatur); item quia musculis alijs longè durior, compactiorq; cernitur eius substantia; ventriculos intus continet, ossibus non alligatur, tot nervosis propaginibus non exornatur, fibris verò omnigenis, contra ac plerique musculi, imbuitur, vt idem ait *Gal. 6. de vsu part. 8.* Ideo non valet similitudo motus huius cum illorum motibus, qui insuper non ordinati, ac perennes (vt insunt Cordi); sed voluntarij, & interrupti: non dilatantes, ac reciproce adstringentes, sed contrahentes, & elongantes; exceptis, orbiculatis quibusdam, vt æsophagi, ani &c., quos constringi, ac dilatari, conspiciamus, prout voluntas exigit, vel irritata insurgit. Ad Hippocratem autem, vbi Cor musculum vocauit, dicimus, illum id similitudinariè pronunciaffe, vt ex dictione illa (quidam) colligitur: differentiam verò annuiffe, dum dixit, non neruo quidem, sed carnis duritie musculum fortè esse; Et vbi musculus dicendum esset, illi peculiarem esse motum ingenuum, independentem, perennem, ab aliorumq; musculorum motibus dissidentem, Hippocrati non repugnat, qui nullibi contrarium affirmavit.

Respondetur  
ad primā  
Harueianam  
rationem.

Ad alteram dicitur, quod, dato etiam, per systolem sanguinem, vel spiritum a Corde in arterias expelli, tantundem tamen per diastolem ab eodem attrahi, dicendum est, siuè id ratione vacui euitandi, siuè ratione naturalis igneatis, quæ, vt lychnus oleum, nutrimentolum succum allicit; siuè ratione familiaritatis substantiæ, quæ à nutrienda parte appetitur, euenire, credatur: omnibus enim hisce modis, vel aliquo istorū Cor validissimè omnium trahere potest. Cum ergo non minus actio dicenda sit attractio, quam pulsio, iure vtrunque pulsus motum actionem nominabimus: monstratum enim est, non ingressui sanguinis Cordis dilatationem, sed huius dilatationi illius ingressum esse adscribendum. Quare non possum non mirari, peritissimum Deusingium, qui pluriès confirmauerat a Corde sanguinem ex toto corpore, Antiq; inuicem, allici, in huiusmodi descendisse sententiam, vt dilatationi (quæ attractionis

Respondetur  
ad secundā.

causa est) actionis nomen denegari.

Respondetur  
ad tertiam.

Ad tertiam dicitur, si constrictione ope fibrarum euenit, dilatationem ipsarum quoque ope perfici, vt aperuissimè commonstrat *Gal. 6. de usu part. 8.* vbi, quod rectis fibris, seu quæ secundum longitudinem disperguntur, tensis, cæteris verò otiantibus, dilatatio Cordis oriatur, e contra verò, his relaxatis, & quæ secundum latitudinem sunt, seu transuersis se contrahentibus, restrictio fiat, clarè ostendit.

Respondetur  
ad quartam.

Ad quartam respondeo, si Cor, vt opinatur Deusingius inducitur à turgescencia, & effervescentia sanguinis ad se coustringendum, & expellendum, eidem superuenientem defectum illud ad se dilatandum, vt nouum attrahat succum, inducere. Et sic si in vno motu agit, in alio nõ otiaur, si in hoc adest causa, in altero non deest. Veruntamen (sit autem obiter dictum) potius contraria, vel alia causa tùm dilatationis, tùm constrictionis ponenda est: si enim hi sunt motus præcipuè, vt innatum calidum ventiletur, moderetur, roboreturq; vt Galenus euidentissimè *lib. de usu puls.* concludit, manifestum est, ab effervescentia potius ad dilatationem Cor induci, vt aere sic attracto, refrigeretur; ad constrictionem verò à frigore inducto, quò calor continuetur. Id quod etiam ab effectibus caloris, cuius proprium videtur rarefacere, ac dilatare, sicuti frigoris densare, constringereq; potest rationabiliter suaderi. Et hoc idem apertè docuit *Aristot. lib. de respirat.* Resilitio (inquit) est facta obuiatio ad frigidi compulsionem: Pulsatio autem humidi calefacti inflatio. ¶ Vtunque sit, planum est, non deesse causam dilatationis, nec casu illam fieri, itaut Cordis actio dici non mereatur.

Respondetur  
ad primam  
pro Acclepiade  
restrictionem.

Veniens modò ad alias rationes, quæ solam dilatationem actionis nomine dignabantur, non minus promptum est ad eas respondere: quandoquidem, Si prima consideretur, facilis cadet responsio, si dixerimus, contractionem, & distensionem esse motus merè oppositos, quorum neutrum sine actione vel propria, vel aliena fieri, rationabile est: nec enim quid a contrario in contrarium sine mouente mouetur, quicquid sit de motibus, qui ab extremo ad medium, vel ab alieno ad proprium locum spontè etiam in inanimatis sunt (quos à natura tamen fieri, docet *Aristot.*) Pater autem, in pulsu vicissitudinarium fieri Cordis motum ab opposito ad oppositum: ergo non sine actione id fieri continget; quæ cū aliena esse non possit, vt monstratum est, remanet, vt propria statuatur. De reliquo non verum, quòd magis actionis proprium sit dilatare, quam constringere: nam si multa sine facultate motiua constringuntur, non minus multa si dilatantur. Imò si de inanimatis loquamur, videbimus multa in seipsa pressa, aut per vim constricta, quæ sine alterius ope facillimè aupliantur.

Respondetur  
ad secundam.

Si verò secunda, dicendum est, propositionem primam esse falsam, quia rei alicuius existentia siuè sensu, siuè ratione, siuè vtroque probetur, per hoc nec magis, nec minus acquirit, nec secundum hoc præeminentiam, vel humilitatem adipiscitur vllam. Pateat ergo Cordis constrictione

## CAPVT DECIMVMSEPTIMVM. 189

Ardio solis Anatomicis, solisq; pulsum obseruatoribus egregijs, non minus ob id aëtionis nomen merebitur alias nec coëtio, nec nutritio, nec aliæ id genus naturales operationes sensui incognitæ actiones dicendæ essent; quæ tamen excretionibus, quamuis sensatis vel hoc ipse, quia solo rationis lumine discernuntur, nobiliores censentur.

Si autem tertia, dicere possumus, corpus cauum, siuè dilatetur, siuè arctetur, spatium aliud à priori occupare, cum reuera aliud spatium sit illud cavitatis internum, in constrictione obtentum, aliud externum à dilatata superficie occupatum; & ideo in vtraque motione elucescere diuersæ spatiofitatis occupationem. Nec dicendum, minus spatium in maiori virtualiter contineri, cum vnū ab altero possit realiter distingui.

Respondetur ad tertium.

Tandem ad quartam respondetur, quamuis constrictio illarum partium videatur sine vlla aëtionem esse; reuera tamen, & veriozem, quam in dilatatione aëtionem musculorum in ea fieri, vt docet *Gal. 2. de motu muscul.* 8. vbi propriam illorum aëtionem constrictiōem, & retentionem nominat; dilatationem verò, & excretionem non nisi secundum accidens, quatenus scilicet ab aëtionem oriuntur. Et huius indicium manifestum hoc est, quod, ijs resolutis, excrementa inuoluntariè, & intempestiue profluunt. Quod si in egestionem, & mictionem videtur conatus, & vis aëtionis adesse, non illorum annularium musculorum opus huiusmodi est, sed aliorum epigastrij, ac abdominis, qui, cum diaphragmate contra præmentes, illos dilatari, & ab aëtionem desistere cogunt, vt ibidem legitur.

Respondetur ad quartam.

## CAPVT DECIMVM OCTAVVM.

*Quod eodem prorsus modo, ac tempore pulsant arteria, quo C. v.*

Simili autem modo, eodemq; prorsus tempore, quo Cor moueri arterias, simulque cum eo dilatari, sicuti, & constringi, quicquid Herastratæi, & Haruciani contradicant, certo certius est; idq; probant tum sensus, tum ratio. Et sensus quidem, quia, si tactu Cordis regio, & carpus simul tangantur, percipimus, vnicum, vniuocumq; esse amborum idem, prout & quiuis in seipso, vel sano, vel febricitante potest experiri. Hucusque consentiunt Neoterici, sed ulterius progrediendo dissentiunt, contententes, dum Cor pectus ferit, illius hunc esse systolem. Et hoc visu in primis innitentes probant: Cor enim viui animalis dissecti exuunt, aspiuntq; vel aspicere imaginantur, Cor, quando eleuatur, constringi, ac quodammodo elongari, itaut cuspis aliquantis per sursum retracta costas percutiat; sic ait Harueius, nec longè abit Deuilingius. Tactu etiam idem patefaciant: nam Cor ipsum scindentes, digitumq; imponentes, sentiunt tunc temporis digitum premi, & flaccescente corde, laxari.

Cor, & arteria eodem modo sensu probatur.

Neotericoꝝ obiectio.

Sed verò, his non obstantibus, priori assertioni insistendum; quia, si, Responderetur.

dum arteria eleuatur, percutitq; tangentem digitum dilatari eam; cum retrogreditur, demittiturq; , constringi, apud omnes in confesso est, cur non idem de Corde dicendum? Quod siue in ictu illo elongetur, vt Harueius putat, siue vndiquaque per latera dilatetur, vt nos cum *Gal.*, & pluribus autumamus, id nil facit, cum sufficiat, cavitatem tunc temporis capaciorem, vtcunque sit, fieri. Manifestum item, ad motus differentiam agnoscendam plus valere tactum, quam visum, qui faciliè ob obiecti distantiam, medij fugacitatem, & sensorij mobilitatem in subititis, ac minimis decipitur, multoq; magis, cum circa diuersa inter se comparanda, versatur obiecta, vt in casu nostro; dum enim oculus Cor aspiciat, arterias non videt, cum has intuetur, Cor subterfugit, dum vtrunque, neutri acies, neutri mens adhibetur; Quod de tactu minimè dicendum: per hunc enim, qui per vniuersum corpus dispergitur, & obiectu suo beneplacito apprehendit, proprius est vel identitatem, vel diuersitatem motus agnoscere. Hinc à tot Sapientissimis Viris nunc, & antea visa pulsatio Cordis, diuersimodè iudicata fuit, & iudicatur alijs scilicet cum Herophilo, Galeno, Vallesio, Vesallio &c. eodem prorsus modo, ac tempore vtraque corpora pulsare; alijs autem cum Erasistrato, Auicena, Harueio &c. diuerso pronunciantibus.

Neque primis obijciat quis, eos oculariter non obseruasse: nam (vt de cæteris reticeam) id omnium minimè est asserendum de Galeno, qui Cordis denudationem, viuo animali, exerceri docuit *lib. 7. de anatom. admin. cap. 12.*, quiq; speciatim eodem *lib. cap. 14.* dictam denudationem sine penetratione exercitam conducere perhibet, aduerendum, „ an quando Cor attolitur, thoracem feriat, pectoris ossis regionem accedens, an quo tēpore demittitur; Et an quando Cor attolitur, arteria „ submitatur, & quando Cor demittitur, ipsa attollatur; an ambo eodem tempore, & submittantur, & eleuentur. ] Vt propterea de illo verendum non sit, quin oculariter, & sedulo pluriès obseruauerit; optimè sciens, hanc, quæ etiam tunc temporis inter Erasistratæos, & Herophilanos agitabatur, controuersiam in Medicina agitari.

Quid ergo est, quod tam gloriabundi Neoterici, Autopsiam sibi fauere prædicant, aliosq; Autopsiæ expertes nominant? Suus cuique sensus, sua cuique mens, quæ multonès a vero, passionibus, hallucinata, aberrat; & quod peius est, qui viciosius sentiunt, in cæteros acerbius inuehuntur. Sed, & sani hominis contactus ex alio capite visus, tactuq; in dissecto corde adhibito præcellit, quod in illo naturaliter, in hoc omnino præter naturam, & per consequens vt plurimum inordinatè, confusè, conuulsuè, palpitante, saltuosè mouetur; ita ut difficillimum sit, in similibus, quid certi animaduerrere.

Proinde quiuis iudicet, an illi digiti immisso in Cor dissectum sit in talibus ambagibus æquus Iudex: cuique enim constat, sensibile corpus rem præter naturæ ordinem in se immissam vndique premere, quo a se illam expellat, vt ferè lignis quoque ipsis succedit, vbi adhuc viridia se-

Ad motus differentiam agnoscendam plus tactus quam visus, valet.

Sani hominis contactus Autopsiæ anatomice præcellit.

Digiti in Cor immisso æquus Iudex.

cantur,

## CAPVT DECIMVMOCTAVVM. 191

cantur, vel perforantur. Quid igitur de corde omnium sensibilibus arbitrandum? præter quod si in latitudine restringitur, in longitudine elongatur, vel si in hac decurtatur, in illa dilatatur.

Nec minus fallax ab huiusmodi anatomicis incisionibus sumitur indicium circa ipsiusmet Cordis solius motum in seipso consideratum; an scilicet pectus feriat, quando elongatur quodammodo, an verò quando decurtatur; rursusque an elongatio sit cum cavitatis restrictione, & decurtatio cum ampliacione, an verò è contra. Et huius quidem ambiguitatis causa est, quod Cor ob mortis terrorem, aut quod aliud animi, & corporis vehemens pathema, non pulsū, solum, sed & saltu simul non raro moueatur; itaut tunc duplici motus combinatione Cor moueri, vna videlicet ex diastole, & systole constante, altera ex saltu, & concidentia, iuste possit existimari. Et de saltu quidem annuit *Gal. lib. 7. de anatom. administr. cap. 14.* quando dixit, ni forcipe excipiat Cor, è digitis quandoque exire: Adde, & præter hos alios illi obuiare motus, nempe tremulum, & undosum, vt adnotat *Thom. Barthol. lib. 2. anatom. reform. cap. 6.* & palpitacionem, vt Alij. Quæ omnia arguunt, & meritò sequuntur summam Naturæ confusionem ex accelerato, & impetuoso interitu, in quo statu quicquam ordinatè, ac pacificè fieri, incredibile est, vt pluries inculcauimus. Præterea, cum os pectoris antèrius scissum auferatur, nec videre licet in quo motus modo Cor illud feriat.

Hinc est, quod varias, imò contrarias circa hunc articulum apud Auctores reperire est attestaciones. Erasistratus, quem in hoc sequuntur Mercatus, Harueius, Deusingius &c. (hic tamen non omnimodè), & Alij, tradit, Cor tunc pectus petere, cum elongatur, & circumquaque restringitur; Galenus è contra, quando ad basim retrahitur quidem, sed ampliatur vndique, vt & confirmat *Vesalt. lib. 6. de hum. corp. fabr. cap. 15.* Inter recentiores *Conring. lib. de sang. gen. & mot. cap. 36.* quamuis in verbis visus fuerit cum Harueio sentire in antecedenti capite, re tamen ab ipso, & à Gal. discedit: totus enim ibi est in ostendendo Cordis tunc itum fieri cum eius mucro versus basim retrahitur, & contrahitur vndique; præmissis his verbis, quæ non iniuria transcripsi. Nil dubitandum itaque est (inquit), expelli sanguinem in Aortam, quo tempore Cor sursum attollitur, adeoque hætenus benè vulgo doceri. Non verum tamen illud (vt inde vulgo, & ab Aristotelis quidam æuo creditum), Cordis sinum tunc ampliari, ac distendi: Verissimum enim est, quod primus Columbus docuit, sed post ipsum luculentius exposuit Harueius, vndique tum Cor contrahi, sinusque reddi angustiores. Ac contrahi quidem cordis mucronem ad basim, vel basim ad mucronem, plerique agnoscunt: sed interim dilatari sinus, censent, breuius enim reddi Cor, sed latius distendi ventriculis.

Eiusmodi ferè sensus est doctissima, omniq; vera laude dignissima Bartholomei Torriani Lectoris Taurinensis Excellentissimi Epistola ad me familiariter transmissa, in qua sic me de experimentis suis com-

Fallax anatomicus Cordis motus.

Contrarie Auctori de illo attestaciones.



„ monefecit : Non hic moror ( ait ) Harueum opinantem, Cor in sy-  
 „ le prolongatione & prolongatione ferire. Oculis hoc totum concedo  
 „ meis. Aperto canis pectore, & spogliato Corde, sollicitè eius Anti-  
 „ strophen meditor. In systole duo obferuo, arctari Cor penitus secun-  
 „ dum omnes dimensiones, & subsultare totum eius corpus adeo, vt in  
 „ saltu reflexa cuspidis pectus offundat. In diastole reponitur in suo situ  
 „ conquiescens, & secundum omnes dimensiones sensibilibiter amplia-  
 „ tum. JApud Deusingium ex aduerso videre est quendam enunciaffe,  
 „ Cor tunc temporis decurtari, extrinsecusq; ampliari secundum latitudi-  
 „ nem; at ex illa ampliatione parietum etiam intro facta sinus arctari;  
 „ Cuius farinæ, & illa Bartholini assertio est, qua loco citato palam de-  
 „ scribit, imò & apta figura delineat, Cordis ictum tunc fieri, quando Cor  
 „ ad basim retrahitur, dilataturq; & tuberefcit in latitudine; quo tempore  
 „ Cor intrinsecus arctari, & sic systolem fieri autumat; in hoc Galeno,  
 „ & in omnibus cæteris Auctoribus repugnans. Et sic in eiusdem Cordis  
 „ elongatione ventriculos intrinsecus dilatari, sanguinem recipere, &  
 „ diastole perfici, comprobatur. Sentias igitur circa hoc quicquid velis, &  
 „ omni ex parte Assertorum publicum inuenies, & sua quæque Autopsia  
 „ nitentem.

Contra  
 Neotericos  
 vocatam Au-  
 topfiam de-  
 clamatio.

Et hæc illa Autopsia est, & sensata fides, cui tantopere quidam Ana-  
 tomici confidentes, plurima à Veteribus compaginata dogmata inter-  
 uoluere affectent; ex qua tamen nil certi, vt ostensum est, circa Cordis  
 motum, qui a quibusdam non incongruè. Euripi motui æquiparatur,  
 haberi potest, siuè varij perlegantur Authores, siuè oculariter omnia  
 inspiciantur.

Quid igitur vetat, qui putant alios deceptos, decipi ipsos? Ne ergo  
 piaculum tam grande quis existimet, si ab Harueiano sensu recedentes,  
 ad aliorum sensum, qui rationi inhæreat magis, properamus, Galenoq;  
 & Vesallio credentes, arbitramur, Cor, cum pectus percutit, ampliari,  
 non extra tantum, sed & intus, & diastolem esse: cum pro dilatatione  
 exteriori tot etiam Neotericos attestantes habeamus, pro interiori non  
 sensum solum, & Harueium ipsum, qui libenter admittit, cum Cor de-  
 curtatur, diastolem fieri ( solummodo falsus in eo, quod tunc pectus  
 attingi scripserit, cum elongatur ); sed & rationem, quæ ab exteriori  
 dilatatione interiorum arguit; & per quam cuique suaderi potest, Cor  
 pectoris ossi accessurum magis, si circum, & præcipuè versus anteriora  
 dilatetur, ni. decurtatione obstante, quæ ab infra recessum arguit; &  
 e contra ab eo recessurum, si angustetur, nil elongatione iuuante, quæ  
 non exterius, sed inferius videretur accessum paritura.

Cor, & arte-  
 rias eodem  
 moueri mo-  
 do authori-  
 tate proba-  
 tur.

Quo confito, constat quoque sensibilibiter, Cor tunc dilatari, cum ar-  
 teriæ dilatantur, arctari, cum arctantur; In qua assertionem non solum  
 Authores habemus Herophilum, Galenumq; cum cæteris Græcis ho-  
 rum Affectis, sed & inter Posteriores Valsesium lib. 3. *contr. Med. cap.*  
*3. Lud. Mercatum lib. 1. de puls. tract. 2.* ( licet hic opinetur, non Cor, sed

Aortam

## CAPVT DECIMVM OCTAVVM. 193

Aortam exterius pulfantem sentiri), Andream Laurentium *lib. 9. quæst.*  
 10. Vulcherum Coiterum *obseruat. anatom. pag. 124.*, quos ambos citat  
*Conring. cap. 35.*

Et eundem ratio sensui prædicto ite comes: siquidem Quod ab eodē  
 facultatis actu procedit, idem, & omnino simile esse debet: Sed arteria-  
 rum motus ab eodem actu facultatis, quo Cordis motus procedit: Ergo,  
 & idem, & omnino similis esse debet. Maior de se patet: Eadem enim  
 facultas non potest contrarios actus simul, & eodem tempore exercere;  
 quod esset, si quo tempore Cor constringitur, eo dilatarentur arteriæ, &  
 e contra. Minor probatur; quia motus Cordis, & artiarum simulta-  
 neus est per totum corpus, & tum in magnitudine, tum in crebritate,  
 tum in celeritate, ni quid præter naturam obstat, omnino idem: ideo, &  
 ab eadem omnino causa provenire necesse est: idem namque effectus  
 eandem causam arguit.

*Cor, & arte-  
 rias eodem  
 modo pulsa-  
 re, ratio pec-  
 ma.*

Altera ratio à Mercato adducitur hoc modò: Si arterias non vi pro-  
 pria, sed à Corde distributa dilatari, atque constringi, verum est, & re-  
 vera existit, nequit profectò intellectus capere, qua ratione Cor se dila-  
 tans possit influere virtutem constringentem, seq; constringens dilatan-  
 tem. A corde autem in arterias influere facultatem, constat, quia liga-  
 ta arteria, versus Cor pulsat, versus extrema otiaitur.

*Ratio secun-  
 da.*

Sed fortius: Idem utriusque Cordis ventriculi motus. Hoc stante,  
 si cavitates ventriculorum in diastole dilatantur, quomodo simul non  
 dilatabuntur oscula in ipsis implantata? si verò oscula, cur non vasa  
 ipsis continuata? Idem de systole dic: si enim Cor constringitur, quo-  
 modo non simul constringuntur ipsius foramina? Si verò hæc ardean-  
 tur, quomodo dilatabuntur ipsorum continuati ductus? Et quidem in  
 dilataatione cavitatis debere oscula in ipsam penetrantia quoque dilatari,  
 & ex aduerso in illius adstrictione eadem constringi, omnis lex necessita-  
 tis suadet, nisi forsitan quis imaginetur, crumenarijs plicis Cordis ventri-  
 culos gaudere, itaut tum dilatari, tum constringi citra osculorum con-  
 tactum possint.

*Ratio tertiu*

Probatur idem exemplo ab alijs externis moribus sumpto: Nam eo-  
 dem modo lo, quo mobile, movetur, & mouens, & quo mouens, movetur,  
 & mobile, siuè sursum, siuè deorsum, siuè dextrorsum, siuè sinistrorsum,  
 siuè an.e. siuè retro quid moveatur (intellige autem id de motu à mo-  
 uente intento: nam si de eo, qui per accidens succedit, loquamur, fieri  
 potest, vt quid moveatur contrario modo ei, quo aliud movet, vt si ar-  
 cum quis tendat, ac retrahat, ex qua retractione eiaculario provenit; si  
 quis iaciat sursum lapidem, qui deorsum postea cadat.) Cor autem ar-  
 terias mouere sicuti verissimum est, ita non mouere per accidens indicat  
 æqualitas utriusque motus, quæ in accidentarijs moribus non servatur.  
 Idem, & in Politicis accidit: quales enim Principes, tales solent esse  
 Ciues, &, vt alius dixit, Regis Ad exemplum totus componitur Orbis.  
 Quænam verò deformitas, si cum Rex antorsum, retrorsum Proceres,

*Idem eundem-  
 plo probatur*

cum is retro, hi graderentur ante?

Obijetur  
contra sen-  
sum addu-  
ctum fallaciā

Obiectioni  
prima respo-  
ditur.

Responso  
secunda.

Responso  
tertia.

Obijetur  
contra ratio-  
nes.  
Vollitur ob-  
iectio.

Hiscæ autem rationibus obuiam eunt Neoterici. Et primò quoad sensum contra illud dictum, quod in dissectis animalibus Cor præter naturam pulsat, opponunt Galenum, qui 7. de anat. administrat. 12. iam cit. ait, Corde denudato, ipsius functiones posse seruari incolumes, Respondetur, primò, nil ijs hanc prodesse authoritatem, qui ipsi Authori nil in rei essentia deferunt. Testis autem ab aliquo proditus, si contra producentem definiat, irreuocabiliter concludit. Stetur ergo Ei, Cordis actiones seruari incolumes, cum hoc per Eundem Cor simul cum arterijs dilatabitur, & constringetur; Alioqui si in hoc per Eos non bene dixit, nec in altero pro ijs credendum: non enim authoritas vnius dimidianda. Respondetur secundò, ex eodem Gal. ibi, & cap. 14 non in omni Cordis denudatione eius seruari functiones, sed in ea tantum, quæ sit citra pectoris penetrationem, cum alioqui, si pectus penetraretur, & introspicientes membranæ diuellantur, voce, ac respiratione priuatum animal suffocetur, & in alia symptomata incidat; inter quæ optimè enarrata concurrere, cuiuslibet consideranti, & experienti notum erit. Additur tertio, incolumes seruari functiones sic intelligendum esse, ac si diceret non emori, non deficere statim. Alioqui tum Cor, vt sanum, pulsare commodè, ordinatè, æqualiter, dicat, quicquid illic velit Galenus, minime sic nudè intelligendus est; cum in lypothimias, syncope, furores, inflammationes aliaq; animi, & corporis pathemata incidant huiusmodi laniata corpora, à quibus quantum pulsus immutentur, ab eodem traditur libris de caus. puls. & alibi.

Quoad rationes opponunt, non ab eadem facultate arterias, qua Cor, moueri, neque à mutuata, sed solummodò quia à pulsante Corde sanguine, ac spiritu replentur, eas dilatari, & inde concidere. Verumtamen isthæc nihil obnubilant primò, quia causa adducta inutilis est, vt monstrabitur cap. sequenti. Secundò quia etiam si ea daretur, nihilominus simul constringi Cor, & arterias esset necesse; cum dilatationem præcedere debeat introitus replentis corporis, hunc pulsio impellentis, hanc eiusdem constrictio; quæ ideo simul cum arteriarum constrictione cadet. Quod si quis dicat, hæc opera sola ratione, non re separari, hoc falsum; & vbi in breui cauitate à sensu non distinguantur, sic non est in longa, & multiformi, vt est omnium arteriarum processus: eo enim tempore, quo ab impulso corpore dilatantur arteriæ, iam Cor vacuum alium succum attrahit, vt iterum subito impellat; & sic nihilominus dilatantur simul. Et hic quidem conceptus libenter Galeno. refertur, cuius elocutio 4. de diff. puls. 2. talis est: Simul itaque fieri vtrinq; est necesse, distentionem, & repletionem earum, verum alteram antecedere alteri rationem causæ obtinentem, in corde distentionem, repletionem in arterijs, vt cernitur, & in externis rebus. Folles fabrorum, quia distenduntur, proinde replentur; Sacci, culci, vtres, quod impleantur, idcirco distenduntur. 3. tertio quia dilatationem

## CAPVT DECIMVM OCTAVVM. 193

latationem sequens constrictio vel provenit ex arteriarum actione, vel ex simplici coincidentia; non ex hac, quia, si irruens sanguis potuit eas dilatare iacentes, multò magis dilatatas in dilatatione retinebit: si verò ex actione, iam intentum obinetur: quia non ex propria, vt omnes consentunt: ergo ex mutuata; & sic ratio persistit, Cor se dilatans alia constrictioem, & se constringens dilatationem non posse impartiri.

Similiter ad exemplum facilissima illorum obiectio est exceptio eidem met per Nos addita: Cor enim dicunt non intentionaliter, siue per se arterias dilatare, sed hoc per accidens sequi ex impulso spiritu, ac sanguine: Sed verò ex ijsdem adductis hæc quoque eliditur obiectio; & cum hoc maxime, quod dilatio in toto arterioso genere simultanea, equalis, & ordinata est, ex quo non accidentarium opus vnquam constituitur; nec violentum, quæ inordinationem, & inæqualitatem quandam semper includunt.

Sed verò non sine aliqua ratione adducti Neoterici sunt in huiusmodi Erasistrati sententia. Et præcipua quidem, à Vallesio, & Mercato citatis locis Partis vice adducta, illa est, desumpta ab vfu pulsus, qui est, vt viuificos spiritus, ac sanguinem à Corde in arterias depulsos ad membra deuehat: Ratio ergo huiusmodi est: Cor (inquiunt), & arteriæ ex Galeni, & Affectarum sententia, dilatatione trahunt constrictioem expellunt: Sed non possunt simul ambo trahere: quia, Corde ab arterijs trahente, & arterijs à Corde, mutua tractione impediuntur: Hanc verò friuolam ibidem differtissime vterque docet Auctor: Primus enim clarè ostendit, neque Cor arterijs, neque arterias Cordi impedimento esse, quin aerem, ac spiritum per foraminula quæque conuolantes, & à coniugibus venis, & per capita arteriarum, sicuti, & per fibras sanguinem pro sui indigentia trahant; maxime cum omnia simul consentiant, & ab omnibus recipere, & ad omnia demandare possint. Addit his Mercatus ex Gal., dum cor dilatatur, membranalus Aortæ osculo ad natus claudi, dum verò constringitur, eas conuiue, vt ideo facilius sit, arterias à Corde trahere, quam Cor ab ipsis; tùm & in constrictioem Cor in ipsas aliquòd impellere: nihil enim vetat, eas, se constringendo, expellere ad oscula, & quid impulsu excipere; cum sua quædam non desit arterijs naturalis cavitatis, quæ etiam in cadaueribus conspicitur.

Alias quoque pro iisdem adiungit rationes Mercatus; quas tamen lucidissime dissoluit, vt mihi opus non sit plura cumulare.

Obijciunt ad exemplum, sed in eadem.

Pro opinione opposita ratio.

Eiusdem dissolutorio ex Vallesio, & Mercato.

## CAPVT DECIMVM NONVM.

*Quod non ob sanguinis à Corde factam propulsionem arteriæ pulsantes dilatentur.*

**I** Vñ nimis conqueritur Franciscus Vallesius de Scriptoribus ijs, qui iam diu à Galeno agitata, & gloriòse euictas controuersias, frustra

Artis studiosos defatigantes, innouant, varijsq; argutijs pacatas interturbant. Sic ille *lib. 3. controu. Med. cap. 3.* Inter huiusmodi Scriptores meritò reponendum cenſeo doctiſſimum alioqui Virum Harueium Archiatrum Anglum, qui inter cæteras veterum diſſenſiones has de pulſum eſſentia, uſu, & cauſis in priſtinum reuocauit. Is igitur (vt de preſenti loquar articulo) cum animaduertiſſet, poſt Hippocratis tempora duas circa concordiam pulſus Cordis, & arteriarum controuerſias non incelebres inſurrexiſſe, vnam ſcilicet circa modum, tempuſq; pulſationis, alteram verò circa ipſius cauſam; in quarum prima contra Hippocratis, ac Herophili dogmata (vt reſert *Gal. lib. de uſu pulſi. 4., & 4. de diſſ. pulſi. 6.*) Eraſiſtratus ſtatuebat, quo tempore Cor conſtringitur, artèriæ dilatari &c. vt dictum eſt capite antecedenti: in altera verò contra Herophilianos ipſos, (quibus cum in hoc ſenſit Galenus) credidit, & docuit, hoc ideo dilatari artèrias, quia à Corde ſpiritus in eas ſubito irruens diſtendit cauitatem, quæ poſtmodum ex propria concidentia, aut virtute conſtringitur; Huic fatiſcenti, & veluti ſepultæ opinionioni ſeſe patrocinantem addidit, & rationi iungens Autopſiam, in plurimis Galeni gloriam obſcurare feſtinauit; ſolummodò ab Eraſiſtrato diſſidens, quod non ſpiritus irruentem, ſed ſanguinem implentem artèrias attollere, ſenſit, & erudiuit. Sicq; per hos non quia artèriæ dilatentur, ideo attrahunt, & opplentur, ſed quia opplentur, ideo dilatantur; prorſus contra Galeni ſententiam, qua decernitur, attolli artèrias, virtute ijs à Corde præſtita. Quod ergo non à replente ſanguine, ſpirituuè illæ dilatentur, probatur primò ex ſupra probatis in duobus proximis capitibus.

Prima ratio  
ab eſſentia  
pulſus.

Nam, ſi verum eſt, vtranque pulſus partem eſſe actionem tùm Cordis, tùm artèriarum, non erit verum, quod à replente corpore dilatentur: ſic enim non actio, ſed paſſio eſſet diaſtole.

Secunda ratio  
a pulſus  
modo.

Probatur ſecundò, quod non ſuccedaneus, vel vndofus, ſed vnicus, ſiue ſimultaneus eſt omnium artèriarum motus ad pedes uſque: eodem namque momento, quo in temporibus, in carpo, in peſtore, & pedibus pulſat, vt ambabus manibus binas tangenti partes innotefcit. Et hoc eſſe non poſſet, ſi à replente corpore fieret eleuatio: qui enim poſſet replens ſuccus ſic ſubito à corde ad pedes, ad manus, ad verticem per tot tubulorum ambages conuolare, quin interim, dum Aorta attollitur, adhuc cætere iaceant adſtriſtæ, & dum hæ dilatantur, illa non concidat, aut vi conſtringatur? nullum ſpatium in natura pertranſitur ſine tempore.

Tertia ratio  
a quantitate  
requiſita ſan  
guinis.

Sed demus hoc poſſe fieri, addita artèriarum ipſarum cooperatione, vt ait V Vallæus; hoc tamen redarguit præter ſuperandi (ſpatij) diſtantiam, quantitas corporis, quæ requireretur: Etenim, ſi vel tactus, vel viſus adhibeatur; iudex, clarum eſt, artèrias cauitate ſua ſaltem tertia parte capaciores in dilataſione fieri, quàm antea in conſtriſtione eſſent: Demus ergo, in ijs omnibus conſtriſtis (nec enim adeo naturaliter conſtringuntur,

stringuntur, quin etiam post constrictionem naturalis aliqua cauitas remaneat, vt docet *Valles. cit. lib. 3. cap. 2. ex doctrina Gal. lib. an sang in art. sit cap. 3. & de vsu puls. cap. 6.* ) libram vnā sanguinis retineri, si à sanguine dilatandæ sunt, semilibra ipsius requiretur. At quomodo quantitas hæc per Aortam à Corde ictu vno euolabit? & quomodo, & si tota Cordis cauitas exinaniantur (quod non fit), sufficiet ad tantam arteriarum omnium auctam cauitatem implendam? Et hæc contra Harueium. Contra Erasistratum idem valet argumentum: Nam qui potest tanta spirituum copia à cordis sinistro ventriculo paululum constricto (vel etiam prorsus inanito) ex sufflari, quæ valeat omnes inflare arterias? Res clarior est, quàm possit, ac debeat in dubium euocari. Non ergo à replente corpore dilatantur; sed quidem dilatantur, per attractionem sanguinis, spirituum replentur, non à Cordis sinu solo, sed à toto ambitu, cauitatibus, venisq; per earum oscula, & crebras anastomoses, attracto. Illa verò insuper arteriarum cooperatio (nam non admittitur), vel propria arteriarum virtus est, vel à Corde influit. non primum: quia ligata arteria, statim trans ligaturam pulsare desinit. non secundum: quia Cor se constringens (vt Hi supponunt) non potest dilationem imprimere, vt dictum est.

Facit etiam illud Galeni experimentum, quo *lib. an sang. in art. sit cap. 8.* probat, non ex influxu spirituum (multò ergo minus sanguinis) per arteriarum cauitatem, cordis impulsu, pulsus fieri; sed ex virtute à Corde ipso (sicuti à cerebro per nervos in musculos contingit) per illarum tunicas influente; Illustratione quadam, prout doctissimè concludit *Valles. cit. cap. 2. ad finem*. Scindit autem ille per longum arteriam, & inde calamum immittit, vel æneam fistulam sic adaptatam, vt vulnus obturetur, & sanguinis profluvium inhibeatur; quamdiu autem ita se habere arteriam, conspicias, tamdiu torā pulsantem intuebere; vbi verò circumducto laqueo, arteriæ tunicam circa calamum astrinxeris, tum, licet sanguis, & spiritus per calami cauitatem ad fines arteriæ similiter comportatur, non tamen arteriam vltra laqueum pulsare videbis. Quod si ob eam causam pulsarent arteriæ, certè earum partes, quæ vltra laqueum sunt ad extremum vsque pulsarent. ]

Facit quoque sensibile aliud experimentum in Corde ipso, cui, à pe-  
 ctore euulso, Aortæ; seiuncto, per aliquod tempus durat pulsatio, quod non esset; si ad hanc necessariò sanguis requireretur. Pro arterijs autē ligetur vena arterialis, per quam volunt, in sinistrum Cordis ventriculum sanguinem deriuari, & nihilominus, dum Cor pulsauerit, & Aortæ propages pulsabunt: non ergo sanguinem pulsus earum efficere, sed virtutem à Corde manantem, iure asserendum venit.

Addantur his incongruentia similis violentiæ in naturalibus, animatis; viuentibusq; corporibus, quæ se vndique mouent, aluntur; tūm frustranea, quæ hinc esset, tot fibrarum textura; tūm superfluitas similis sanguinis influxus, ex quo cogatur Cor, vt sufficiat, spontè datum repetere

Quarta ratio  
ab experimen-  
to.

Aliud experi-  
mentum.

Quarta ratio  
ab incongrua



petere, & partes ferè nauseabundæ prodiga manu ad se demandata remittere.

*Scilicet ratio à  
rhythmo.*

Nec parum in idem contribuit rhythmus ille, siuè proportio, quæ inter diastolem, systolem, & perisystolem obseruatur, quæq; non adesset, si ob sanguinis replentis impetum arteriæ dilatarentur: citius enim, ac vehementius diastoles fieret, vt quæ a violentia esset, quàm systoles, quæ à natura; vel e contra, vt cap. 17. fuit ostensum.

*Contra pri-  
mam rationem  
obijciunt.*

Verum contra has rationes insurgent Contrarij, vel quis pro ijs poterit obijcere, siuè respondere; Et ad primam, adhuc non constare, dilationem arteriarum illarum esse actionem, cum argumenta proposita de Corde concludant, non de arterijs, quæ non propria, sed Cordis virtute mouentur, vt ideo passio potius dicenda sit. Redicitur autem, quod, quamuis rationes propositæ principaliter de Corde concludant, consequenter tamen, & de arterijs, quas ab eadem virtute, eodemq; prorsus modo, ac rhythmo moueri, monstratum est: Neque enim Cor ad arteriarum pulsus efficienter concurrat, sed sola participatione, & influxu virtutis: siuè autem quid ingenita, siuè sibi impartita moueatur, meritò motus ille illius actio dicitur; vt de musculis patet, quorum motus, quamuis à cerebro sibi per nervos exporrigatur illius facultas, non immeritò eorum actio dicitur. Et sic in definitione pulsus benè Galenus se gessit, dum illum actionem primò cordis, & deinde arteriarum dixit, prout in superiori capite tetigimus.

*Ad secundam  
rationem  
obijciunt.*

Contra secundam dicunt, huiusmodi simultaneum à cordis impulsu arteriarum motum non esse impossibilem, cum similis videatur in alijs exterioribus. Itaque adducebant exemplum trabis, quæ in vno capite tacta, in altero statim respondet. Si quis etiam chyrotecam inflat, videbimus, eodem tempore omnes digitos inflari, eodem submitti. Idem de sclopi ictu, qui scopum statim attingit. Assumat etiam quis tubum aliquem, qui in mille alios sit deuaticatus, & supponatur, adaptari in eius osculo vas aliquod, ex quo, vt in clysteri, intrudatur in illum succus, & videbimus, ad vnicum capitis impulsus ex omnium finibus eodem

*Ad eam res-  
pondetur.*

prorsus tempore proflire, prout in aquæ varijs lufibus experiri quis potest. Sed nimis euident ad hæc omnia patet responsio. Et sic ad prima duo iam per Deusingium, & alios satisfactum, cum videatur tempus inter capitis, & extremitatis ictum manifestè ad osculum intercedere. Et quamquam ex repentina sclopi ictu multoties fallatur sensus, non tamen lyncea fallitur ratio, in interstitio admittendo! vnde clara est venatorum quotidiana obseruatio, qua si euntis animalis caput ferire audent, ultra conspiciunt; si pedes, caput oculis proponunt; quod multò magis in nostro casu valet, in quo per tot gyros, mæandros, & reductus arteriarum peruadere ictus debet. Exemplum verò tubuli à Deusingio, & Plempio propositum minus cæteris habet consistentiæ: Etenim quamuis detur (quod non potest tamen ob infinitas propemodùm arteriarum germinationes concipi) vnico Aortæ premittu omnia arte-  
riarum

riarum capita simul succum effundere, id intelligeretur primò, si plenæ omnes remanerent tubi ramificationes, quia sic tactus tubi in principio fini illius simul responderet: At si tubus vbique concidat, vt arteriæ, & Aorta simul in systole faciant, quomodo concipiemus, ex propulsu vnus oris ad fines omnes vnico contextu peruenire citra cuiusdam successiue inunlationis speciem? intelligeretur secundò de simplici succi per extremitates profusione, non de eleuatione, & subsidencia tubulorum, quæ in Pulsu requiruntur, & corpus implens ideo exigunt: contrarium verò constat in ludicris aquæ proflitionibus, quibus ductus præseunt stabiles, & immoti, non, vt pulsui, molles, ac subsidentes.

Ad tertiam dicunt, sanguinem rarefieri, & in spiritû abeuntem, valde dilatari: Sed hoc contra Harucium est, qui spirituum existentiam, vel omnino negat, vel omnino à sanguine inseparabilem supponit. Sed & impossibilis similis in spirituosam ampullositatem abitio: nam vel sanguis abit in spiritus in ipso Cordis ventriculo, & sic non maior ab ipso poterit impleri cauitas, quàm sit ipse ventriculus cuius cauitas respectu omnium arteriarum cauitatis minima est; vel in ipsis arterijs, & sic illæ calidiores Corde ipso supponentur, quod non est. Nec sic subita substantiæ immutatio in naturalibus datur, vt ex sanguine spiritus, ex spiritu iterum sanguis oculi ictu fiat, & sic non sanguis, sed spiritus ad membra ferentur, quod contra circulationem est.

Ad experimentum Galeni opponunt, illud practicatu vel impossibile, vel difficillimum saltèm. Addunt, citra ligaturam coque, si gossipio obtureretur, itaut sanguis, ac spiritûs transire non possint, vltra ipsam obturationem pullum cessare: Atvero ad primam obiectionem dicimus, ob actionis, & experimenti difficultatem non tolli illius veritatem, ac vim, quas tot alij Anatomei iustè admiserunt, & admittunt. non ideo enim quia vnus nequeat, vel nesciat, de omnibus, & cæteris idem dicendum. Ad secundam dicimus, Improportionatum esse experimentum hoc ad primum: nam in illo Galeni, arteriæ parietes à naturali suo situ per calami intromissionem non dimouentur, & ideo non ligata, in suo pulsu durat, non ligata desinit: At si intrudatur gossipium, si modò debet sanguini, ac spiritui via omninò intercipi debent quoque parietes violenter dilatari, & extendi, quæ tunica rupta expressio, & extensio idem, quod ligatura operatur; vt neruis accidit, qui non à ligatura sola, sed & à tumore, vel ossea compressione, vel extensione, sua illustratione priuantur. Non ergo vnum alteri æquipollet experimentum.

Ad rationem verò quintam dicunt, incongrua multa nobis videri, quæ Natura non currat; & sunt ab ea multa, quorum ratio nobis ignota est. Sed inutilis hæc responsio, vbi de quæstione an sit differitur, & disputatur. Constito enim, aliquid à Natura fieri, congruentia omnis Naturæ voluntati, & potentiæ remittenda, &, vbi capax iudicium hominis sit, facile illam propria ex causa congruentem inueniet. At vbi de Naturæ actu ambigitur, semper de eo perfectius, & congruentius præsumendû, sic

Obiectio contra tertiam tollitur.

Obiectio ad Gal. experimentum. Altera obiectio. Tollitur prior.

Tollitur secunda.

Obiectio contra quintam rationem tollitur.

Obiectio ad  
sextam tolli-  
tur.

Harueiana  
ratio adduc-  
tur, & solui-  
tur.

fic illius suiq; primi Auctoris summa sapientia, & prouidentia distante.  
Ad sextam tandem dicit *Plempius munit. fund. sect. 6. cap. 5.* rhytmum  
illum non perferri in pulsu: Sed ad hoc redicere sufficit, quod, si ille,  
vel quis alius se cum Galeno exercuerit industriose circa pulsum co-  
gnitionem, illum percipiet, sicuti & Valesius, & Mercatus, & Massaria,  
& alij præclari Viri iam percipere, & etiam nam percipiunt.

Contra hæc autem omnia videtur esse ille sanguinis exitus cum sal-  
tu, qui singulo ictu à vulnerata arteria, & sic in diastole prodit, qui ma-  
nifestum Cordis impulsu arguit, quiq; non videretur fieri posse, si dila-  
tando attraherent. Huic tamen obiectioni iam alias satisfactum est;  
Sed, & hic iuuat repetere primò, non satis constare, an in diastole, ac  
verò in systole huiusmodi fiat sanguinis eiectio: quia tam paucum  
temporis spatium inter duos hos motus intercedit, vt difficillimè à sensu  
possit distingui, an in vno, an in altero fiat; & si rationi standum esset,  
potius quidem in systole, deberet illa sanguinis eructatio fieri, si verum  
est, quod partes, se constringendo, impellant, & dilatando recipient  
(quamquam nec defuere, qui cum Archigene opinabantur, arterias se  
constringendo repleri, & dilatando euacuari; exemplo oris, & narium,  
quæ dum spiritum attrahunt, videntur constringi; sed hoc perperam, vt  
ostendit *Gal. lib. de vsu puls. cap. 4.*) vt in vulnerato pectore accidit, iuxta  
eiusdem *Galeni placitum lib. 8. de anatom. administr. 3.* secundò dicitur, si  
illud verum sit, vt aduersò supponitur, arteriam, cum integra sit, trahere,  
quidem in se ex suis naturalibus osculis, & sic se dilatando: at non à lace-  
rata parte, quæ contento, & ob spiritum salienti sanguini, adiuncta, inuita,  
remittit. Cum ergo in diastole vulnus quoque dilaretur, sit, vt tunc spi-  
ritoso, fugaciq; sanguini exitus pateat, sicuti in systole illud constringi-  
tur, & hic retinetur.

## CAPVT VIGESIMVM.

*Quod idem sit tum pulsus, tum respirationis vsus, & is non ad sanguinem  
circulariter vehendum.*

**S**Vperfluum videretur, huiusmodi disputationis primò agitare mem-  
brum, si ad vnguem ea, quæ de eodem argumento apud Galenum  
lucidissimè passim, sed præcipuè *lib. de vtilit. respirat. & de puls. vsu*  
*exarata inueniuntur, quis lege et; & præterea Valesium, qui doctissimè*  
*idem discussit lib. 3. controu. med. cap. 2.* Verum quoniam Harueio, &  
sequacibus placuit nouiter hanc cribrare arenam, non inconueniens fue-  
rit de isto quoque nonnulla dicere; prout presens tempestatis occasio  
postulat, prætermittis ijs, quæ repetitione, discussioneq; non egent.

Idem vsus ab  
ipso Galeno vtrius-  
que mutatio-  
nibus proba-  
tur.

Eundem igitur, & pulsus, & respirationis esse vsu, ac vtilitatem,  
manifestè ostendunt mutationes in ipsis tum naturaliter, tum præter  
naturam euenientes, quæ vel eadem prorsus, vel proportionales, & sup-  
pletorij

pletoriæ ad inuicem considerantur: eædem, quidem, vbi omnia secundum naturam cuiusque (siuè instrumenta spectes, siuè facultatem) libera sint, nec ab aliquo impedita: proportionales autem, & suppletoriæ, vbi eorum aliquod vel deficiat, vel à cursu libero impediatur. Sic si animal ob cursum, laborem, iram, aliamuè caloricam causam considerabiliter incalcescat; ita ut pulsus in magnitudine, frequentia, ac celeritate augeatur, proportionaliter respirationem quoque augeri, obseruamus. Si ob aeris frigiditatem, timorem, aquam, aut aliquam aliam refrigerantem causam imminuitur, rarefcitq; pulsus, etiam respirationem in his cernimus immuturâ.

Nec sine sale eam nos adieciſſe particulam Vbi omnia libera sint, nec ab aliquo impedita quis putet: ea enim omnes tùm exceptiones, tùm obiectiones, quas possint, ac soleant Nouatores prædictis opponere, promptè soluit, & ad nihilum conuertit: Etenim, si dixerint, multoties mutari pulsus in frequentia, aut magnitudine, spiratione in ijs non mutata; sicuti, & respirationem nonnunquam alterari, pulsus in ijsdem non alterato; promptum his respondere, indigitareq; erit, tunc vel alterutram facultatem impedire, vel alterutrum instrumenta læsa, & præter naturam affecta esse; in his enim duobus has euariare actiones, citati meminerunt Auctores, dum pulsus à vitali facultate, Corde, ac arterijs; spiratio autem ab animali potentia, pectoreq; ac cæteris ad eam dicatis organis exercetur: non eò tamen rem peruenire, quin suppletoria in cæteris mutatio fiat. Vt si pulsus ver. gr. magnus fiat, respiratio autem ob pectoris, vel diaphragmatis aliquem dolorem, vel alium affectum, qui promptè, & multùm dilatari impediat, talis esse non possit, tunc magnitudinis defectum celeritas, & frequentia compensabit. Sicuti &, si ob locutionem, vel mentis alienationem quis rariùs spiret (cum frequentior sit pulsus), tunc maior multò, & celerior inspiratio, & expiratio fiet: habent enim tria hæc magnitudo, frequentia, ac celeritas tùm in pulsu, tùm in respiratione eam inter se colligantiam, & affinitatem, vt sese mutuò adiuuent, suppleatq; earum vna alterius defectum. Eadem possunt, & in pulsibus impedimenta euenire, vt si duræ nimis ob senectam, vel tabescentiam arteriæ fuerint, accidat autem, magnum accendi in Corde calorem, ex quo maior respiratio contingat, tunc pulsus non quidem magnitudine ob dilatandi difficultatem, sed eius loco frequentia, celeritateq; immutabitur. Hoc vnum in summa habeatur inefallibile, vtrunque horum motuum sibi mutuò respondere, sicq; ad vnius mutationem immutari, & alterum, si generica intercedat causa. Ergo ad eundem finem tendere vtrunq; vniue vsui ambos inservire motus, pro verissimo, & iam pluriès definito tenendum.

Nec illud remoratur argumentum, quod, si sic esset, deberet sibi quoque in singulis istibus respondere; nam ad id dicitur, hoc minime necesse esse; cum non incongruat duobus, homini, & puero, ad eundem terminum eodem tempore peruenire, si primus magnis passibus rari-

Non obstat  
mutationis  
varietas ali-  
quando in  
alterutro vi-  
sa.

Suppletoria  
mutatio  
exempli.

Non obstat  
istud argu-  
mentum.

rem, alter crurum breuitati passuum frequentiam, ac celeritatem addat. Porro idem de pulsu, & respiratione dicendum: hæc siquidem tantam vno afflatu aeris copiam trahens, reddensq; quantam duobus, tribusue ictibus Cordis excipi, ac restitui posse, putamus, multitudini raritatem, dum alter paruitati duplicatam saltè frequentiam adnectit sic, vt ambo simul eundem terminum attingant, eundem expleant vsum. Quæ tamen diuersitas non casu à Naturæ Conditore, sed prouidenter imposita est; vt scilicet voci, commoditas, & verbis melos optatus adsit. Sic eximie suo more docet *Gal. lib. 6. de vsu part. cap. 2.*

Non obstat  
facultatis, &  
instrumento-  
rum varietas

Non obstat  
facultatis, &  
instrumento-  
rum varietas

Non obstat  
facultatis, &  
instrumento-  
rum varietas

Pulsus, & re-  
spiratiois v-  
sus ex Naturæ  
io.

Vsus pulsus  
& respiratiois re-  
sultans.

Neque item illud aliud officit, Sicut à variâ facultate, & per diuersa instrumenta illi duo, peraguntur motus, ita varium quoque vtriusque argui finem: nam responderetur, Naturam sic in cæteris actionibus multis prouidisse, & hoc, vt à plantis animalia, & ab his homo dignitate distingueretur; addendo attractionibus, & excretionibus multis, quæ à commoda possent impedire vita, animalia instrumenta, quæ simul cum naturalibus, ad eundem tenderent finem, eademq; incumberent actioni, vt videre est in cibi, potusq; deglutatione, cui & muscoli, & fibræ, voluntaria, & naturalis facultas cooperantur; in facum, lotiq; deiectione, pro qua intestinorum, vesicæq; transversalibus villis tot abdominis, & illorum orum muscoli additi sunt adiutores, & quasi magistri. Idq; ne à suis opportunis negotijs, & civilibus ludis interire homo inuitus ple- runque retraheretur. Sibi autem inuicem inferuire, seq; mutuo adiuua- re in omnibus naturalibus, & voluntarijs motibus facultates certissimè conspicitur. Et hinc est, quod illarum vna pereunte, necesse est, reliquas quoque vna pereire.

Constito autem de identitate finis vtriusq; horum motuum, quæren- dum est, quis hic sit. Respondent Neotericis hi, pulsus vsum esse, vt nouus semper sanguis ad partes nutriendas feratur; (& in hoc circula- tionis necessitas elucet) respirationis autem, vt per dilatatos pulmonis porulos sanguis aere aspersus ab arteriali vena ad venosam arteriam, hincq; in sinistrum Cordis ventriculum facilius, & volatilior commigret. Sed vtrumque falsum esse, probabitur. Et primum quidem, quia, vt proximo annuimus capite, sanguinis ille continuus transitus pulsuum libe- re vnuersum, simultaneè, & æqualiter dilatari, contringiq; vetaret: cum enim per sola arteriarum ora, & per earum anastomoses in venas apertas sanguis in dilatactione exceptus possit educi, in earum reliquo plenitudo remanebit; ynde nec illa pulsus concinnitas, æqualitas, ac rhythmus obseruaretur. Partes etiam à continuo noui sanguinis affluxu in sui nutritione impedirentur non secus, ac si ventriculum continuè nouis alimentis quis oneraret; ex eo enim proua iusurgeret concoctio. Secundò cessante, vt ibidem dictum, sanguinis fluxu, cessaret, & motus: sed ligata Caua, aut Corde ipso, euulso, adhuc pulsus perseverat. Item puncta aliqua arteria, & velociter per puncturam sanguine exeunte, itaut non solum is, qui à Corde illi suggeritur, sed & qui ab alijs arterijs,

## CAPVT VIGESIMVM. 203

& venis, exeat liberaliter, nedum in suas inferiores propagines elaboratur: pulsus tamen, & in ea, & in his etiam perseverat, quoad usque Cordis perseverat cum vita pulsus, nisi illa vinciat. Tertiò si per arterias tantum sanguis ad nutrienda membra deferretur, illis alligatis, vel cæsis, necessariò cessaret partium, ad quas deferunt, nutritio; cum per venas eò deportari non quidem, sed imò per eas sanguinem à membris ad Cor allici à Iunioribus supponatur: Id tamen minimè obseruatur, cum videamus, parum, vel nil illa membra pati, solum quid modicum frigeris, ut habetur ex *Gal. lib. de usu puls. cap. 1.* Quod si spatio temporis (inquit) non torpent modò, frigentq; ac pallida redduntur, sed etiam ali desinunt, per communitatem, consensumq; magis hæc, quam ex pulsuum impedimento fortasse contingant. Ergo per eas solummodò nutrimentum defettri, non est asserendum. Si verò dixerint, idem nobis obijci posse de venis, non eodem nos ferient modò, qui admiximus, per arterias quoque ad membra sanguinem arteriacum, & spiritosum peruenire, à quo promptum illis est alitionem sibi in egestate parare, quamvis non sic permanentem. Quartò Natura sicuti in necessarijs non deficit, ita nec abundat in superfluis: Ideo bene notat *Galtruëchius Phys. part. disput. 3. cap. 3.* citca finem. Non plus attrahit, exugitq; alimenti à singulis partibus, regulariter loquendo, quam ipsi necessarium sit, hicq; seruari perfectissimè iusticiam distributionem: quamobrem eadem ferè semper seruetur proportio inter membra corporis, eademq; ferè vultus lineamenta. Quantum verò superfluum foret illud continuatum per arterias suppositum sanguinis partes affluuium quis neget? cum exinde cogantur venæ (ut Harueiani dicunt) superfluum reassumere, & ad Cor, ut nouiter coquantur, & calefiat, reducere? Confer huic, benignissime Lector, quæ cap. 3. 9., & proximè antecedenti de hoc diximus, & validam efficies probationem.

Respirationis autem adhuc minus videtur esse finis à Circulantibus assignatus, tum quia, si sic esset, deberet pulmonis dilatatio cum articularum dilatatione congruere ad hoc, ut confluens in huius elevatione sanguis per dilatatos poros liberè transire, & aeris spiritositate imbui posset; cui alioqui, si quo tempore dilatatur arteria, pulmo constringitur, manifestum futurum sit impedimentum: Ea verò motuum coincidentia non accidit; quia rarior saltem duplo est thoracis motus, quam Cordis pulsus, sicuti, & illius, quam huius, perisystole longior. Tum quia difficilè traheretur, aer, si pori pulmonis vndique replerentur, imbuerenturq; sanguine. Tum quia inspiratio potius sanguinem remoueretur, cum aer frigidus attrahatur, frigidum autem cogat, constringat, retineat, obstruat. Tum quia, si aeri permisceretur sanguis, vel huic aer, deberet in expiratione aer sanguinis tinctura inflectus exire, quod in speculo afflato dignosceretur facillimè: hoc autem non aspicitur. Tum quia pituitoso, crassoq; existente sanguine, libera impediretur respiratio, acri, à crassitie aditu pernegato; acri verò, & bilioso existente

Vltus respirationi assignatus colligitur.



tussis molestissima effugi minimè possit; quorum neutrum in huiusmodi cacochimijs, per phlebotomiam conspicuis, observatur non raro. Tum quia inspirationi non responderet expiration: aeris enim inspirati pars sanguini mixta, & ad Cor delata, expirari minimè possit: atvero æqualitatem quilibet in seipso observare valet. His adde, quæ de tali per pulmones sanguinis transitu supra aliquando tacta, infra verò cap. 22. melius discussa inuenies, & ni fallor, sat firma reddetur ratio natura.

Vtriusque usus  
ex Galo. Val-  
les., & Mercat.  
est.

Igitur cum Galeno dicendum, usum vtriusque motus esse moderationē nativi caloris, quæ inducitur tum aeris attractione, per diafolem, & inspirationem, tum fuliginum, si quæ sunt, excretionem per systolem, & expirationem insequente, tum eiusdem caloris per vtrunque motum ventilationem; Et animalis spiritus instaurationem. Ad quod demonstrandum clarissimis, & ipse lib. de vit. respir., & de usu puls., & Vallesius lib. controu. cit., & in parte Mercatus, rationibus, quæ apud ipsos legi possunt, vti sunt, ut ideo eas hic referre superfluum sit.

Alius usus  
pulsus, animæ  
arteriarum.

Sciendum verò est, ut prudenter notat Mercatus, aliud esse considerare usum arteriarum, aliud usum motus ipsarum: Multas enim posse ab vno, & eodem instrumento operationes exire, certissimum est. Quare mirari desinat Harueius, à Galeno arterijs plures usus assignari, pulsum scilicet; sanguinis, ac viuifici spiritus ad omnia membra deductionem; caloris nativi euationem &c.; quorum quædam à facultate mouente, quædam in vim vacui, quædam consecutiue ad ipsum motum adimpleantur. Quicquid sit, pulsui eundem usum esse ad commodum Cordis, & omnium corporis partium, quem respiratio Cordi præstat, certum est.

Quædam ob  
iecta tollit.

Enim verò, quamuis videamus, respiratione sublata, animal citissime commori; aliqua verò arteriarum, etiam carotidum, alligata, ex qua in arterijs omnibus ab illo ramo deductis pulsus tollatur, non valde membra illis irrigata lædi nec in calore, nec in motu, sensuue propterea quod à Corde non per arterias solum, sed & per venas (quamuis minus) calor influit: non ideo tamen ex hoc inducitur, quin idem amborum usus sit, ut diximus; cum aliud sit pulsum in genere, sine quo nec momento quidem viuatur, & aliud alicuius tantum partis considerare. Cuius diuersitatis ratio est, quod simile non est principium ipsum insiti caloris pati, aut aliquod eorum, quæ ab illo calorem accipiunt. Quippe id semper præcalidum esse oportet, ut quod ipsum tum cæteris pulsandi motum præstat, tum ipsa calfaciat; his satis ad salutem est, si vel exigui compotes sint caloris: præterea, principium ipsum si naturali calore priues, non ipsum modò refrigeres, sed etiam vniuersa, quæ ab eo prius calorem capiebant. Duplici igitur commoditate particula quæque Cor ipsum superat, quominus noxam ex caloris inopia celeriter contrahat: Siquidem cum illi plurimo sit opus, cæteris exiguo; cumque illi à nullo calor influat, sed alijs ab illo, utique illud celeriter à naturali statu recedit, hæc minimè. ] Hæc Galenus lib. de usu puls. cap. 2.

## CAPVT VIGESIMVM PRIMVM.

*Impugnatur Galtrucehij de Circulatione sententia, & ad omnes eius rationes respondetur.*

**N**ON solum autem Medicis huiuscæ temporis Scriptoribus non paucis placuit hancce Harueianam de motu sanguinis adinventionem acceptare, ampliare decorare: quod & eadem quibuldam Philosophis adeo arrisit, vt eam pluribus vallare argumentis non destiterint. Inter hos præcipuum, vt opinor, locum tenet Reuerendus Galtrucehij de Societate Iesu, Vir celeberrimus, qui in sua Physica particulari illam plurimum opinionem euexit, auxit, ditauit. Hic quidem egregius Autor, cum prius disputat. 3. cap. 3. prope finem, vt superiori capite citauimus, dixerit, à partibus non magis alimenti attrahi, quàm necessarium sit, non æquè bene postmodum sequenti capite quarto sanguinis circulationem admisit; vt potè sepefluâ, & sine qua facillimè ob continuum spirituum effluxum non per arterias solum, sed & per venas calor partis insitus seruat, partes autem, alliciendo, quod sibi necessarium est, à spirabilibus venis, optimè nutriuntur sanguine eo, qui, etsi in venis moretur, ab arterijs tamen ipsis per communes confluxus, ac anastomoses spiritu vitali, & calorifico talis ferè efficitur, quales partes viuentes existunt, vt optimè aduertit Mercatus lib. 1. de puls. tract. 2. cap. 2., vbi docet eandem gratiam venas arterijs tribuere, quam Caua tribuit Cordi nimirum sanguinis refudationem in ipsas, quo ex eo, & aere spiritus viuificus instauratur, & inde vicissim ab arterijs venis retribuitur.

Illius verò superfluitatem quis inficiabitur? ex ea liquidem, sic arguente Harueio, & cæteris, plus sanguinis ad partes deferretur continuè, quàm ab ijs possit, ac debeat absumi, vt ob id teneantur venæ illum perpetuò retrahere ad Cor: Quantumcunque enim daretur (quod non conceditur) per arterias ipsas nutrimentum corpori offerri, ad quid magis per eas vehi, impelli; quàm sit necessarium? Si verò quod necessarium tantum, sufficit autem resolutioni instaurationem, & agglutinationi materiam idoneam suppeditari, cur non sufficiet, ferri id solummodò, quod à quotidiano nidu possit refundi. Nonnè ad id implantatum tum naturalem, tum animale in homine appetitum scimus, vt necessaria alimenta, & irrorantes potiones in ventrem, qui terræ vice fungitur, & radicibus præparat alimenta, deglutire valeat? Et vnde sic crebrò infurgit hic, nisi quia partibus exhibitur refocillamentum iam consumptum est, & ideo noua quærantur, noua appetuntur? Sed si partibus semper superfluit, quid est, quod illarum nouat appetentiam? An Cor forsan illud est, quod membrorum præuidens egestatem, violentius à ventris venis exigit? Si sic est, cur simul à partibus iam præparatum, & portectum per

*Circulationis superfluitas probatur.*

venas

venas furripit? an non, & hæc à Corde sugentur? Quod si non Cor, an parces illæ sunt, quæ violentius tunc trahant? Si verò sic est, cur attractum venis remittunt? Sed & si in corpore sanguinis illa quantitas est, quæ scitur, & partibus continuè porrigitur per circulum nonne sufficiet per plures dies, absq; quod nouus toties appetatur cibus? Quod cum non fiat, constanter asserendum, neque sanguinem partibus subtrahi, neque superficier in ipsas trudi, sed omnia ordinatè fieri; partes nempe, quod sibi necesse est trahere, eoq; consumpto, iterum ad attractendum insurgere, vsquequò à parte post partem suctio ad ventrem pertingat, idq; toties fieri, quoties nouo alimento indigent citra iacturam eius sanguinæ portionis, quæ ad venarum cavitatem mediocriter implendam, & vitalem calorem fouendum requiritur.

Autoritas  
Salomonis à  
Galieno chio  
adducta co-  
muniatur,

Ad eam verò circulationem admittendam, si à Rota, de qua Ecclesiastes cap. 12. meminit, inductus fuit Vir acutissimus, imbecillum illud argumentum est pro circulo supposito ponendo: Nam Rota, cum organum quoddam sit, manifestum est, à Sapientissimo non ad motum ipsum, sed sanguinis circulationem eam metaphoricè adaptatam esse, sed bene ad aliquod membrum, quod continuè prohauriendo è cisterna, super, vel propè quam positum sit, coaceruato in ea liquore, moueatur. Verba Salomonis sunt hæc: Antequam rumpatur funiculus argenteus, & recurat vita aurea, & conteratur hydria super fontem, & confringatur rota super cisternam. Ponatur ergo pro rota Cor, Caua verò cisterna sit, e qua illud, se mouendo sanguinem hauriat continue, & similitudo attendatur: Rota enim super cisternam posita haurit quidem aquam, vt per canale in hortulum spargatur, & ea irrorentur omnia: at non reuertitur in cisternam aqua: quare ab hoc non describitur circulatio.

Nec forsan Hippocratem latuit ea Salomonis dictatio; qui proinde *lib. de Cord. num. 8.* cisternam sanguinis vocat dextrum Cordis ventriculum, à quo Mens hominis, quæ in sinistro per ipsum ventriculo sita, est, sanguinem adsumit. Mens hominis (inquit) in sinistro ventriculo insita est, & reliquæ animæ imperat. Nutritur autem neque cibis, neque potibus, sed pura, & illustri substantia, ex sanguinis discretione, ne, nata. Adsumit autem alimentum ex proxima sanguinis cisterna, radios suos eò immittens, & depascent &c. Qui etiam *lib. 4. de morb. 2.* Cor fontem sanguinis appellauit. Et sic per ipsum hydria intelligeretur arterialis vena, quæ ab ipso sanguinem recipit: quæuis in hoc verisimilior est Galtruchij opinio, nomen fontis attribuens Iecori, quod sanguinis officinam ritè, & prudenter statuit, hydriam ad Cauam venam, quæ sanguinem ab illo haurit, adaptans. Vt ergo ad rem redeam, quantuncunque, vel Cor à Caua, vt Nos interpretati sumus, vel sinister Cordis ventriculus à cisternâ, quæ per Hippocratem dexter ventriculus est, sanguinem motu suo allicit, & in arterias diffundit; non ob id necesse est, illum ad Cor per venas redire: sed à partibus in alimonem propriam

priam absorbetur, & dissoluatur continuè, sicq; non totus per Cor sanguis, sed pro membrorum fottu necessarius itabit.

Si verò aliæ ab eo posittæ rationes, quæ ad hanc illum inducere sententiam, considerentur, facillè illas soluisse poterat, si alteri Vir eximius fuisset Veterum opinionioni addictus. Nam quod primò ait, singulo Cordis pulsu aliquid à Cava exugi, iam supra cap. 12. confutatum est: Sed etiam si concedatur (quod non); id tamen adeo parum esse potest, vt solum ad pulsiones, nunquam imnotos, alendos, & ad sanguinis artetiaçi, ac spiritosi fabricam, seu reparationem sit satis: nec enim Cordis dilatatio tam valida est, vt quid consideratione dignum trahatur intus, nec systole adeo restringens, vt sanguinem valde expellat: semper enim in Cordis ventriculo dextro sanguis adseruatur, qui alteri ingressuro obicem ponit; Vt propterea debillimum sit illud Harueij argumentum à capacitate ventriculorum sumptum, vt quantitatem sanguinis singulo istu ei aculati metiatur: hi enim in sano homine modicissimè tùm dilatantur, tùm adstringuntur. Ideo à quotidiano hepatis subsidio facillè, quod ad hoc necesse est, refunditur: & hinc fames, hinc sitis pro indigentia modo excitantur, quibusdam magis, quibusdam minus, & his crebrius, illis rariùs, prout laboribus, vel otio incumbitur, proutq; calor natiuus, vel vehementior, vel debilior, vel vorax, vel segnis, magis, vel minus quærit, attrahit, absorbit, absque quod circulatione sit opus.

Vbi secundò ait, partes non quolibet sanguine nutriri, sed calidiore, spiritoso, & subtiliori, vt intra poros faciliùs subeat; id quidem verum, si de parte subtili, spongiosa, spiritosaq; qualis pulmo est, deq; vitali, & calorigico partium fottu agatur; minimè verò, si de alijs compactioribus, crassioribusq; partibus, est caro, os, neruus cartilago &c., siue de vera alitione, quæ alimenti in aliti substantiam conuersio est, agitur: huiusmodi enim crassiori indigent sanguine, si modò faciliùs assimilari, agglutinariq; debet; alioqui, & difficiliùs vnietur, & faciliùs dissipabitur. Hinc est, quod nutritio ex vino facilis quidem est, & cernitur ex robore spiritosis partibus addito; at non durabilis, cum citò relabantur vires, & vinosi corpus ferè contremiscat. Ideo venosus sanguis ad id aptior censetur, vt qui crassior, & sufficienter calidus tùm ex se, tùm ex communicato per arterias habituoso spiritu, existit; Qui sanguis, & ad extrema facillimè penetrat tùm attratus, tùm à continujs motibus animi, & corporis impulsus; non obstantibus valvulis, quas in omnibus non esse venis, & vbi sunt, paulatinam transmigrationem non impedire, sed subitam tantummodò coercere, ex supradictis constat. Neque tantus per arterias, sanguinis prouentus sit ad partes, qui ab ipsis debeat fastidiri, & in venas remigrare, cum ob pulsum per tot anastomoses latè ab Harueianis admittas, intra venas sibi comites possit vel singula systole, vt Galenicis placet, vel in diastole, vt Alijs, refundi, & similiter acceptari, itaut paucissimus pro partibus ipsis remaneat, absq; quod re-

Prima Cella  
truchil  
ratio dissoluitur.

Secunda ratio etiam  
soluitur.

Quod

Tertia ratio  
dissoluitur.

Quod tertio dicit, vitali caloris influxu partibus omnibus opus esse, conceditur: Sed cum hoc optimè huic caloris transfusioni locus est citra sanguinis continuum occursum; cum & per spiritus, & per sanguineos vapores continuè à Corde impulsos, ab arterijsq; attractos, tum per arterias à venis, & in has ab illis mutuos, & redditos, partes facillimè foueantur. Quinimò, & per venas quoque calorem à Corde (licet minus) partibus communicari, per experimentum proprium docet *Gal. lib. de vsu puls. cap. 3.*

Quarta sol-  
uitur ratio.

Quod quartò supponit, per huiusmodi circulationem multa explicari difficultia, quæ aliàs laterent; Culque singula percurrenti patebit, ea non minus sine illa sciri, & explicari: Corde enim illæso, facillè aliarum partium corrigi intemperies, ipso vitiato, totum interire animal, quis non videt, ex purissimi arteriaci sanguinis adhæsu, spiritus viuifici continua ab illo translatione, calorifq; natiui communicantia, tractu, pulsuq; per eadem arteriaca vasa hoc enasci? Præcipuam enim inibi esse animæ sedem, regiumq; thronum, à quo bona cuncta procedunt, non autem impartitas gratias ad ipsum pro repastinatione reponendas esse, hæc eadem suadet ratio. Cur enim sanguis ineptus reddetur, si continuè à spiritibus fouetur, diffiatur, iuxtaq; animæ imperium nunc intro se recipit, nunc foras volitat; nunc cursitat, nunc canit receptui? Hinc alternæ vicissitudines somni, & vigiliæ; motus, & quietis; coctionis, excretionis; alimoniar, dissolutionis, milleq; aliorum, ex quibus humanæ vitæ insignia panduntur, quæ cum circulatione vix subsisterent, sed perpetuis agitationibus corpus exponeretur. Secundo quem in finè sit instituta respiratio, supra dictum est; & visum non esse ob sanguinis circulati progressum, sed ob natiui, vegetiq; caloris moderationem. Tertiò cur in fætu vterino adsit illud ouale foramen à vena Caua non ad sinistram Cordis ventriculum, sed ad venosam arteriam, nil aliud est: quam congrua pulmonum nutritio per illam arteriam, quæ vnica consistat tunica, à qua facillimè sanguis, immotis pulmonibus, suppeditetur; cum in nato infante à motis pulmonibus facillè per arterialem venam ob dilatationes, constrictionesq; mutuas eliciatur. Alioqui, & in fætibus, tum arteriæ, tum Cor pulsatur, & sanguis arteriacus à matris arterijs suppeditatur, & ab ipso fætu corde seruat, gignitur, & corpori communicatur. Quartò cur Cor pulset, vsque ad mortem, nec sine ea viuat animal, clarum est, esse, ex vitalis flammulæ natura, quæ, vt ignis, ventilatione eget, & pabuli rarefactione, vnde & spirituum, & caloris impartitio sequitur: minimè verò esse ob sanguinis motum, tum quia sine illo, in exempto Corde adhuc durat pulsus; tum quia sine actuali partium motu, fibrarum ape, humorum, ciborum, & excrementorum in corpore reliquo motus sunt. Quintò cur in extincto animali tam parum sanguinis in arterijs sit, ad quid aliud referendum, quam ad sanguinis spiritositatem, tenuitatem, & paucitatem? idq; vt sine impedimento ad partium euenationem dilataren-  
tur,

tur, comprimerenturq; . Alioqui si circulatio adesset, continuus quoque in ijs sanguinis affluxus esse deberet: quousque enim Cor mouetur, tantum pelleret, quantum traheret, & è contra . Sexto Cur in strangulatis caro liuescat, & venæ turgcant, etiā sine circulatione patet: vbi enim flamma extinguitur, nigrities remanet, & sanguis ad locum dolentem, ac ligatam confluit. Quinimò ex hoc patet, quantum pulsui incommodet sanguinis concursus, qui non, vt aer, constrictioni dat locum, & ideo aeris euentatione cessante, cessat, & pulsus. Septimo Cur in phlebotomia non fiat stricta ligatura, iam ratio in superioribus capitibus fuit exposita, & clarè liquet esse, vt sanguis liberè possit à venis superioribus, & maioribus ad dolentem, & ferè ob ligaturam tenfam venam confluere. Aliter, si ab arterijs venire deberet, stricta conueniret eò vsque, quò vena omninò clauderetur, dummodò arteria profundior, durioreq; in suo seruetur pulsandi modo indicium, nec suas premi tunicas, nec cavitatem impediri: quò tamen casu vix exit sanguis, sicuti laxato ligamine, fuit. Octauo mutatio coloris sanguinis, in phlebotomia fluentis, non est, vt ipse asserit, progrediendo ad laudabillorem semper: quia non minus frequenter e contra euenit, nempe vt in principio laudabilis, inde deterior, & postmodum deterrimus etiā in adhuc sanis egrediatur. Ex quo imò præcipuè indicium desumitur, à venis sanguinem exire: quia si aliter esset, quomodo vires cum tali sanguine in arterijs existerent, & sanitas constarent? qui spiritus ex eo fierent, & qui vapores ad Cor eleuarentur? Nono Cur non continenter, sed saluosè sanguis à vena exiliat, facilis responsio est, quod tunc à pollicis interpolatis motibus, à comitis nerui, ac arteriæ vibratione, à fibrarum, quæ circum circa sunt artificiosis conatibus sanguis à vena exprimitur: id enim in ijs præcipuè obseruatur, quibus propè sanè degentibus sanguis probus est, nec superabundans. De reliquo, si prauus, ebulliens, vel superabundans in venis subsit, & continenter fluit, & impetuosè adeò, vt alio non sit opus motionis, artificio. Tunc ergo quānam anastomosis, tam magna in arteria comite imaginatione concipitur, vt sic redundas, & magnum sanguinis effluuium, quod nec ab ipsamet arteria capitur, suggerar, & affluenter per temporis spatium, pulsus non mutato, fluxu non alternante, in vnicam scđum venam demandet? Si omnes brachij arteriolæ in vnum caudicem versus digitos degeneraret, & hic in venam scđam insinuaretur, facile intellectu esset, sic profusum in eam posse eijci sanguinem: sed si semper magis ramifican ur, & disperguntur, & anastomoses inter comitem tantum arteriam, ac venam reperiuntur, nescio, quomodo, per solas anastomoses maior sanguinis quantitas eructetur, quā ipsa arteriæ cavitās ferre possit. Deciduo quomodo Cor a cerebro refrigeretur, vt Aristoteles sententiā est si modo vera) facile respondebitur, sine circulationis adiutorio id fieri à continua irroratione aquosæ humiditatis per tonus, & cavitates multas ab eo in subiectas partes descendens; cuius significationem præ-



bet non inepta pluuiæ generationis analogia capiti, cerebroq; ex vaporibus congruens, vt ibidem annuit Aristoteles.

Cætera, quæ ibi Galtruchius per circulationem explicari tradit, eiusdem ponderis sunt omnia, vt non videatur opus longius tempus contere.

### CAPVT VIGESIMVM SECVNDVM.

*Quadam sibi met ab eodem Galtruchio facta, & inde soluta obiectiões refirmantur.*

**S**ED quoniam huc incidimus, non parum incrementi capiet assertio nostra, si quædam alia, quæ de hoc subiecto sequenti capite quinto discutit egregius hic Auctor, ordinatè percurramus; Qui, vt firmius huiusmodi statuminet Harueij opinionem, nonnullas ei opponit, adducitq; obiectiões, ac instantias, quas inde ordine eodem dissoluit: quam tamen irreparabiliter, nunc, potiores percurrendo, & ponderando, videbitur.

*Obiectio prima.*

Obijciat igitur primò. Dum vena Caua supra ascendens Cordi committitur, & in ventriculum Cordis dextrum aperto foramine, superius rectè progreditur, deberet quidem sanguis ab inferioribus ascendere, à superioribus infra progredi, vt in Cor possit introire (& hæc obiectio à

*Solutio Galtruchij.*

„ nobis etiam facta erat supra cap. 4.) Respondet, Ea parte, qua vena „ Caua ascendendo committitur Cordi, obseruari aliquid intus promi- „ nens, quod impedit motum vltiorem sanguinis, illumq; potius „ deflectat ad Cordis ventriculum. Verùm in principio libri, prælo- „ quio ad Lectorem, hoc suum dictum corrigit, dicens, se sic ibi dixisse, quia iam id audierat, à quodam Medico; postea verò à Guiffarto melius intellexisse, dictam non adesse prominentiam, sed quandam val- „ uulam, quæ huic officio incumbit: Sed leuis est hæc ex Guiffarto reparatio: Nam præterquam quod sola illa sygmoidum valvula, quæ intra Cordis dextrum sinum aperitur, nulla alia in Cauæ Cavitae propè Cor valvula reperitur, obiectum non tollit; Vbi etiam addit, nec apparens inde aliquid rationis elicitur, qua auferatur inconuenientis emergens: vel enim aperitur ad superiora, vel ad inferiora. Vt cumq; sit, manifestum, quod ab vna parte admitteretur, ab vltra inhiaberetur potius, quàm ad Cor vtrinq; dirigeretur, id quod etiam de prominen- „ tia illa dicendum, quæ vel vtrinq; impediret, vel potius neutrum.

*Instantia soluta.*

Instat inde, saltèm sanguinem illum, qui in mesaraicis venis est, à Corde non prodire, neque ad Cor reuera; cum nulla via pateat à Porta ad Cauam; Et respondet, à Corde per arterias prodire, & à venis redire, per secur transeundo ad Cauam, & consequenter ad Cor per anastomoses illas, quæ inter Cauæ, & Portæ ramulos in iecore à Lauren- „ ti o, & alijs admittuntur: Huic verò responsioni contrariatur plurim

*Galtruchij instantia, & ad eam re- sponso.*

Iecoris

# CAPVT VIGESIMVMSECVDVM. 211

Iecoris venarum viduitas : per hoc enim Viscus nulla arteria pertran-  
sit, sed vna tantum illius concavæ parti inhærens, vt notat *Vesall. lib.*  
*5. cap. 7.* Quare cum, & illa ob tunicarum crassitiem venis capacitate  
cedat, non videtur quomodo tanta sanguinis quantitas, quantam tor  
venarum furculi continent, ab arteria illa feratur. Verior ergo fuerit  
assertio, sanguinem ibidem à Iecore ex chylo generari ( prout, & idem  
alibi opinatur Auctor ) & in Cavam reponi.

Modum ra-  
spō nōo re-  
pellitne.

Instat insuper, sanguinem, vbi computruit, si per Cordis sinus transi-  
ret, labefacturum Cordis vigorem cum vitæ periculo; Et respondet,  
quamvis egrè sanguini tamen putrido transeunti Cor assuescere, prout  
refert Laurentius, in Empyicis pus in thorace collectum non solum tussi  
reijci, sed & à cauitate pectoris in pulmonem aborsorptum, ac inde in  
Cordis sinistrum ventriculum instillatum, per arterias ad vrinas tran-  
smitti, saluo ægro: Cuius tamen instantiæ tantam agnosco vim, &  
efficaciam, vt ob hunc præcipuè respectum circulationi repugnem, ob  
hancq; solam causam putem, à Natura adeq; crassum, validumq; septum  
inter Cordis ventriculos constitutum fuisse; quò scilicet per illius incon-  
spicuos porulos, tamquam per lapidem colatorium subtilior solum, &  
prætiorsior sanguinis pars à dextro in sinistrum ventriculum transco-  
letur, inde paulatim in arterias ad totius corporis vitalem forum tran-  
smittenda. Et hæc eadem potior animæ armatura est, qua morbos  
etiam acutissimos, & coctione, & crisi vincit, fugat, nihilat. Alioqui,  
si sanguinis vitium idem in toto corporis centro moraretur, per omnia  
vasa ferretur, & animæ conspectus domicilium occuparet, vnde ægro  
salus, vnde ægro vita? Quæ Arx saluabitur, si in quoscunque, etiam  
visceraneos, cuniculos hostes excipiantur, nullo tuto ostiolo, nullo vallo  
iuuante? Si igitur sanguis ille, qui nonnunquam putridus, chlorus, viri-  
dis teter per venam sectam bis, ter, & quater emittitur, ab arterijs exi-  
ret, quis pulsus, quæ nutritio, quis color, quæ quies? Et verò si arteria  
tundatur, vt in scarificatis cucurbitulis obseruare licet, non similis, sed  
sanguis floridus, etiam in cacochimo corpore, vt plurimum exit. Si-  
gnum, non illam adeo euidentem, vt aduersò statuitur, fieri sanguinis  
translationem à dextro in sinistrum Cordis sinum, sed per septi porulos,  
& incidentes alias anastomoses arterialis venæ ( si placet ) & venalis  
arteriæ, tenuiorem, & saniozem eius portionem, tum dilatationis, &  
costrictionis vi, tum substantiæ familiaritate, tum caloris energia  
( his namque modis omnibus Cor trahendo vti posse, docet *Gal. 6. de*  
*usu part. 15.* ) prospiruum, & arteriosi sanguinis reparatione alligi, ac  
veluti transcolari. Cui & attestatur paucitas sanguinis, qui in sinistro  
Cordis ventriculo, & arterijs extincti animalis inu. nitur; nisi forsân  
aliter in strangulatis vsuueniat ob respirationis defectum: tunc enim  
cum Corde aer contendatur, & arteriali venæ necessariò in dilatatione  
sanguinem vndique ( ne detur vacuum, attrahunt, quem nequeunt,  
se constringendo, pellere, suffocantur. Et hoc est, quod Haruicio, Con-

Instantia al-  
tera ex eodē  
detrahitur.

Eadem quo-  
moritur la-  
tia.

ringio, & alijs imposuit, ex hoc conijcientibus, copiosum inde pro circulatione sua sanguinem fluere. Aliud autem apud me est, posse, & aliud actu fieri: multa enim ex necessitate, quæ non spontè multa per vim, quæ non fiunt naturaliter. Sed ad rem. Ea igitur Galtruchij responsio insufficiens: nam aliud est sanguinem corruptum continenter per Cor transire, & maximè per eius sinistrum ventriculum, in quo propriè caloris nativi viget fons; aliud verò vnica vice tantum, & criticè, hoc est cum prauis symptomatibus: Accidit enim aliquando Naturæ, quod in extremis periculis homini contingit exterius, in quibus Vna salus victis nullam sperare salutem; & illud Thucididis consilium Galeno approbatum Agentes aliquid, vel periclitari. Rarò trutem tales fiunt à pulmonibus ad vrinam, vel aluum transmigrationes, & mihi adhuc semel tantum in pleuritico, per aluum expurgato, videre contigit; cui tamen nec sic benè cessit res, sed imperfectè admodum per annum post vixit. Rarò enim iuuat temeritas, & Qui amat periculum, peribit in illo. Ab vnico ergo crisis exemplo viam ordinariam ad aluum, vel vrinam arguere non licet, quæ quotidiana experientia per tracheam arteriam, & Empyicis, & pleuriticis, & peripneumoniacis, asthmaticisq; à Natura contrata fuit.

Altera Galtruchij oblectio.

Eiusdem solutio.

Invalida tamen monstratur.

Altera quam sibi offert, obiectio est: Sanguini à dextro Cordis ventriculo ad sinistrum monstratus transitus per pulmones oclusus, saluo animali, esse potest; sicuti refert Riolanus, aliquos diu vixisse, quibus tubercula in trunco venalis arteriæ, & arterialis, venæ post obitum inuenta fuere. Ergo nec est necessarius. Respondet, tunc mortuos illos fuisse, vbi tubercula illa sanguinis transitum impedire potuerunt; & ratio est, quod saltem illa vasa eò vsque aperta fuisse opus fuit, quò alerentur pulmones; & sic potuissent reliquo sanguini. Sed manca ratio: nam quid pauculo liquori præbet aditum, quod non multo: aliud autem est transire paucam illam quantitatem sanguinis, quæ pulmonis alitioni erat opus, aliud verò totam corporis massam sanguineam, & breui tempore.

Alia Galtruchij instantia, suæ responsio.

Improbatur hæc.

Instat ibidem, alios vixisse, quibus omnino consumpti fuerant pulmones, & ideo non potuerat illis patere via per ipsos. Respondet, vixisse, quoad aliquid pulmonis superfuera, sicuti, & vasorum, per quæ sufficiens ad qualemcunque sanguinis transitum via pateret: Atuerò, hæc responsio mutila: nam aliud, quàm vasorum exigua, & corrupta pars requiritur ad totum sanguinem deuchendum. Præterea sicuti per corruptos canales transiens aqua labem contrahit, quomodo ab hac expers sanguis, per morbosos pulmones transiens, abibit? Et qua via ergo ad integram vsque pulmonum corruptionem vita perdurasset? Cor namque à sanguinis tetra transitu læsum antea fuisset, & ex materia fetente spiritus non vitales, sed lethales produxisset.

Nous eiusdem instantia, & responsio.

Instat denuò, Sic graui premendos fore sarcina pulmones, ne possent continuo, quo agitari solent, motui idonei esse. Respondet, illis talem sarcinam

## CAPVT VIGESIMVM SECVNDVM. 213

farcinam grauem minimè fore, cum sit eis connaturalis: Sed non bene instantia tollitur: quia, vtunque sit naturalis, debetur ad obundas actiones ea dispositio, & facilitas, quæ ab ipsa actionis natura, & efficacia desideratur; alias, si illæ non adsint, nec erit actio, nec eius concinnitas. Quare velocibus animantibus corporis leuitas, crurum agilitas, & longitudo data sunt, vt citò motus perfici possit; Et sic quibus hæc insunt, motus etiam velocitas inest; quibus autem contraria, corporis grauitas, crurum magnitudo, & breuitas inest, in motu quoque tarda esse, conspiciamus; Valet autem ab extrinsecis, & notis argumentum ad intrinseca, & ignota: Ergo, & in casu valebit argumentum ad oppositum sit: Pulmones continuo motui respirationis apti agnoscuntur: Ergo continuo sanguinis transitui locum minimè dabunt: Si enim pori sanguine impleantur, quomodo pro expiratione constringentur? Et quomodo aerem pro inspiratione admittent? Si verò vacui inspirationi locum dederint, quo tempore aere turgent, quomodo sanguinem circumuentem excipiant? Si verò exceperint, aere à sanguine pulso, quomodo eodem tempore inspiratio, & æqualitas inde in utroque motu quieteq; seruabitur? Nihil graue sibi natura parauit: propterea leuissimos, porosissimosq; pulmones construxit, vt & motui, & aeris tum susceptioni, tum remissioni agiles essent: cur ergo sanguinis farcinam, viarum obices, & transeuntis fluctuationem succi superadderet? Inconcinna hæc sunt, & à Natura aliena.

Et sic, præter naturam, ac per vim extorqueri hæc, & similia, in viuis diffictis videri visa *Conringio lib. de sang. gener. & motu natur. cap. 32.* per ligaturam arteriæ venali addactam, respondere promptum est: Eo enim casu nec sit respiratio; & Natura angitur; & sanguis ad vulnera currit; & Cor adhuc pulsans, cum pro aere sanguinem trahere cogatur, sanguinis tali motui festinato dat actum: integro autem animali contraria insunt, respiratio nempe, Naturæ integritas, sanguinis quies, suæ tranquillitas, & aeris pro Corde sufficiens, ac libita quantitas.

Instat itidem, Si sic sanguinis fieret transitus per pulmones, in Emphyicis, quibus pus à cavitatē pectoris per pulmones exugitur, & per tussim reijcitur, sanguinem quoque simul expuendum fore (quibus nos addimi tussiculosos omnes, & aliquid è pulmonibus reiectantes) quod tamen non fit; Et respondet, id non fieri, quia puri, & alijs oleaginosi humoribus sanguis non potest tenaciter adhærere: At non effugiet, hoc responso vim argumenti: quia, etsi sanguis fortiter non adhæserit, non tamen sic faciliè pus euaderet, quin ab eo aliquid rubedine tingeretur, prout videmus fieri, vbi cum recenti pulmonis vlcere sanguini non raro iungitur puris excretio. Adde in pleuritidis principio, sicuti, & peripneumoniar, vbi ab inflammata parte aliquid tenuioris sanguinis in pulmones imbibitur sanguinea quoque, & rubicunda sputa conspici: cur ergo non idem, si per pulmonis poros sanguinis transitus adeò celebris fieret? Si autem purulentis sputis non adhæret sanguis, quid de alijs

Non valere ostenditur.

Ad Conringium experientem respondetur.

Eisdem instantia quin res. & resp. fit.

Confirmatur instantia.

alijs (putaminibus viscilis, tenuibus, crassis, aquosis? nùm hæc oleaginosa sunt? nùm sanguinis abhæsum fugient?

**Tertia elusio.**  
dem obiectio, & solutio.

**Obiectio in sua vi repositur.**

Obiectio tertia talis est! Plures sunt venæ, quæ deslituuntur arteria coniuge, quid ergo poterunt illæ ad Cor reuhere? Respondet autem, per arterias posse sanguinem calidiores, ac spiritosum longius eiaculari, vel ab ipsis partibus allici, venæ autem non possunt sic à longe sanguinem sugere. Sed responsio hæc obiectionem ad vnguem non destruit: quandoquidem si vnum vas deductioni, alterum reductioni dicatum esset, frustra hoc sine illo, & illud sine hoc esset: quid enim vena reducet, nisi ab arteria deferatur? Et, si nil habet reducendum, cur sanguine nihilominus plena conspicitur? Ab arterijs longè sanguinem eiaculari, carnis, & partium soliditas vetat: Si verò parte ipsæ trahunt, non plus, quam illis opus sit, nec ut egerant, vel dimittant, sed ut fruantur: manifestum ergo, in similibus sanguinem, qui in venulis ijs continetur, à truncis suis venire.

**Instantia sexa, & ad eam responsio.**

**Expugnatus responsio.**

Instat autem ibidem solertissimus Auctor, quod arteriæ deberent esse capaciores, (nos supra dicebamus saltè æquales) quàm venæ: siquidem in ijs sanguis rarior, ac spiritosior est, qui in venis densior, ac frigidior venit; Et respondet, nihil hoc esse; quia ab arterijs statim ferè extra dimittitur. Verùm responsio imbecilla est: Ex eo enim, quod sanguis arteriarum rarior, spiritosiorq; est, & ab arterijs multò angustioribus dimittitur, rationabiliter deduci potest, circulationem totius sanguinis minimè fieri: quia aliqui deberet deductioni restrictio, reductioniq; deductio respondere: non potest autem celeritas extramissionis, ex arteriarum parte excessui copiarum respectu venarum decuplæ sic satisfacere, quin interim recens à iecore genitus superveniat sanguis, loco transmissi succedens, itaut venosus minimum circuletur.

**Alia elusio instantia.**

**Responsio eiusdem.**

**Refellitur.**

Instat insuper, Aneurismati illi, quod provenit ex dilatatione arteriæ iuxta Fernesium, sic non fore locum, dum arteriæ indefinenter sanguinem extra se fundunt. Respondet, hanc dilatationem potius oriri ex resolutione fibrarum arteriæ illius, & ex laxitate in illa parte: Sed sic non cessat instantia: quia quantuncunq; resolvantur illæ fibræ si verum est, ut Harueius Conringius, & sequaces opinantur, sanguinem vi Cordis eiaculantis per arterias excurrere, illiusq; virtute arterias dilatari, nulli debet sanguis firmari, sed ultra ad finem arteriæ pervenire: cum sic nil fibræ pro dilatatione operentur: à Corde autem illa distincta portio tantum transmittetur, quæ non magis in vna, quàm in alia dilatabit parte. Dicatur verò melius, Aneurisma, ut plurimum oriri ex vulnerata arteria, cui supererescat consolidata cutis, quæ a pulso sanguine in tumorem eleuatur, quò citra lacerationem dilatari potest, quod non accideret, si venæ excursum sanguinem à partibus allicerent, ad Cor reuendum.

**Quarta obiectio.**

Obiectio quarta est: In tumoribus, echymosi, varicibus, cæterisq; id genus alijs sanguinis in parte aliqua collectionibus, non videretur;

hoc

## CAPVT VIGESIMVMSECVNDVM. 215

hoc dari posse, cum venæ reuehere illum sanguinem deberent. Similiter, & hæmorrhoidum defluxio huic circulationi obstat. Vno verbo se ab hac eximit, dicens, cum de circulatione agitur, intelligi de ijs, quæ accidunt secundum naturam se habenti; ea verò omnia præter naturam esse, ac fieri, sicuti, & pleuritis ex defluxu per venam azygos ad pleuram. Et hoc modo sese expedit ab omnibus ijs obiectionibus, quæ de similibus alijs fieri possent. Veruntamen non sic facili ipsi cadet exbrigatio. Dato enim, quicquid vult, in ijs, quæ præter naturæ intentionem, & vi morbi fiunt tum in partibus collectiones, tum extra corpus effusiones, quid dicet ad ea, quæ natura dūce, ex ipsius vera intentione, nec à quoquam irritata, sed præuijs coctionibus in morbi de pulsionem, suiq; subuentionem fiunt? Sic fiunt crebri de cubitus, sanguinis defluxus per narres, os, anum, utrum. Sic phlegmones, erysipelata, variolæ, aliq; exanthemata non rarò per crism foras pelluntur, inibi; dissoluntur, vel maturescunt, à venis non retrotracta, quæ non solum sinere, sed potius iuuare quoque tenemur. Ecquid ergo in his venæ non reuehant ad Cor? nūm contra naturam agunt? imò naturalissimè, & eæ, vt plurimum sunt, quæ deferunt ad extima, non arteriæ, in quibus optimus plerunque sanguis, & spiritosissimus hospitatur, etiam in cacochimis. In eo enim potissimum vires corporis consistunt, conseruantur, & per eum contra morbum pugnatur, ac vincitur. Sic de hæmorrhoidibus dicendum, si cuiquam naturaliter, & cum iuuamine fluant: opus enim illud naturæ proprium est bene operantis, & noxia pellentis, vt sanum hominem seruet; nec solum faciem, sed aliquando solam sanguinis copiam per dictas partes Natura, venis mediantibus exonerat, vt corpus leuet, & in mediocritate seruet. Vbi verò quid præter naturalis, vel respectu Naturæ agentis, vel respectu materiæ excretæ in dictis omnibus vigere, contendat, quid ad menstrua respondebit, quæ naturalissima esse mulieribus, omnes admittunt, & fatentur vltro? In quibus, etiamsi euincerent, excretionem per arterias fieri, vel deferri saltē, (vt de omnibus, etiam faculentissimis, nescio quo verissimili iure, contendunt Harueiani) id verò non effugient ad minus, tunc venas illis coniuges non reducere ad Cor, sed sanguinem in ijs morari naturaliter; imò, si tunc partes illæ nutrirī opus habent, etiam ad ipsas, vel ab alijs venis, vel ab earum truncis maioribus deuehi. Sed & quid de suis rationibus experimentis, Autopsijsq; dicent Aduersantes? nonne omnia violenta, terrifica plura contra naturæ electionem, præterquæ illius libertatem fiunt? Qui legem ponit, tenerur illi stare, vel si eam pro se abijcit, pro alijs etiam abijcere tenetur. De his autē in superioribus capitibus abundè dictum.

Obiectionis quintæ pars illa seriosior est, quod, data circulatione, sequeretur saltē, frustra in morbis, exempli gratia, capitis tundi cephalicam venam, vel saphænam &c.: quia, quauis alia vena scissa, nihilominus minueretur sanguinis copia, & sic arteriæ minus mitterent ad partem

Solutio.

Religatur.

Quintæ obiectionis pars potior.



Solutio.

Hæc rei-  
cua.

partem affectam. Et respondet, mitti sanguinem à pede, vt fluxus ille sursum fiens deorsum trahatur, vel inhibeatur saltèm : à cephalica autem, quia per Eum creditur, ad illam plus trahi sanguinis illius arteriæ, quæ ad caput fertur. Sed malè, mea sententia, soluit obicem : nam siuè à pede, siuè a manu, siuè aliunde sanguis mittatur, nec mutatur, nec desinit, nec intercipitur pulsus ; Et sic, cum per Harueij dogmata sanguis à Corde per pulsum in arterias pellatur quaquaversum, nec sanguis idè ab illis retrahatur, nec feretur minus per eas. Similiter nec ad venam cephalicam, per talia dogmata, sanguis arteriæ capitalis trahitur ; cum aliud sit iter arteriæ ad caput tendentis, & aliud arteriæ ad brachia cum cephalica currentis : venæ, autem, vt supponit ipse, nunquam à centro, sed semper ab extremis trahunt. Et sic patet, in suo vigore obicem persistere, & consequenter Circulationis inuentum è Medicinæ Sacratio eliminandum esse ; Vt iam congruum sit, libello huic, & Disputationi finem imponere, ac ad alia non minus scitu digna properanter transire.





# LIBER TERTIVS.

IN QVO

DE SANGVINIS VSV

QVOAD LACTIS, SEMINIS,

FOETVSQVE GENERATIONEM,

ET

HVIUS ALITIONEM DISCEPTATVR.

PRÆMISSIO.

**E**Xpediti ab ijs, quæ quoad circularem sanguinis motum aliquid dubij apud præfentes Scriptores afferre possunt, reliquum nunc est, vt ad ea, quæ circa eiusdem vsum apud Iuniorum animos dubia contingunt, dilucidanda, & anucleanda accedamus. Ea verò multiplicia, sicuti, & multiplex cruoris vsque adhuc vsus Medicorum cætui innotuit, sese offerunt disceptanda. Etenim, cum, repertis Lacteis ductibus, via quædam, seu potius semita, deducendo ad superiora chylo, citra iecoris, & venarum rubearum incessum, idonea vel visa, vel imaginatione concepta fuerit; mirum dictu, quot hinc scrupuli circa sanguinis tam diu existimatam vniuersalem non vitæ solum, sed & nutritioni, generationi; conferentiam, aptitudinem, & necessitatem insurrexere: Remisso siquidem vix ei, præter purpuram viuificantem, alitionis limitato ministerio, a reliquis paulatim ablegatus est; itaut ei vix alia vtilitas, vsusue iam iam penes eleuatiore ingenia supersit. Hic illum à lacte constituendo, Hic à fetu alendo, Hic à generationis munere obeundo, Hic à semine gignendo, Hic à corpore alendo mordicus amouit; nec

Ec

aliud

aliud illi opus, præter spirituum, & caloris innati instaurationem (nonnullis ei carnis, & parenchymatum alitionem adhuc permittentibus) Iuniores reliquere intactum: Cum imò nec defuerit, qui ipsum dicat partes solidas atterere, innati calidi substantiam consumere, & quendam veluti corporis helluonem esse. In eius solum chylus ascendit. Eius publicam sedem hic occupavit; & qui antea minister solum, nunc sodalis; qui coquilinus, nunc Atriarus est effectus.

Sedeat nunc Sanguis infelix, & suam deploret infæcunditatem. Sed quid dixi? imò cursitet, circuatq; (Iuniorum voto) corporis oras omnes, & quiete vacans, alenti benefico, semenq; propaganti chylo robur suppeditet, suppetias ferat, feruorem porrigat, palliumq; ministret. Circumferat se, si placet, in cunctas Microcosmi plagas, & vigiles ubiq; excubias nutritio nouo succo pertendat, vt eius solo spiritu volatili factus hic partes alat, & cætera ad corporis, & sobolis tum alitionem, tum productionem necessaria prosequatur. Atuerò quid miramur? qui Regem, vel Patrem odit, illius vexilla cuncta, totam huius sobolem persequitur. Ergo si lecori infesti omnes, iure, & illius purpureum germen, genuinumq; odere succum.

Hæ tamen Scenæ breues. In suam quisque redibit ædem. Nimis violenta metamorphosis, ideoq; non durabit tempore longo: Suus cuique locus, suus vsus, suus honor. Sanguis commune est omnium corporis partium alimentum, Ex eo lac in mammis gignitur; eo alitur factus in utero; ex eo semen, & genitura cuncta procedit. Hic illius germanus vsus, multiplex quidem specie, genere tamen vnus, nempe vitalis alitio: quicquid enim de semine, lacte, menstruò dicitur, alimenti superfluum est, & primi vsus soboles annexa. Chylus ad hæc si aliquid confert, non immediatè quidem, sed quatenus ex eo fit sanguis. Quicquid contrarium ab alijs dicitur, contra Medicam hucusque creditam veritatem est, & à Medicorum insignium credulitate relegandum.

Progressu Libri huius hæc singula patebunt, monito interim Lectore, ne admiratione capiatur a me dispositi ordinis: Huic enim scopo innixus: vt à facillioribus, notioribusq; ad difficiliora, & incognita magis deueniatur, in primis de lactis materia, inde de alimonia factus, postea de ipsius generatione, ac de semine discepto; & tandem quibusdam de solidarum partium enutritione disputatis, ad quædam Naturæ arcana detegenda, ex doctrina Veterum, & sine Lactearum adiumento, pro coronide me confero; Non exterritus, quod alij Authores in iisdem versati sint subiectis: nam forsan in rationibus pro veriori opinione solidandis, & in aduersis argumentis, & obiectionibus eneruandis ea claritas, eaque adinuenietur seriositas, quæ repetitionis tardium, luctæq; reaggessionis molestiam leuet, atque contemperet,

*Inuenta Lactea nec Veterem de Lacte opinionem atterunt, nec nouam  
elucidant magis: lac enim in mammis, & ex sanguine,  
non è chylo gignitur.*

**N**ON minus ergo imbecilla est Neotericorum quorundam assertio, ex Lactearum inuentione patere viam, qua lac in mammis lactantibus, & ad vterum in grauidis feratur, prout iam antea senserant nonnulli: Nam, vt à mammis incipiam, duæ videbantur, ante inuentionem Pecquetiani ductus, Iuniorum de Lacte opiniones; quarum vna Prosperi Martiani, & Petri Castelli fuit, per quam ex Hippocrate elicere videbantur (sic referente Bartholino *lib. 2. Anatom. reform. cap. 1.*), duplicem esse materiam lactis, sanguinem scilicet, qui à mammarijs veniat venis, & crudiores ventriculi chylum, qui per cæcas vias, à sucta dilatatas, vel à fætu comprimente expressas, ad mammas feratur. Altera Antonij Deusingij ex Georgio Entio &c. fuit, qui conspiciens, Asellianas lacteas à mesaraicis rubris distinctas, colligenq; si non sensu, saltè ratione, aliquam ab ijs, & Pancreate posse dari, licet inconspicuam, viam, quæ lacteum illum succum perduceret ad mammas; sanguini veniam omninò dedit è chylo; non ex ipso, lac perfici, libera fronte in Opere ad id dicato sustinuit.

*Dux circa  
lactis mam-  
mis Iunior  
opinio.*

Sed verò, & huic, & anteriori multæ ab alijs Authoribus emanatæ obiectiones obstitere semper, quarum præcipua illa erat, quod nullam liceret conspicuam chyli inuenire semitam, nec videretur poris, aut cæcis ductibus, pro tanta fabrefacienda lactis mole, acquiescendum; Et inter cæteros Bartholinus ipse loco citato Martiani, & Castelli rationes soluere non destitit: At, inuento paulò post à Ioanne Pecquetto receptaculo suo, cum thoracico lacteo tubo ad subclauias ascendente, disseminataq; ob id inter credulos Iuniores talis chyli semita, mirum quanto cum applausu, & ipsi Pecqueto, & Bartholino, & alijs multis visa fuerit secunda opinio ab euentu, & Autopsia confirmari. Quamuis enim adhuc vsque nemini licuerit continuationem dicti lactei tubi cum mammarum tubulis conspiciere; firmiter tamen varijs de causis, & rationibus, lac è chylo procreari, & lacteos ductulos, etsi inconspicuos ob exiguitatem, ad mammas ferri, determinant. Sicq; nouissimè Paulus Franciscus Pallierius in quodam Genuæ nuper edito libello De vera Lactis genesi, & vsu, hanc, cum alijs apud Neotericos decantatis adinventionibus studuit propagare.

*Iuniorum  
pro secunda  
opinionem ap-  
plausus.*

Falluntur autem hi omnes primò, si putant, lac in mammis ferri ab alijs partibus confectum, itaut illæ solùm sint ipsius receptaculum, vt est vesica feri: Si sic enim esset, frustra tot glandosiss, albis pinguibusq; substantijs, & albicantibus cellulis mammas natura donasset, cum

*Lac in mam-  
mis nò fer-  
risset ibi ca-  
rum virtute  
gigni, ratio  
prima.*

sufficisset, eo supposito, duas ibi simplices effuxisse cauitates, ad mandatum liquorem excipiendum idoneas, prout videmus in alijs illam egisse membris, à quibus nil gratiæ contenta receptura erant, veluti sunt vtraque vesica, & inferiora intestina. Quod cum Natura non fecerit, rationabilius dicamus, mammas propriè lacti præparando, coquendo, perficiendoq; dicatas esse, prout ipse Bartholinus citato cap. ostenderat, probaueratq; contrarijs rationibus confutatis.

**Ratio secunda.**

Quemadmodum & si sic esset, omnibus mulieribus, tum virginibus, tum viduis, tum Nuptis, tum grauidis, tum puerperis, tum sterilibus, & iuuenibus, & vetulis, lac in mammas colligeretur, sufficeretq; vt lac sugeretur, & ad exitum inuitaretur: At conspiciamus, in solis grauidis, puerperis, iuuenibusq; lactis vbertatem dari, rarissimè alijs, nisi menstrua defecerint, vt ait Hipp. 5. aphor. 39., vel per longum tempus, & repetitis vicibus, & valide exugantur, prout ex quibusdam historijs apud Auctores non solum de mulieribus, sed & de masculis quandoque visum fuisse, fertur.

**Ratio tertia.**

Adde etiam, quod, siuè pingues, & glandosæ mammæ essent, siuè non, in omnibus lactis prouentus idem daretur. Sed & è contra scimus, ijs solis masculis interdum lac fuisse datum, quibus eleuata vbera, pingua, glandosaq; à Natura data fuerant, & ex aduerso ijs mulieribus, quibus vel pinguissimas, vel glandes ipsæ siuè vt tabescentiæ morbosæ, siuè ætatis labentis vitio consumptæ fuerant, lac quoque defuisse, quantumvis ritè cibentur. Signum ergo, lac non aliunde ad mammas influere, sed in ijs ex superfluo attracti, vel transmissi alimenti gigni, & adferuari ob multitudinem, & magnitudinem glandularum, quæ sibi similem gignere succum aptæ natæ sunt, vt in alijs quoq; partibus, quibus hæc insunt, fieri videmus, ob sympathiam, & consensum maximum, quem habent cum vtero, ex quo retentus sanguis, & regurgitans, affluenter ad illas confluit; & ob lactentium luccum, qui partem exercet, vasa dilatat, & valdè trahit: sic enim & Vir (ait Hipp. lib. de nat. puer. num. 12. si multum coeat, venæ ampliores redditæ Venerem magis inducunt.

**Conciliatur contraria Hippocratis auctoritas.**

Nec eorum opinioni opitulantur, quæ tradit Hipp. eod. lib. num. 21. de generatione lactis, dum dicit, lac fieri ob compressionem abdominis ab vtero intumescente factam, itaut quodammodo a ventre exprimat pinguedo alba in venulas vtero, & mammas communes, ipsi dulcedine à calore communicata: quia primò hic ab Hippocrate non memorantur venæ mesenterij, aut eius glandularum, sed omenti, & carnis, vbi lactatæ lacteæ non adsunt. Secundo quia hic de expressione adipis, oleosæq; substantiæ agit, non de chylo. Tertiò quia ibidem non de vero lacte agitur, sed de quodam succo ad lac disposito, & ex sanguine cum illa pinguedine peocreato, non chylo. Quartò quia non inconuenit, in alijs quoque corporis glandulosis partibus, vt pancreas, thymo &c., lacteam gigni substantiam, quæ tamen non in mammas feratur.

feratur, sed ibidem pro earum alimento, & frutione referuetur. Et veram Hippocratis mentem esse iuxta antedicta, ipsemet declarauit *lib. de gland. num. 11.* vbi similia protulit: Quin & glandulæ in pectoribus mammæ appellantur, & attolluntur, ac lac faciunt, aliquibus, verò lac non faciunt. Et faciunt quidem lac mulieres, Viri verò non faciunt: mulieribus enim rara est glandularum natura, quemadmodum etiam reliquum corpus rarum habent, & alimentum, quod in se trahunt, in lac permutant. Et ab vtero ad mammas accedit, quod post partum puero cessurum est in alimentum, quod ipsum sane exprimit, ac sursum mittit omentum ad supernas partes ab ipso fætu coarctatum. J soluitur ergo omnis contrarietas, quæ de lacte in Hippocratis dictis appareat, distinguendo lac in perfectum, pueri alimonie dictum, & imperfectum factum in vtero refocillato superfluum. Si itaq; de perfecto loquamur, hoc non nisi à mammis ex attractio, vel transmissio ad eas sanguine gignitur; Et sic videmus, lac è mammis grauidarum, & difficulter extrahi, & vitiosum, meliori scilicet ipsius, & sanguinis parte in fætus alitione consumpta. Si de imperfecto, solatio fætus superfluo, loquamur, ipsum exprimi ab vtero in mammas, non quidem ex seroso mesenterij chylo, sed ex dulcioris quoque sanguine, & adiposa omenti resudatione, per ipsummet Hippocratem dicendum.

Secundò nec materia lactis chylus esse potest, vt sentire nisi sunt superadditi, & alij. quorum præcipuæ rationes, & argumenta infra ponuntur, ac soluantur; idq; non aspernendis rationibus, quarum prima est, quòd chylus sit quædam substantia, varia in se, & eterognea complexens: in eo enim, & biliosum, & pituitosum, & sæculentum excrementum adhuc indistinctum continetur; quæ nisi per secundam coctionem, ac depurationem seiongantur, sicuti ad cæteras partes, ita & ad mammas alendas, & lac gignendum ineptum reddunt: nullum autem membrum est, quod ab vberibus huiusmodi excrementa repurget: ergo nullo modo supponendum est, chylum ad illa pro alendo, lacteq; gignendo confluere.

Lactis mar-  
riam nõ esse  
chylum, pri-  
ma ratio.

Quod si dicas, etiam in sanguine similes reperiri succos, ideoq; & in lacte esse posse, respondetur, aliud esse humorem, aliud excrementum: is enim in sanguine necessarius est, vt quatuor elementis respondeat sanguis, varijsq; & variæ naturæ partibus nutriendis idoneus subsit; hoc autem, vti ad nutriendum ineptum, separari in alia coctione desiderat.

Obiectio.

Respon-  
sio.

Item sapor chyli vel insipidus, vel acidulus, vel etiam aliquando acer est, vt ab ijs, qui ructus pariuntur, vel à ructibus studiosè à sano eleuatis gustu, & odore sentitur, & vt à natura ventriculi appetentis, chylificantisq; & à chylificandæ cibationis varijs, ac vt plurimum prædictis saporibus coniungi potest; substantia autem vel nimis corpulenta, si in ventriculo, & intestinis obseruetur, vel tenuis, & aquosa, si in lacteis. Hæc autem non videntur posse à mammarum glandulosa natu-

Secunda  
ratio.



ra in saporem, & substantiam lacti consonam immutari: cum similium partium proprium sic potius attenuare, refrigerare, humectare, quam secus.

**Obiectio.**  
**Responsio.**

Neque aliquis mihi dicat, huiusmodi mutationes à lacteis, & mesentericis glandulis posse paulatim disponi: nam respondeo, vel eas esse plenas alimenti superfluo, & eadem, seu simili lactea substantia, qualis in mammis colligitur (num natura similes sint partes), non autem chylum vehere, ut supra lib. 1. satis à nobis probatum est; Vel ubi chylum veherent, partes esse frigidas, remotas à fonte caloris, membraneas, tenues, & in quibus (si pro transmigratione chyli inseruiant) rapidissimè is moueretur Ideo nullam, vel paucissimam gratiam chyli illinc recepturum.

**Tertiaratio.**

Item quia nulla etiamnum patet via, qua chylus sanguineæ alterationis expers possit ad mammas pervenire: neque enim, ut dictum est, poris, inuisibilibusque meatibus res concedenda fuit; cum hi ad tantam chyli quantitatem, quantam lactis ex mammis unaquaque die exire possent, conspiciamus, referendam non sufficiant; nec quæ ab ijs Auctoribus monstrantur viæ lacteæ, quicquam cum mammis communicant immediate; sed (si eorum dictis standum est) superius in subclavias venas sinistras tenuissimis oculis finiunt, & circulatione media, inde non ad thoracis exteriora, non ad mammas chylus cum sanguine, vel cum chylo sanguis, sed ad Cor vehitur indefinenter: si verò circulatio negetur (ut cuique ingenuè deganda est) non ad mammas solus, acinalteratus exinde chylus, sed una cum sanguine mixtus, vel verius sanguis effectus, indubiè feretur. Ergo non ex chylo lac.

**Nulla lactei  
tubi cum  
mammis co-  
municatio.**

Ex equidem in presertiarum Excellentissimus Torrinus in sua quadā familiari liberè fatetur, se nullam usque adhuc lactei tubi propaginem ad mammas tendentem observasse, nisi quandoque in thoracicam venam, & aliquando (rarissimè tamen) in coniugem arteriam quosdam illius thoracici tubi furculos inferi: quod tamen pro quadam ludicra Naturæ iocositate habet, cum hæc in perpetuis, & necessarijs non sic euacillat, sed se semper, vel saltem ut plurimum, in huiusmodi præstet eandem. Hoc ergo utcumque esset, non de chylo, sed de sanguine verificatur assumptum: quia, siue vena, siue arteria, vasa sanguinea sunt, & minimum succi à plurimo, etiam in extrinsecis, & inanimatis, multò ergo magis inanimatis, per mixtionem euincitur, & immutatur. His additur, quod omnia ferè animalia ouipara mammis carent ex *Arist. 3. de hist. ani. 20.* & tamen ijs etiam lacteas inesse venas, ad subclavias tendentes, Pecquetiani contendunt, item & bruta mammas plurima habent in pectine, quod cum subclavijs, & thoracicis venis nil communicat. Ergo vasa illa non sunt lacti, seu chylo ad mammas deferendo dicata. Quod verò omnem tollit obicem, hæc, ni fallor, sat in primo Libro euicta fuere, ubi non chylum, sed alimenti superfluum in ijs lacteis reperiri ductibus, comprobatum est.

Quod

Quod si nunc quis Bilij imitans vota, venas lacteas à lymphaticis non seungat, contendatq; eas non solum ad subclauias venas, sed & ad pericardium, ad mammas, collum, & caput ramulos transmittere, per quos possit chyli pars aliqua permeare, quamuis mihi adhuc de illius celebratissimi Viri scriptis nil aliud videre contigerit, quàm quæ retulit Deusingius, in primo nostro Libro memorata, nec sciam, eius opinionem alijs vsq; modo probatam fuisse; Ea etiam data, in primis constat, ex eiusdem Viri mente, tenuissimum solum per eas ferri succum roris instar, & sic nec sanguinis, nec lactis proportionatam materiam; item vniuersalius esse illarum venarum officium, cum plures ad alias partes tam superiores, quàm inferiores ex Auctore ipso procedant; & tertio nec ad hoc lactis exquisitum ministerium sufficere, stante paucitate materiæ in illas (iuxta eiusdem mentem) vaporis ritu ab intestinis refundantis (plurimam enim chyli partem, & optimam, in mesaraicas infundi venas, & illius, quæ in lacteas abit, partem quoque considerabilem in lecur progredi, ipse arbitratur), & in plurimas propagiues, easq; tenuissimas omnes abeuntis.

Quarta ratio est, quod, si ex chylo lac fieret, nihil vetaret, quin mulieribus quoque in viridi senectâ constitutis (præcipuè si antea sæcundæ) lac in mammis copiosum colligeretur dummodò opportunè alerentur; & tamen quibus ob ætatem cessant menstrua, lac quoque cessare, vel saltèmaximè imminui, & serosius fieri cernitur, etiamsi non minus edant, potent, epulentur; & valeant: Ergo non ex chylo lac immediatè producitur, sed sanguificationi succedit.

Quarta ratio

Et quamuis hic mihi obijcerent, hanc nos æque ferire rationem, qui in sanguine lactis materiam constituimus, vtpotè cum, & sic necesse esset omnibus, dum sanguis in venis suppetit, lac gigni; Dicimus, longè diuersam de chylo, ac de sanguine rationem esse: quia cum chylus ex ingestis cibarijs in ventriculo perficiatur, nec eius vlla detur naturalis euacuatio, vel defectus, (sed assumptorum quantitati respondeat naturalis chylicatio), patet, si ex chylo immediatè lac fieret, quibuscumque benè cibatis, etiam lac esse futurum. Intellige autem de mulieribus, quibus vbera perfectâ sunt, & suis sinuositatibus, glandulisq; donatæ: Ac de sanguine constat, quamuis is naturaliter in mulieribus copiosius gignatur, suâs etiam inesse periodicâs excretiones per vterum, quemadmodû, & procedente ætate, licet possit mulier ex cibatione lauta copiosam in ventriculo chylosim facere, non tamen in sanguinem ob caloris maiore hebetudinem, & imminutionem sic facillè transire, quin potius præcipua portio in mucositates, & serositates dissuat: Hinc ergo conuenit, vt ex materia defectu lac quoque deficiat in menstruantibus, imbecillis, ætate prouectis &c., quod non esset de chylo, vbi immediatè ad vbera ferretur, in lac commutandus, & multò minus, si nulla ab ijs requireretur cooperatio, & alteratio.

Eisdem satisfit oblationi.

Tertiò: Plura argumenta docent, lac è sanguine generari; quorum vnum

*Hæc è sanguis  
ne fieri, pri-  
mum argu-  
mentum.*

vnum est ipsius lactis dulcedo, & crassiuscula, seu moderata substantia, vniformisq; ac læuis; quæ omnia cum sanguine coincidunt (solo dis-  
sentiente colore). Nec ab vberibus dulcedo, & mediocritas substantiæ  
valde mutuari possunt, cum glandularum proprium non sit tales succo  
qualitates impartiri; nihil enim dat, quod non habet. Nec a simili ci-  
borum, aut potuum, nec per consequens chyli qualitate: quia tùm non  
semper talis dulcedo ex cibis prouenit, qui non rarò, maximè à mulie-  
ribus, acidi, acetosi, acres, insipidi &c. capiuntur; tùm non vana illo-  
rum opinio est, qui acidulum fermentum à liene in ventriculum instilla-  
ri, vel saltem pro appetitu conciliando, opinantur; ex quibus ritè infer-  
tur chylum acidæ, vel saltèm insipidæ qualitatis generari. Adde, &  
talem per ructus sentiri in ijs, qui facillè eructant, vel etiam studiose  
flatus eleuant, vt dictum est: Ergo ex proxima eius materia, nempe ex  
sanguine, hæc lacti obueniunt.

*Secundum  
argumentum.*

Alterum argumentum est, quod lactis prouentus, vt plurimùm sup-  
ponit menstruorum retentionem, vel saltem (vidi siquidem sæcundam  
mulierem, quæ sine menstruis vitam continuè degere mihi asserbat,  
concepisse, peperisseq; pluries, & lactasse), ætatem menstruis compe-  
tentem. Menstrua autem sanguis sunt, non alius humor, aut chylus in  
sana muliere: Ergo ex ipso sanguine lac gigni, arbitrandum; quo enim  
presente, aliquid gignitur, & absente cessat, magnum de sui concursu  
ad rei generationem præbet argumentum.

*Tertium ar-  
gumentum.*

Vtteriùs: cum lac nimium sugitur, sanguis ad lac consequitur: ergo  
ex eodem sanguine lac gigni, dicendum. Et hoc Hipp. argumentum  
est lib. de hom. struct. 6. Dicent, ex nimio sucto aperiri ora venarum,  
quæ aliqui occlusa erant. Respondetur, ex iisdem tunc papillæ oscil-  
lis sanguinem exire, è quibus antea lac exierat: quare non est, vt quæ  
oculis patent, oculiioribus obscrentur: vnum enim ex his necessarium  
est, vel scilicet lacteos tubulos cum venis ipsis continuari, vel harum  
ora in eos conuiuere semper, ex quo lacti excreto succedat sanguis.

*Quartum ar-  
gumentum.*

Præterea: Lac in internis mammarum tubulis continetur, & ab ijs-  
dem exit: illi autem cum venis, quæ sanguinem continent, continuantur  
intimiùs, & cum exterioribus quoque sanguineis per plures anasto-  
moses communicant: ergo communis quoque earum est succus, solaq;  
partis propria actione euariatus. Deusingij enim opinio, asserentis,  
eosdem tubulos esse vasa alterius generis, inuicissimilis est; tùm quia  
fines omnium vasorum exiliores cum sint suis truncis, non deberent hi  
anatomicos oculos latere, sed imò, sicuti illi ab omnibus conspiciuntur,  
ita & hi clariùs cunctis apparerent; quod tamen adhuc nemini datum  
legitur: tùm quia a tot alijs Anatomicis pro constanti affirmatur, eos  
venis thoracicis continuari, sicuti, & ijs alias obuiam venire venas, ab  
vtero per rectos musculos ascendentes, & in easdem inferi, vt & a Bar-  
tholino ipso loco nuper citato admititur. Spes autem, quod veniant  
anni, quibus Oceanus vincula rerum laxet, nimis huculque nobis adu-  
lata

jata est, itaut iam tempus sit ab ea nos abscedere, & cum nostris Parentibus idem sentire.

Amplius: Lac probum, & copiosum supponit mulierem optimi succi, Quintum argumentum.  
ac sanguinei habitus, non copiosam chylicationem: videmus enim aliquando mulieres sese copiose alentes pauciferum, & miserum lac procreare, si malè temperatæ sint, aut crebris menstruationibus assuetæ; & contra alias sese frugaliter cibantes, eo quia sanguinei habitus sint, & menstrua desistant, multum lactis procreare.

Item: Si mittatur sanguis ex basilicis, alijsuè brachiorum venis, Sexum argumentum.  
etiam si mulier consuetè alatur, lac manifestè imminuitur, ac ad superiora retrahitur; & contra mulieri sanguine plenæ, etsi ieiunium moderatum seruet, lac nec sic citò deficit, nec imminuitur quicquam: Ergo sanguis ipse, non chylus est materia lactis.

Adhuc: Si lac retineatur, mammæ inflammantur, & in pus phlegmone vertitur, ac si sanguis retineretur; & impedimentum lactantes manifestè sentiunt in venis versus axillas commeantibus: Ergo parùm à sanguine lac deffert, vel potiùs sanguis albus est: Alioqui chylus, cum subfrigidus sit, non videtur posse inflammari. Nec dicant, id ex sanguinis miscella euenire: quia sic etiam suos vastabunt de lacteis venulis conceptus, & fateri cogentur, sanguiferas venas lacteis, & lacti materiam suppeditare. Septimum argumentum.

Quinimò Mulieribus, si ob lactationis cessationem, vel cum hac, Octauum argumentum.  
mammarum tumor, vel spatularum, dorsum; grauitas, vel ex his febris superueniat, phlebotomia à brachijs celebrata mirificè confert, vt mihi praxim facitanti non semel videre obtigit: Ergo non chyli, sed sanguinis vbertas ex ea lactis intermissione concepta erat: Hoc enim ostendit magnum illud Hippocratis argumentum, sanatio: Ergo eorum alterutrum ex altero.

Iussum: Lactatos pueros non parùm in animi moribus, & sensuum concupiscentijs lactanti mulieri, quamuis non matri, assimilari videmus: ideoq; apud laudatissimos Authores summè probatur, vt pueri, lac sumpturi, tradantur mulieribus bonæ indolis, & famæ. Huius exitus nulla alia causa reddi potest, quàm à nutriente lacte hoc prouenire, quod cum Corde, & lecore, in quibus animi, & concupiscentiæ sors ex Platone, & Galeno residet, sympathicam naturam obineat, vel ab ijs quoquomodo progerminet. Huiusmodi autem conditionem non aliunde melius lac venabitur, quàm à proxima sua materia nempe sanguine utroque venali, & arteriali, qui similibus fontium virtutem latè consequitur. Quomodo autem à chylo id obtinebitur, qui solius ventriculi soboles, intestinorum postmodum, & exanguium ductuum solam actionem, vel contactum experiretur? Nonum argumentum.

Posset hic aliquis dicere, etiam chylo, & lacti ipsi sympathicam aliquam qualitatem à Corde per impartitos spiritus posse communicari, vel in ventriculo, & deferentibus vasculis lacteis, vel in vberibus ipsis; Quedam soboles obineant.  
Ff quæ

quæ illi adeo vicina sunt. Respondetur, solos spiritus esse substantiam fugacissimam, summèq; dissolubilem, vt ideo in auras abeant facillimè; non ideo illis referendam esse illam morum assimilationem, quæ adeo fixa est, vt multoties toto vitæ curriculo perseueret.

**Decimum argumentum.** Præter hæc: Si mulier lactans cacochima sit, etiã si benè coquat ventriculus, beneq; alatur, lac tamen in ea prauum erit, & eo colore, & sapore infectum, quò humor in venis euincens. Sic si mulier biliosa fuerit, lac sublaudum; si pituitosa, candidum, & aquosum; si melancholica, atrum; si cachectica, serosum conspicitur; Et sic Nutrices tunc ritè, & phlebotomia, si opus sit, & purgatione curantur: Signum ergo, lac ex illo venali succo, seu sanguine procreari, non autem ex chylo, immediatè ad vbera lato. Nec dicant, ex chylo huiusmodi posse inquinamenta lacti parari in corpore prædicto ob qualitatem illi in ventriculo aduentam exuperanti humori analogam: Aduertant enim,

**Obiectio prima.**

**Solutio.**

argumenti vim in similitudine lactis cum redundante sanguine, data opportuna cibatione, consistere. Dicimus ergo, hoc præmissis, inuerrisimiliter illud obijci: quia primò non repugnat, posse cum sanguinis prauitate ventriculum sanum dari, à quo, si additur cibationis probitas, non potest chylo talis praua qualitas obueneri. Secundò constans est omnium ferè opinio, excrementa biliosa, & melancholica ex secunda coctione generari in iecore: ergo non in chylo: Tertiò quia etiã si cibi assumantur contrariæ qualitatis, non nisi post aliquot dierum continuationem, aut corpore expurgato, lac desinet esse illa labe infectum. Si verò dicant, è chylo e contra eadem posse vitia lacti attribui ob ciborum prauitatem, vel ventriculi affectionem etiã si sanguis in venis probus adsit: Respondeo, argumentum hoc pro chylo non æquivalere ei, quod pro sanguine iaciebatur: nam in hoc, quamuis detur praua chylicatio, non inde sequitur, si prauum lac in puro corpore fiat, è chylo immediatè hoc prouenire: quia idem potest mediatè accidere, scilicet per illam sanguinis portionem eo ex chylo gemitam, & ad vbera lapsam, ex eo quod errores primæ coctionis ægrè ab altera corrigantur; Et hoc si semel, vel rarò fiat; cum alioquin non posset diuturnum ventriculi, eiusuè actionis vitium non toti corpori, ac sanguini toti citissimè comunicari: At in nostro pro sanguine argumento necessaria currit cõsequentiã, quod, si sanguini prauo lac assimiletur, dum chylus probus supponitur, non potest non ex sanguine vitiato lac fieri.

**Obiectio secunda.**

**Solutio.**

**Undecimum argumentum ab auctoritate.**

Tandem ex sanguine lac esse, habetur ex *Hipp. lib. cit. de hom. struct. 6.*, ex *Arist. 4. de generat. ani. 8.*, ex *Gal. 5. de simpl. med. facul. 22. ex Alexandro 2. probl. 80.*, ex *Auerroë in comment. Aristot. Inter Recentiores doctissimè hoc differunt Mercat. lib. 4. de morb. mul. cap. 16.*, & *Zacut. Lusit. lib. 6. de Med. Pr. hist. 6.* Idem plurimis alijs eorum Antecessoribus, & Coætaneis tum Latinis, tum Græcis, tum Arabibus Medicinæ Scriptoribus placuisse, nulli non notum, itaut superfluum sit alios hic congerere, citareq; nominatim Auctores.

## CAPVT SECVNDVM.

*Multa contra afferuntur Neotericorum, pro chylo pugnantium, rationes, obiectiõesque, & solvuntur singula.*

**C**ontra hæc autem insurgentes, ac pro chylo pugnantes superius nominati Auctores, afferunt in primis exemplum mulieris lactantis, ob diuturnum ieiunium mammas vacuas habentis, quæ mox ingestio cibo, potuque, sensit, sibi vbera lacte repleti, antequam potuerit cibum ille vix digeri, nedum in sanguinem conuerti; Et quo putant, clarescere, à chylo lac fieri, non à sanguine.

*Prima ratio, quod ex chylo non ex sanguine lac fiat ab euentu sumpta.*

Facile erat autem iustam euentus causam reddere, absque quod ad repentinam, immediatamque chyli traiectionem recurrerent: nam cum glandulæ omnes partes sint omnium nostri corporis partium imbecillius, non quidem à corpore indigeno, ac famescente succus pro suo alimento, & lacte; sed imò aliæ validiores partes simili in casu trahent ab ipsis glandulis, & sanguinem, & multò magis superfluum illis lacteum succum: non enim tunc possunt à iecore, liene, corde, cæterisque visceribus, nec à maioribus vasis concupitum alimentum suscipere: quia viscerum vnumquodque in indigentis pro se ipso retinet, & potiùs aliunde, nempe à propinquis vasis maioribus, trahit, & hæc à minoribus, ut in sua moderata plenitudine naturali seruentur. Vnde accidit, ut à parte post partem imbecillioribus contingat inanitio. Deraçtum ideo lac è mammis ipsis in vicinas venas retrahitur, & quasi suspenditur; quod inde, cibo exhibito, cum membra, venæque; aliunde, & à suis principiis, ac radicationibus naturalibus, quæ statim à pleno ventriculo aliquid tenuioris alliciunt, sanguinem pro alimento habeant ad mammas quoque statim, quod suspendebatur, recurrere finitur, imò reponitur. Et hoc verisimilius multò est, quàm putare, cibum ingestum subito in mammas currere, & laceuadere. Videmus siquidem, etiam post duas, vel tres horas cibum in ventriculo in coctum, & dissimilem adhuc esse pluriès, nedum lac factum. Et quæ coctio dabitur subitanea? vnde similis assumptorum in lac mutatio, ut vinum rubrum, viride edulium, flauum pulmentum, subito fiant alba, & lactis consistentiam crassa alimenta acquirant?

*Solvitur.*

*Cut venio ob famem mammas, cibo sumpto, lac statim suppeditatur.*

Dicunt etiam, impossibile esse, si lac ex sanguine fieret, tantam à muliere expectari posse lactis quotidianam excretionem, quanta sit ad libram, & amplius, cum videamus, à venæ sectione facillimè eam imbecillitari. Respondetur, non esse rationem vniformem: quia in phlebotomia emittitur sanguis à maioribus venis, quæ vniuerso corpori, & principibus partibus præsertim pro promptuario deseruiunt, isque cum multis spiritibus, & ea cum violentia, qua totum venosum genus ad vniuersam consecutionem exagitur: At in suctione lactis soli mammarum

*Secunda ratio, à lactis quantitate desumpta.*

*Solvitur.*



Curia lacta-  
tione non  
adeo patia-  
tur mulier,  
vt à phlebo-  
tom la-

tubuli peculiare sine ipsarum vi, imò cum iucunditate, inaniuntur; sine spirituum iactura, qui in lacte paucissimi sunt; nec solo sanguine, sed quocunque alio superfluo illarum succo, qui non modicus est, sicuti dicitur inferius: vt propterea, si modus adsit, potius leuetur multa mulier, quàm patiatur. Alioqui, si excessus adsit, mulieres extremè pati in totius habitu corporis nutriendo, & febribus corripì, capitis doloribus, oculorumq; inflammationibus, & imbecillitatibus vexari, consuetissimum est; quæ non fierent, si suctio illa venas sanguifluas minimè tangeret, sanguinisq; ac spirituum motus non fieret, ac deperditio. Neque omnes ea lactis vbertate gaudent; vt puerum sine virium iactura lactare diù valeant: Sed ex solæ, quibus, cum edaces sint, & sedentariè viuant, validus ventriculus, optimum à Natura Iecur donatum est.

Denudò quan-  
titas lactis  
incalescit  
& deterior.

Sed repetunt, tantam aliquando lactis copiam in dies excerni, quantà vix sanguinis venæ includunt. Ad quod valet, nonnullas mulieres binos lactare pueros; Item ex *Aristotele 3. de hist. ani. 21.* in Epiro boues aliquando amphoram lactis singulo die reddere, quæ ad nonnullorum computum libras pendet octuaginta: At verò dicitur, positum casum suè in muliere, suè in boue nimis hyperbolicum esse, dum illa, libris vigintiquinque plus minusuè sanguinis gaudens, sola vna lactis libra, vel paulò pluri priuatur, quod eodem die ab edace ventriculo, euehy-ma cibatione, & valido iecore per aliquod tempus commodè reponi potest.

Mira eandè  
quantitatem  
aduertentia  
prima.

Interpreta-  
tio Arist. cir-  
ca lactis vac-  
cæ quantita-  
tatem.

Vt autem melius intelligatur res, aduertatur primò, rarò fæminam duobus infantibus lactandis sufficere posse, nec nisi per paucos menses priores, in quibus parùm lactis sugunt, vel cum aliquo alterius mulieris, aut alicuius delicatuli cibi adiutorio; quæ imò sic etiam valde patitur, itaut vel citò desistere cogatur, vel infirmetur. Quod verò de bouibus ex *Arist.* afferunt, sciri debet in primis, in Epiro ob pascuorum pinguedinem, & vbertatem Vaccas maximas euadere, vt propterea, (sic ipso referente Auctore) mulgentes erecti stare debeant; deinde amphoræ nomen vt plurimum genericè assumi pro vase quolibet, quo aqua manibus adfertur, inderti quidem, sed longissimè minoris ponderis capax; & ita ab *Arist.*, qui Medicis mensuris nobis erat adstrictus, sumptum esse, necesse est; sicuti videmus, & in Evangelio Lucæ cap. 22. hoc modo amphoræ sumi nomen. Aliter pro fabula haberi deberet, Vaccam, quamvis grandiore, octuaginta libras lactis singula die producere, si nostras consideremus, quæ paucas libras depromunt; *Aristotelemq;* potius ab aliqua hyperbolici Ruralis relatione deceptum, quam suamet obseruatione nitentem, talia protulisse, dicendum esset.

Aduertentia  
secunda.

Aduertendum præterea, duplex lac esse; probum scilicet, & laudabile, sanguinis consistentiam æmulans, & crudum, serosum uè. Si de primo loquamur, pauciferum à muliere gigni, & vix ad infantis nutritionem suffecturum, videmus; adeo ut qui delicatius infantem educant,

# CAPVT SECVNDVM. 119

non vnicam, sed duas eligant Nutrices. Si de secundo, copiosum lac exire, ac gigni posse, suctus frequentia, ac vi, ex sanguinis crudiori, ac ferosiori parte, non est dubium: eo enim tempore à iecore per ramulos suos mammx sugunt, hoc verò à ventriculo, & intestinis cibum, & potum semicotta rapit, vt possit suctioni reddere. Quare in simili castu sæpè, & abundanter cibari, biberequè cõgitur mulier, & vitam sedentariam ducere, ad hoc, vt paucissima fiat in corporis reliquo dissolutio. aliter si vellaboret, vel moderatè, parèq; cibetur, & lac deficiet, & lactans extenuabitur nimis. Neque tamen serosum hoc lac (ni nimium pro nutriendo partu omniò absonum est, si & pro cibo, & pro potu inferuire debet, & ventriculi, iecorisq; coctionem experitur, à quibus postmodum pro intestina, fel, lienem, ac renes omnigena recrementa, seiunguntur.

Hic obijcit Deusingius, quærens, quomodo ab illo suctu crudior, & ferosior tunc tantum sanguis è venis allicitur, & non reliqua mulla sanguinea, vel ipsius imò pars spirituosior? Huic responsum velim, dicendo, tum à venis ipsis, tum à cæteris alendis partibus validioribus probum, purioremquè trahi, & retineri sanguinem; reliquum verò crudio- rem, ac ferosio- rem, vt minus familiarem, non solum fugi permitti, sed imò, si liceat, ad imbecilliora vbera pelli. Et hinc patet nunc, cur singula die persentitur vel bonitas, vel prauitas lactis, prout vel probis, vel prauis vtitur alimentis, sœmina lactans.

Si verò insitet, quomodo deceat, lac ex ferosiori illa sanguinis portione gigni, & non ex tota sanguinea massa, vt in venis iacet, & vt pro reliquo alendo corpore exquiratur; dicimus, quod, si modicè vbera inaniantur, lac ex sanguine concoctiori fiet, & ipsum magis perfectum, & alimentosum erit: at si nimis rugantur, vel mulgeantur, mulier exsiccat magis, & ideo frequentius cibari, potareq; semicotta à iecore rapi, & sic à venis in vbera exportari, vt diximus, est necesse: quæ tamen (si paruus sit tenuitatis excessus) non inconueniunt in infante; cui duæ illæ ventriculi, & iecoris coctiones lac purificant, ab excrementis expiant, & in sanguinem alendo commodum conuertunt. Et hæc est differentia, quæ inter lac à puero deglutitum, & sanguinem in venis Nutricis contentum reperitur, superius in responsione ad rationem hanc secundam contra nos allatam deducta, ad indicandum, cur non adeo, vt à phlebotomia, à lactatione mulier imbecillitetur.

Addunt, medicamentum epotum, vel cum cibo à Nutrice sumptum puerum citissimè expurgare, quod & Hippocrati placet, dum dixit Mulier, & capra elaterium comedentes pueris purgatio; quod non esset, nisi chylus ad mammas breui via irrueret. Respondetur, medicamenta, si valida, etiam si in ventriculo morentur, (nec enim, vt cibi, coquantur, vel vt alimenta, trahuntur ad membra) à distantissimis attrahere partibus ea, quæ secum inde per latam intestinorum viam deducit; idq; ob purgantes, halitus in vniuersas regiones transmissos: non mirum

Ad sanguinem ferosio- rem obijctio Deusingij tollitur.

Cur lac ex ferosiori sanguine gignatur.

Tertia ratio à medicamentis efficacia, lacti comunicata.

Cur lactans exhibitum medicamentum puerum purget.

rerum generatio, & generatarum alitio. Chylus ergo in femina sanguis fieri debebat, vt vniuerso corpori, & vberibus ipsius vniuersale esset idoneum alimentum. Ex eo in his lac superfluit non sui ipsius, sed alterius gratia. Ad nutriendum quippe puerum idoneum multò magis lac, quàm sanguis: illud enim ventriculo proportionatum tam quoad temperamentum, quàm quoad secundarias qualitates gustui, tactui, & visui iucundas; hic verò minimè, qui extra venas concreuit, animiq; deliquit, veneno proximus inducit, nisi aliquo condimento, aut coctura præueniatur, & præmuniatur extrinsecus; vt propterea sibi sanguinem exire non modò, sed & sanguinem sorbere natura ipsa, à nullo edocta, abhorreat. Addo nec sic futurum fuisse congruum: nam cum Adultis opus esset forinsecus cibum capere, pro quo assimilando diuersas in corpore coquinas ordinatè Natura construxerat, dedecebat eas, vbi perfectæ sint, otiosi omninò, sicuti è contra incongruum fuisset, eas, adhuc teneras, cibis fortioribus oberari: otiatæ autem fuissent, si sanguine ipso puerulus nutriretur. Et sic lac parauit Natura, faciliè à ventriculo, & iecore euincendum, vt sanguis redeat, & paulatim inde alijs hæc viscera assuescant minus similibus alimentis. Declaro autem membrum illud distinctionis præfatæ, scilicet circuitus huiusmodi in aliud subiectum à Natura permitti, imò quæri exteriori hoc exemplo, quod in animalibus ex chylo sanguis gignitur, ex eo caro, ossa, membraq; alia nutriuntur, lac ouaq; sunt, vt inde à nobis edantur, iterum in chylum, sanguinem, & carnes commutanda.

Dicent, si per nos factus in vtero nutritur sanguine, potuisse quoque in lucem editum eodem nutriri: Sed diuersa ratio: nam in vtero sanguis per vmbilicales venas recta in iecur, venas, & Cor factus ingreditur, atque pergit; foris autem per infantis os, & gulam in ventriculum, & sic extra venas abiret, & pathemata idèò indicta non euitarentur.

Subiungunt: Si lac ex sanguine fieret, mulier lactans, quæ solita erat tantum sanguinis congerere, vt lacti producendo sat esset, si ob necem pueri, vel quod aliud accidens à lactando desistat, in manifestam plethoram, & quem alium ex repletione affectum incideret: quod tamen non obseruatur in praxi. Respondeo, efficacissimam esse hanc rationem; verum dictam experientiam omninò imperfectam, & hebetem. Etenim, si mulier iuuenis, lacte abundans à puero lactando subito cesset, si benè adhibeatur mens, videbimus primò, mammarum turgentis, ac doloribus, &, nisi lac extrahatur, phlegmonibus, horroribus, ac febribus subijci, ita ut cogatur per vices catulo, aut arte aliqua (ni puer alius addit) lac extraducere, indequè alimenta sibi subtrahere, vt paulatim natura ab illa vberitate desuescat; plethoram verò inde subsequi, & mala alia, nisi ea in cibo, potuq; valde se moderet, menstrua superueniant, & exercitio, aut quid æquiualens natura, vel arte superindantur; Hincq; euenit, quod, si mulieri à morbo aliquo aggressæ subito tollatur, & ablactetur infans, augetur febris, & alia symptomata accedunt.

Si

Lac puero  
nutriendo  
idoneum ma-  
gis, quàm san-  
guis.

Alia respon-  
sio.

Cor factus sa-  
guine. puer  
iste marum  
pascitur.

Septime ra-  
tio ab euen-  
tu ablactatio-  
nis eruta.

Soluitur;

Que ablacta-  
tione super-  
ueniant, &  
eundem  
modum.

Aegre mulie-  
ri subito lac-  
tata desinem  
si augetur  
morbus,

Si verò ob longuin lactationis tempus, vel corporis, & virium imbecillitatem Nutrix parùm generet lactis, etiam si ei tollatur infans, non patietur, vel minimùm, & paullisper; sed imò pinguescet, roborabitur; & ad mediocrẽm statum redacta, vel menstruabit, vel concipiet, vel, sic Natura docente, cibationes imminuet. Aliàs, & ipsa tandem patietur. Hæc vera praxis, & observatio nostris his in Oris, nisiq; forsitan alia sit alibi mulierum natura, fors, consuetudo, victus, aerisq; ac Cæli constitutio, talis vbiq; vigens.

**Quæ ratio**  
à puerperis,  
& mensuris  
lactanti pro-  
sequenter  
addita.  
**Solutur.**

**Cur puerpe-  
ria lactanti  
minimè re-  
sistantur.**

**Lactantibus  
plurimis ec-  
citant men-  
strua, & qui-  
bus sunt,  
rarò, & pa-  
cis.**

**Non ratio  
ab obesa te,  
vel extenua-  
tione lactan-  
tis sumpta.**

**Solutur, &  
cur obesa  
ecpna, & gra-  
cilibus lacta-  
leopia sub-  
sit, ratio ad-  
dita.**

Insuper: siuè ab vtero, siuè aliunde (dicunt) ad mammas pro gi- gnendo lacte sanguis conflueret, necesse esset puerperis tertia die, quan- do plurimis vberim mammarum intumescunt, & lac emittunt, puerperia sisti; item nec lactanti menstrua prorumperent: Et tamen in illis viden- sur nihilominus profecti ab vtero fluxum, & his nonnunquam men- strua exire. Respondeo iterum, efficacem esse rationis vim, si suppo- sita in conceptis terminis subsisterent: At non subsistunt: nam puer- peria, nisi aliquando ob immaturitatem ex nimia vi, aut alio casu venæ aperiantur, verè sanguis non sunt, sed, omnia ferè excrementa sangui- neo colore tincta, & nonnunquam albicantia, ac serosa, ideo lochia dicta; quæ ex fætus (qui nitidiore alitur succo) enutritione superfue- runt in matris corpore, & hiant vtero, facillimè tum ab eius cavitare, tum ex vasis ipsis adhuc resudantibus, & se veluti in cloacam expurgan- tibus extruduntur; sanguine interim, qui solitus erat in fætus alimoniam absumi, ad mammas recurrente, & deinde per suctum etiam à Clauæ furculis thoracicis eodem allecto. Ergo diuersitas excretæ, & excer- nendæ materiæ, & loci disunctio, sese inuicem non impedire excretio- nes efficiunt. In plurimis quoque lactantium cessant menstrua natu- raliter, itaut ex decem lactantibus vix vna ea efferat, & hæc quidem parcius, rarò, & non nisi quando lactis exitus ad sanguinis superflui excretionem non sufficit: Sunt enim quædam mulieres adeò sanguinis feraces, vt mirum, quanta in copia per vterum, hæmorrhoides, & nares sanguinem ad tempus euacuent, si in orio degant. Non absurdum tan- dem, corpus plenum per plures euacuari partes.

Superaddunt: Si mulier obesa, & carnosâ copiam lactis producit, quæ tamen venas tenues nanciscitur; & è contra excarnis, cui venæ cunidiore apparent, lactis inopia laborant; quomodo dicimus, ex sanguine lac procreari? manifestum quippè, vbi maior sanguinis quan- titas insit maiorem, & lactis copiam sic fore. Respondetur, in carnosiss, ac pinguibus, vt potè affluenter enutritis, minimùm nutrimenti partes trahere, & sic vberibus totum superfilium libere permitti: in extenuatis verò, si sanæ sint, partes omnes auidè trahere, itaut vberibus modica pars relinquatur, nec superflui quid, vel parum sublit: (huiusmo- di quoque vix inestruantur), sin ægræ, sanguinem fore primum, terrem, ac faculentum, id eo: lacti gi gnendo inopium. Respondetur secundò, corpora plena, obæsaq; vt plurimum frigidiuscula, & sic mi- nus dissolubilia esse: excarnia verò siuè gracilia, calidiora (vt quibus calor

## CAPVT SECVNDVM. 233

calor non ab humiditate retunditur), & consecutiue magis dissoluentia, & alimenti conterentia: vnde, sicuti in illis parum sanguinis magnam potest fouere, & suppeditare excretionem, ita in his plus eiusdem minorem sensibus exitum obijciat. Respondetur tertio, obefulis vbera inesse turgida, pingua, carnosae, & glandosae magis et sic lactis feraciora; in gracilibus e contra mammas quoque subsidentes, graciles, membraneas, & glandularum egenas, & sic minus facundas, vel steriles esse. Respondetur quarto, in extenuatis venas apparere amplas non quia magis plenae sint, sed quia caro illas non integit, nec premit, sed semiuacuae flauescunt, & subsident; vbi ex altera in carnosae venae à carne premuntur, tegunturq; & ideo tenuiores oculis apparent: quare aliud est videri, aliud realiter esse sanguinis vbertatem. Hoc vnum scio, si sanguis abundet probus, mulierem non extenuari, sed succulentam esse, & lac copiosius suggeri à muliere habitus medioeris, quam à pinguiuscula, cui mammae quidem aliquando maiores, sed lactis inaniore adfunt.

Prosequuntur: Nulla ratio videtur posse suadere, cur factus in vtero sanguine crudiore nutriatur, foras vero emissus eo concoctiore (cuiusmodi lac esset, si è sanguine fieret) fruatur. Respondetur, lac, etsi ex sanguine à mammis conficiatur, & in candidum vertatur, non posse dici sanguine, respectu alendi pueri, concoctius, sed imò minus: nō enim ex quo simpliciter, sed & quale aliquid sit, & est, consideratur: mammarū autem, seu glandiū natura frigidior, sanguinem quoque in frigidiorē naturā, dum illum sibi assimilant, conuertit, vt habetur ex *Gal. 5. aphor. 40.* Quare, respectu infantis, ad sanguinem generandū, lac infra subsistit, & concoqui vterius possit: quamuis respectu mammarum ipsarum, cum lac sit earū nutrimentum proximius, verius dicatur sanguine magis elaboratum. Ergo constat, ex eo, quod statuamus, lac ex sanguine fieri; non posse tamē dici, infantem teneriori ali cibo quam factum, sed imò crudiori: Et id iure, cum in illo adfit ventriculi coctio, quae in hoc forsatiotior.

Afferunt praeterea, magnam partem lactis in nutritibus à potulentis fieri, eaq; citissime in lac conuerti, quod fieri posse non videtur, si in sanguinem prius sunt vertenda. Respondetur cum *Hipp. 2. aphor. 11.* facilius impleri potu, quam cibo; cuius causa est, quod ea minimam à ventriculo alternationem expetunt, cum dissoluta, & liquida sint, itaut facillimè à iecore, si famelicum sit, attrahi simul, & concoqui possint; „ maximè autem vinum, quod, vt ait *Gal. 3. de temper. 2.* vt assimile- „ tur, mutationem desiderat minimam; quo fit, vt tūc nutriat, tūc ro- „ borec celerrimè. ] Vnde, & *Hipp. 2. aphor. 21.* dixit famem thorexis, „ idest vini potio, soluit. ] Non itaque mirandum, in lac etiam citissime conuerti.

Adiicit Deusingius, lac generari è chylo, demonstraui ex magna similitudine, quae est inter lac mammarum, & succum, qui in pancreate, & lacteis venis reperitur. Respondeo primò, aliquam quidem simili-

Decima ratio, à diuerso factus, & infans alimentum petita soluitur.

Lac vario respectu, & magis, & minus concoctum sanguine dici potest.

Vndecima ratio à citissima potulentorum in lac conuersione. Soluitur eo, quod potulentum facillimè à ventriculo, & iecore coquantur,

Duodecima ratio à similitudine lactis, & lactearum succi ducta. Soluitur.

litudinem adesse, sed non totalem, cum aliquantum substantia differant: quia qui in lacteis, & pancreate reperitur succus, valde tenuis est, & aquosus, lac autem crassum; hoc dulce, læue, ille varius, & forsan insipidus. Secundum non esse mirum, quod assimilantur, cum ex simili materia vterq; generetur succus, nimirum ex sanguine; & à similibus partibus, nempe glandulosis, pinguibus, spongiosis; & ad eundem finem, nempe ob sui alimoniam: quamuis in vberibus ob suctionem, & glandium, magnitudinem, sic Natura dictante, copiosior superfluat succus ad commodum infantis: In paucissimis enim lactearum album succum esse chylum, qui ad Iecur eat: in plurimis verò alimenti vbertatem cum serositate ijs partibus familiari, sat fuit primo Libro commonstratum.

Cui hi assimilantur succi.

Decimatercia ratio, à sensu lactantis, cuius soluitur.

Multa mulierum dicta minimè cre-scenda.

Quid sit, quid ad vbera ascendente perferantur.

Decimaquarta ratio, à lege circulationis, in-subsistens.

Decimaquinta ratio, à natura, & viciis sanguinis, sumpta.

Soluatur.

Afferit insuper, lactantem aliquando post potum manifestè sentire eiusdem per latera ascensum ad vbera. Ad id respondeo, multa à mulieribus enarrari, quæ ob sexus leuitatem minimè sunt credenda: vt enim ad delicata pocula inuitentur, quid prohibet, quin dicant, se statim instaurari totas, lactificari, & vbera lacte impleri? Sic enim, & multotiès (cum ex altera sint salaciores), se nil in coitu delectationis perferri prædicant, vt ad illum maioribus blanditijs irretiantur. Sed esto, talem sensum ascensus esse verum; nùm propterea dicendum, illā potionem statim ad vbera eleuari? hoc vanum: nam si statim ab vberibus ore, vel manu lac aliciat, non potionis colorem, non saporem, non substantiam, sed costi lactis speciem præferret; nec è rubro in albū, e tenui in crassum, ex austero (talìa enim nonnunquam pocula sunt) in dulce quid sic festinatè mutatur: Itaque coniiciendum, solos vapores, (qui quoque ad Cor, & caput sensibiliter efferuntur) mammas petere; qui si ibi in aliquantulum quoque humiditatem degenerare asserantur, non omnino absolum.

Illud etiam argumentum desumptum ab arteriarum impulsu, ex quo sanguinis extravaasio, phlagmone, & lactis plenitudo oriri posset, quæ viderentur circulo sanguinis supposito opponi, nil nos vrget, qui circulationi prædictæ nullam habemus fidem sanguinemq; non per arterias tantum, sed multo magis per venas ea in quantitate, quæ deceat, & opus sit, illuc ferri cum Galeno, cæterisq; contendimus, sicuti præcedenti Libro sat clarè demonstratum fuit. Et hoc idem pro nobis ibi fuit adductum.

His nonnullas alias rationes adiicit Paulus Franciscus Pallierius loco supracitato, quas hic libet breuiter ventilare. Ex prima quidem, quam addit, est, quod longè distat natura sanguinis à lacte, obscuræq; sunt viæ, per quas ad mammas deferri possit: quamuis enim cum Hippocrate sanguinis refluxum ad mammas ab vtero pro lactis genesi admittant nonnulli, & mammarias assignent venas, non tamen eæ sunt, vt per illas tanta sanguinis quantitas continuè fluat. Sed quantò veridicentius hæc suo chylo obijcientur! quantò enim longius à luna aer, quam ignis tantò



tantò à lacte chylus, quàm sanguis, distat magis. Quippè si lac dulce, chylus acidulus, si illud consistentia mediocri, chylus vel in ventriculo pulceus, vel in lacteis aqueus cernitur: E contra verò sanguis, & sapore dulcis, & consistentia medius adinuenitur. Et de vasis quidem multò meliùs eadem sibi possunt reponi: siquidem, si de sanguine loquamur, mirum, quin cum puduerit talia de vasis ad mammas deferentibus proferre; cum, si de mammarijs loquamur, nullus adeo ignobilis Anatomicus sit, qui eas non designet per rectos musculos ab vtero ascendentes, cui aliae descendentes obuiam fiunt: si verò de superioribus, quæ veriùs lactis vbertati deferuiunt ( & hoc in lactis retentione dignoscitur, in qua humeri, & dorsum grauantur ) clarissimè tum ab axillari vena extrinsecus, thoracicas superiores dictas; tum ab eadem sub ossè pectoris interiùs vsque ad mammarum glandulas (mammarias quoque venas nuncupatas) deriuat *Bartholinus cit. lib. 2. anatom. reform. cap. 1.* Verunque autem sit, manifestum cuilibet est, copiosissimos venarum, & artiarum fines in mammas inferi; vt propterea in ijs facillimè canceri enascantur, difficillimè curentur, & ijs abscessis, vix sanguinis arceatur fluxus. Hæc verò quis verè de suo chylo dixerit? cuius ductus nemo adhuc vsque à ventre inferiori ad mammas delineare potuit; & meritò cum nulli adsint pro lactis chylosa materia ferenda idonei, vt supra diximus. Nec scio, quomodo sic lata fronte asserat ipse Pallierius, à thoracico tubulo per thoracem lactiferos spargi ductus, cum cæteri omnes nullas à dicto tubo progerminationes quàm in subclauiam venam agnoscant, vt illum nonnulli calamo scriptorio non incongruè assimilauerint.

Altera eiusdem ratio est, mammas vti frigidæ, & glandosas, ineptas esse ad sanguinem pro lacte gignendò elaborandum; cum potiùs ad corporis tollendam redundantiam aptæ esse videantur. Hæc tamen ratio valde imbecilla est: quælibet enim pars viuens, imò & planta, quamuis natura frigidissima, ad se deductum succum, quisquis fuerit (dummodò non extraneus) in sibi similem qualitatem alterare est potius. Vbi autem omnia cætera cessarent, sola pulmonum, & Cordis, in quibus natiui caloris fucina moratur, vicinitas omnem argumento efficaciam prostermit. Sed & quod ijs, quibus vel ob morbum, vel ob ætatem glandulæ absumptæ, & pinguitas elapsa est, quantumuis probè alantur, & emulgeantur, lacte carent, nonnè indicat, illarum præsentiam ad lactis generationem prodesse? quo enim presente, aliquid sit, & absente, cesset, causam illius esse quis iustè negauerit? Et quod corporis multitudinem tollere ex Hippocrate aptæ natæ esse videantur, nihil vrget, imò confirmat intentum: est .n. & dicitur redundantia, non chyli, sed massæ sanguineæ vbertas; multa; vnus respectu superflua videntur, ac ideo excrementa dicuntur, quæ pro alijs alimenra dicuntur, & sunt.

• Nec magis illud aliud eiusdem premit argumentum, sumptum à sanguinis

Decimasest-  
ta ratio, ab  
imbecilla,  
mammarum  
natura desū-  
pta, soluitur.

Sola pulmo-  
num, & Cor-  
dis vicinitas  
eas profice-  
rit.

Decima septima ratio, à colore lactis, & sanguinis sumpta.

Soluitur ventriculi exemplum.

Concluditur lac & sanguis, non à chylo, à mamma elaborati.

guinis rubro calore, qui non sic faciliè videtur à mammis glandosis, raris, spongiosis, & mollibus euincendus, potissimum quia rubri in album commutatio difficillima est, ut videre licet tum apud tinctorum tum apud chymicos: Nam sola responsione euidentiae, & experimenti contrarij diluitur: Videmus ergo, chylum cuius ipsemet se tantum patrum præstitit album fieri ex cibis, potibusq; viridibus, rubris, nigris croceis &c., à ventriculo, parte membranosa, ex angui, & frigida, nec sic Cordi vicina, vt sunt vbera: quæ verò de Arte adducit, difficultatem quidem arguunt, non impossibilitatem; & de Arte dicunt, quæ Naturam quidem imitari, non autem illius vim valet attingere.

Cætera, quæ ibi idem subiungit ingeniosissimus Auctor, iam supra allata, & ni fallor, euulsa sunt; itaut liceat hic Caput elaudere, & concludere, ut in anteriori intendebatur, nouiter scilicet per Pecquetum inuenta vascula nil magis recentiorum de Lactis materia opinionem elucidare; quin liceat, ac possit toto Marte antiqua sustineri, & confirmari opinio. Lac ergo ex sanguine à mammis elaborari, & cumulari, non autem ex immediato chylo, sat constat, quantumcunque speciosa, & multiplicia fuerint, ac sint Iuniorum argumenta.

## CAPVT TERTIVM.

*Fetus in utero non chylo, sed sanguine, nutritur: frustra ergo putatur, Lactearum inuentum quicquam conferre ad contrariam nouam opinionem firmandam.*

**N**ON abfimile, mea sententia, iudicium ferendum est de via chyli per lacteas venas ad vterum, pro factu alendo, ut eodem ali noua iam apud quosdam insurrexit opinio; inter quos non infimum obrinet locum Antonius Deusingius iam supranominatus, Vir maximi ingenij quidem, sed & ipse ad noua ferenda deditus, quem nuperrimè sequutus est iam dictus Paulus Franciscus Pallierius Genuensis in suo supracitato lib. de lact. vera gen., & vsu cap. 8. Quandoquidem, si lacteæ à Pecqueto inuentæ considerantur, siq; sui ipsius, & Bartholini dictis acquiescendum, eas non nisi chylo toti ad Cor ferendo inferuire, aut quid etiam modicum feri in renes deportando esse, statuendum est: si verò stetur Bilsio, qui renes prætergressus, videtur inuenisse, venulas ab eo roriferas dictas ultra progredi, illas solam forositate roridam deferre, non chylum, nec lac, ex eodemmet ponendum est; nec adhuc visa, vel audita publicatio descriptionis eiusmodi vasorum, quæ ad vterum vsque progrediantur, quantumuis hoc enixè ab amicissimis meis postulauerim.

Sed (quod magis refert) inualide nimis illa opinio est, quæ antiquissimæ pugnans, decernit, vterinum germen ali chylosa substantia, cum verius sanguine nutriatur. Circa quod ne aereè loqui videar, duo hæc mihi

mihi probanda assum; vnum nempe, puerum, siue factum in matrice nutrir sanguine; alterum non nutrir chylo immediatè, nec nisi prius in sanguinem versò. Quibus peractis, obiectiones, quæ antiquæ opinionioni, ac rationibus pro ea adductis, fieri possunt, & nouissimæ opinionis fundamenta eripere, vel eliminare conabor. Factum ergo sanguine pasci plura ostendunt.

Et primo: Alia introitus alimenti in factum via sensu non percipitur quam per os, & per vmbilium: per illud nihil ingredi suadet Autopsia, cum in eius ventriculo saltem primis mensibus nil vnquam adhuc fuerit inuentum, seu obseruatum, præter aliquid phlegmatis ex sui e nutritione pronati; In hoc verò semper sanguis, nunquam chylus inuentus fuit: Ergo sanguine ipsum ali arbitrandum.

Factum sanguine nutriti, argumentum primū.

Secundò: Vnumquodque augetur, nutriturq; eo, ex quo genitum est: fieri autem hominem ex semine, & sanguine tam certum est, quam quod certissimum, & insuper probatur infra cap. 9. Ergo iisdem augeri, nutrirq; est asserendum. Prior nota; cum eadem sit substantia, quæ augetur, & nutritur, ac ea, quæ gignitur: eadem ergo vtriusq; materia augens. Minor etiam est manifesta: sic enim, & Philosophi, & Medici omnes consentiunt; & præterea idem rei euidentiā monstrat; cum non nisi menstruantibus conceptio contingat, & post conceptum illa vel cessent, vt in pluribus, vel minuantur plurimum in quibusdā: Nec enim ante menstrui eruptionem, nec post eius naturalem defectum, quampiā naturaliter concepisse, datur. Imo &, si ab obstructione, vel alio præter naturali affectu menstrua supprimantur, vel ex virili quadam natura non fluant, nec conceptio contingit: Signum ergo, sanguinis concursus ad grauidantiam requiri. Nec momentum facit, quod cap. antecedenti dixerim, vi disse mulierem nunquam menstruantem concepisse: præter enim quod; vt ait Vallesius, nil in natura adeo necessarium est, quin aliquo ex casu aliter esse possit (quod tamen theoremata à plurimum contingentibus sumpta, immutare non debet); & id non accidet, nisi in ætate iuuenili, in habitu sanguineo, cuiq; etsi menses vel ob labores, distractionesue non erumpunt, sanguis tamen adhuc affluit; & mulieribus talia dicentibus vix creditur: nam non omnino malè ex Græcorum proverbio his dixit Muliere iurante, ridet Cælum.

Argumentum secundum.

Tertiò: Nisi è sanguine fieret, & aleretur factus, mulieri grauidæ vel non supprimerentur menstrua, vel si ex occlusionē vasorum à factu facta suppressio oriretur, in plethoram laberetur ipsa, & ijs fieret subiecta malis, quæ retentis mensibus solent ommigena superuenire; eòq; magis, qui vterius progreditur factatio: & tamen, è contra fieri, obseruatio quotidiana ostendit; cum & supprimantur menstrua, & primis solum mensibus quicquam grauidæ patiantur, cæteris verò incolumiter degant. Cum autem suppressionem dicimus, intellige quoque de plerisq;: quia hic eas non moror, quæ ob sanguinis feracitatem, quamuis grauidæ, aut lactantes, aliquid, vel quandoque menstruantur. In

Argumentum tertium.

his

his nihilominus manifesta conspicitur tùm in quantitate, tùm in vicibus diminutio; id quod in similibus ad rationis efficaciam sufficit: tantum enim dicitur retineri sanguinis in ea, quæ duas eiusdem heminas euacuare solita, vnicam excernit, quantum in ea, quæ vnicam tollebat educere, si prorsus retineatur.

Argumentum  
quartum.

Quartò: Nisi è sanguine procrearetur, alereturq; fœtus, frustra Natura tantam sanguinis sæcunditatem mulieri tribuisset; frustra tantam sanguinis procliuatatem ad vterum instituisse; frustra tantam in venarum vteri osculis sanguinis effundendi facilitatem destinasset: Ad quid enim mulieres tot profluuiorum periculis, tot ex suppressione (si quando accadat) miserijs tot mensualibus, ob menstruationem molestijs tot cruentatis sædationibus exponere, si nec ad lac gignendum, nec ad fœtum alendum requirebatur sanguis, sed chylus? Vnico siquidem augendæ, vel minuendæ cibationis præsidio, se ab his ambagibus exbrigaasset.

Argumentum  
quintum.

Quintò: Si non ex sanguine fieret, nutrireturq; in vtero fœtus, Natura se se ostenderet inspidam, quæ sanguineum animal formans, & alens, materiam aptam, promptam, affluentem, qualis in muliere sanguis est, respueret, vt ex chylo minus apto, (vteriori enim indiget coctione) illuc fluere insueto, non superfluo, opus perliceret; insciam, quæ ductus faciles, assuetos, sæpèq; hiantes fugiens, ad vasa anfractuosa, vix comprehensibilia, nec effundere solita, se conuerteret, impiam, quæ matri validæ solitam sanguinis procreationem minueret, vt chylum furaretur pro pascendo fœtu, cui nihilominus, etsi imbecillo, is in sanguinem, & nutriatur, vertendus est; inanem, quæ purpurea in puerperio daret indicia, cum intus pallido pallio indueretur.

Argumentum  
sextum.

Sextò: Fœtus alitio, vt quæ cum modico genitricis incommodo, ac detrimento contingit, ex aliquo huius superfluo fieri iudicanda est; aliqui si necessaria surripiantur, quomodo sine magno hoc fiet virium dispendio? At nullum evidentius superfluum in vtero, quàm sanguis. Ergo &c. Et minor ex supradictis patet, nimirum quod ab vtero antea solebant erumpere menstrua, quæ tunc iure retinentur.

Argumentum  
septimum.

Septimò: Mulieri grauidæ non, nisi magno cum periculo abortus, mitti copiosum sanguinem, magisq; si fœtus sic maior, & ab inferioribus educatur venis, omnes tùm veteres, tùm recentiores fatentur Libri; quod nullum esset, nisi ex sanguine aleretur infans: nam per talē emissionem nec subtrahio alimenti, nec illius fieret violenta ad vterum confluxio; cum in alijs vasis chylus à Parte suppositus gignatur, moretur, ac fluat, quàm è sanguifluis venis.

Argumentum  
octauum.

Octauò, similem fieri embryonis enutritionem docuere Hipp. lib. de nat. pue. num. 5. & 39 Arist. lib. 2. de gen. ani. 5. Gal. 5. aphor. 3. Hosq; sequuta Medicorum, ac Philosophorum schola omnis, constanter id asseruit vsquequò proximis temporibus Anton. Deusing. publicè asseruit, ac disputauit, fœtum in vtero nutriri chylo in pancreate elaborato, ac inde

inde ad vterum per incertos, nondumq; tunc inuentos ductus peruenit; quem sequuti sunt alii cum Pallierio supranominato. Nec mirandum, cum antea de lacte quoque idem accerrimè tenuerit, optimè sciens ex *Arist. cit. loco, & Auerroe in commen.* eandem esse materiam lactis, & succi; ex quo vnumquodque gignitur, & nutritur.

## CAPVT QVARTVM.

*Fatum chyla non enutrir, probatur.*

**H**ÆC viderentur sufficere argumenta ad exclusionem chyli pro vterino germine nutriendo; cum de regulis Iuris sit, inclusionem vnius valere ad exclusionem alterius: Vt autem clariùs adhuc veritas pateat, quod fœtus non nutriatur chylo, pluribus alijs argumentis suadere conabor.

Et primò, quod muliere obesa sine cibo duos, vel tres dies commorante, nihilominus viuât, aliturq; fœtus; Sicuti &, si illa acuto aliquo morbo laboret, & ob id per plures dies paucissimo, & tenui victu utatur, viuât tamen ille, &, ni lethalis sit affectio, aut imbecillima fœtans, saluatur incolumis. Quæ quomodo fieri possint in embryone, & fœtus primordijs, si chylo ali debeat, mens mea capere nescit: nam si dixit *Hipp. primo aphor. 13.* Pueros minimè ieiunium ferre posse, quid de embryone dicendum, cui & formatio, & acutio debentur simul? quomodo autem sine cibo chylus?

Argumentum primum

Secundò, quod pauciora multò alimenta grauida mulier capit primis mensibus, quàm antea, & multoties assumpta euomit; & tamen, si duobus nutrimentum debetur, copiosior potius esse debet quotidiana cibatio, cum chylus non nisi à cibo habeatur, nec in via ampliùs, quàm paucis horis, ex Neotericorum autopsia commoretur.

Argumentum secundum

Tertio, quod aliquando prægnantes in principijs, & per tres menses pica cotripiuntur, & aliena ingurgitant, carbones, gipsum, calcem &c.; vel praua alia deuorant alimenta, præsertim acerbâ, acidâq; à quibus, si sola ventriculi actione alterentur, quomodo proba fœtui alitio, possit obuenire, quomodoq; euitari valeat illius extrema læsio, nescio imaginari: dato enim posse à ventriculo virtute caloris, ab vtero prægnante adaucti, melius concoqui, & euinci, id saltèm non aufugietur, quin ex prauis edulij prauus gignatur chylus, qui si immediatè ad vterum feratur, incommoda grauiâ, aufugi minimè posse, videntur.

Argumentum tertium

Quartò, quod ex Circulantiâ prescripto venæ omnes ab extremis reducant ad Cor, non autèm versus extrema, vt proprium videtur esse (ex eorum sententia) arteriarum: cum ergo harum proprietas sit vehere sanguinem non chylum, patet hinc, chylum nec ad vterum fore deducendum. Quod si dicant, has lacteas non esse de aliarum venarum genere: necessariò tamen concedere debent, eas vel versus Cor deduc-

Argumentum quartum

deducere, tamquàm ad centrum, & sic non ad vterum, nec ad mammas; vel ad circumferentiam, seu ad alia membra, & sic non ad Cor, nisi per ramusculos, vt ad alias partes; Sicq; cessabit decantata totius, vel plurimi chyli semita ad Cor; nec ad vterum perveniet plus, quàm sua portio petat, ad alendum factum insufficiens Sed quod omnem tollit scrupulum, adhuc nullus, quod sciam, hos ramulos ad vterum pertinentes inuenit, aut descripsit Anatomicus, quicquid de Bilsio speraret Deusingius.

Argumentū  
quintum.

Quintò, quòd sanæ, libenterq; mulieri deberet esse naturalis chyli ad vterum corruatio per illa vasa; aliter quomodo in grauidatione tali munere fungentur? Et sic vel vterum illo nutriri, esset necesse, vel inibi collectum asseruari, vel ad tempora excerni. Illud primum non videtur rationi consonum: quia sic frustra essent tot aliæ sanguineæ venæ, ac arteriæ ad vterum deriuatæ, cum sic videretur sola menstrua educenda dicatæ, quod non est dicendum, & secundo, quia non sic exigua eadem vasa esse deberent, vt Anatomicorum oculis sic nunclynceos, effugerent, qui tamen lacteas, veluti arancarum telæ fila paruulas in mesenterio deprehendunt. Illud secundum nec esse potest: quia nulum tale vas propè vterum, vel in vtero, chylo plenum, ex anatome vnquam repertum fuit. Tertium nec obseruatur: etsi enim dentur mulieres, quibus intermedio menstrui tempore alba effluvia per annos durant, plurimæ tamen rubra menstrua qualibet lunatione effundunt, reliquo tempore his in partibus siuescentes in illis verò non chylosa substantia, sed mucosa, aquea, & phlegmatica exit, quæ multoties efficit infecunditatem.

Argumentū  
sextum.

si alimentū  
à seorsu ce-  
ditur faci-  
libi sanguis,  
quàm chylus  
duet quatuor  
de causis.

Sextò: Vel alimentum ad factum alendum confluit attractum, vel impulsū. Vt cuique sit, potius sanguis, quàm chylus corruabitur: ergo sic fieri supponendum. Nam si per attractionem factus fluere debeat, quod potius sanguis fluat, probatur primò ex assuetudine sanguinis sic faciendi, quæ luce clariùs indicatur à menstruorum effluuio, cum ex altera chyli per eundem locum educitio inter miranda ab historicis numeretur. Secundò ex vasorum aptitudine: venæ enim, ac arteriæ facillimè in vteri cavitatem sanguinem reieciunt, vasa lactea (si adsunt) vel nunquam chylum, vel albo coruo rariùs; illæ latæ, & cuique Anatomico conspicuæ, hæc non nisi oculatoribus, & forsan lucinatis, vel somniantibus visa. Tertio ex similitudine proportionata attracti ad attrahens: similior namque corpori vndique sanguineo, ac alendo magis proportionatus (vt proximum alimentum) sanguis est, quàm chylus, qui frigidior, ideoq; coctionis vltioris egenus extat, & priusquàm alat, sanguis euadere debet: Quarto ex abundantia: nam sanguis in fœmina fit facillè superfluous, chylus autem non magis in ea, quàm in viro superabundans, & si parèe viuatur, vel ieiunetur, deficit attractum, quod non accidit sanguini, qui in toto venarum, arteriarumq; ambitu semper pro indigentij copiosus asseruatur.

Quod



Quod si per impulsu fluere alimentum, dicamus, sic etiam concludendum esse, constat primò ex impellentis facultatis natura: hæc enim ad expellendum non insurgit, nisi vel à copia grauetur, vel ab irritante qualitate inciditur: vtraque autem in sanguine facilior; nempe copia ob fecunditatem mulierum, mollitiem, etiam, & naturalem aptitudinem; qualitas irritans ob menstrui retentionem, in quo semper aliquid excrementitij residet; In chylo non sic, ut cui facilior aditus ad hepar, & sanguinem sit, quam aliò, ob idq; copia non asseruetur; quique à glandularum mollitie, & frigidity in omnibus qualitatibus mitigetur, ac demulceatur. Secundò ex abundantia spirituum (qui exercetici facultati famulantur) tum in arterias, tum in venas à Corde, & Iecore irruentium; qui è contra paucissimi in lacteis morantur, & chylo misceantur ob eorum evidentiorum frigidity, & à visceribus (si Inuentorum dictis standum) independentiam. Tertiò ex agilitate succi, quæ in sanguine evidens ob eius calorem, & spiritositatem cernitur, & in chylo ob eius qualitatem, & spirituum parsimoniam desideratur.

Septimò: Si lacte, sed chylo (idem quippe sunt hæc Adversantibus) aleretur in vtero fætus, plura, & fetidiora tum alui (illuc bile transmissa) tum vesicæ (obseruata renibus exsuctum, & per cutis poros expirans) congererentur excrementa, ita ut nec vterus caperet, nec mater sufficeret, nec fætus toleraret; exemplo in lucem editi infantis, qui lacte nutritus torper aluum, & urinam quotidie excernit; quod cum non videatur, dicendum, succo benigniori, climatoriq; fætum ali in vtero, sic Naturæ providentia diçante.

Octauo: Si chylo aleretur fætus, durius multò ageretur cum cotenore, quàm cum validiore ab vtero egresso: hic namque, si lac fugit, concoquit in ventriculo, & fæces in intestina relinquit: At ille, cum per umbilicum trahat recta in iecur, ventriculi, intestinorumq; opera fraudatur, & sic ei fæces supereflent, & frigidiore iecur potiretur sanguinis efficiendi, sed perficiendi materia: nam, ut ait Gal 5. aphor. 40. Quanto adenes iecore sunt frigidiore, tanto lac sanguine frigidius.

Nonò: Si chylus tantum requireretur (præter semen) ad generationem, & ad nutritionem fætus, etiam post menstrui naturalem defectum, & ante eius exitum, dummodo commodè aleretur, & opipare videret mulier conceptio, & fætus alitio fieret: Ast hæc non sunt: Ergo non chylum, sed sanguinem ad vteri hestationem requiri, statuendum. Et minor probatur: quia ni poni, & sanguinei habitus sit mulier, neq; conceptio, neq; perfectio fætus, sed vel sterilitas, vel abortus, quatenuncq; cibetur, contingunt.

Ex his omnibus, & alijs, quæ possent afferri, argumentis, indicijs, & coniecturis, manifestum sit, non lac, non chylum, sed sanguinem inservire tum conceptioni, tum alitioni pueri in vtero commorantis; Et propterea frustra dictum fuisse, ex Lactearum inuentione monstratam viam esse, qua chylus ad fætum migrat.

Si in 17<sup>um</sup> impellitur, etiam facilius sanguis, quam chylus influet tribus de causis.

Argumentum septimum.

Argumentum Octauum.

Argumentum nonum.

*Obiectiones pro Deusingio, ac Alijs contra prima pro sanguine argumenta facta perimuntur.*

Contra primum de sanguine argumentum obiectio.

Soluitur;

Dosis ultimis mensibus aliquid lactis legui ab Hippocrate, & Aristotele conceditur.

Contra supradictas autem rationes multa pro Deusingio, & alijs obijci possunt; quæ tamen nihil vrgere, monstrabitur. Et primò contra primum nostrum argumentum ex ijs, quæ tertio capite leguntur, Hippocrates *lib. de nat. pue.*, & *lib. de carn.* manifestè asserit, factum in vtero ore lac sugere, ac per os alimentum trahere, cuius asserti dat argumenta duo, scilicet stercus illud, quod vix natus infans nigrescit; per aluum deiicit, Meconium dictum; & eiusdem statim ferè nati tam in vtero illi assueuisset. Huic opinioni, & Aristoteles visus est adhærere, quando *lib. 4. de gen. ani. 8.* hæc dixit: Cum præ magnitudine non amplius sufficit fœtui alimentum, quod per vmbilicum ministratur, lac ad alendum vtile succedit; Cumq; per vmbilicum alimentum non subeat amplius, comprimunt sese venæ illæ, circum quas tunica illa est, quæ vmbilicus vocatur, atque ob eam rem tunc exitum opportunè fœtus consequitur. ] Qui duo Auctores in hoc videntur opinioni Democriti sic sentientis subscripsisse. Hæc verò nil penitus vrgent: nam, supposito etiam, quod hi Doctores sic sentirent, veraq; opinarentur, clarè videre est, eos tali casu admittere solum aliquem lactis accessum ultimis fætationis mensibus, quibus non sufficere videtur sanguinis per vmbilicum aduentus, & illum potius obfætationis gratia, quàm secus: Nam *Hipp. lib. de nat. pue. num. 21.* ponens primò generationem lactis in grauida promoueri à compressione facta omento, & carnibus ab vtero tumente (hæc autem non ante quartum accidit mensem), inde subdit: Et vbi peruenerit in vteros de lacte, puer ipso paululùm fruitur. ] Et *num. 39.* sic: Trahit enim, quod dulcissimum est in sanguine ad sese, simulq; etiam lacte modicè fruitur. Aristoteles autem verba vel de ultimis tantùm mensibus essent intelligenda, vel, quod verius puto, post fœtus exitum: sic enim in principio Capitis ait: Lac autem fit ijs fæminis, quæ animal intra se generant, quod vtile partus tempore est: natura enim id alimenti gratia externi animalibus parauit, vt nec deesset tempore debito, neque vltra id tempus superesset. ] Qui imò *lib. 2. de gen. anim. 5.* manifestè illam Democriti opinionem refellit his verbis: Qui infantes ali in vtero aiunt sugentes carunculam quandam, non rectè dicunt; idem enim, & cæteris animalibus eueniret, quod tamen nusquam videmus. ] Et parùm post: Itaque non rectè aiunt, qui ita dicunt, vt Democritus. ] Neque tamen illa Hipp. opinio inuerisimilis est, quod scilicet grandior, ac perfectus fœtus, sicuti functionibus alijs animalibus

Hippocr. opinio non approbanda.

animalibus modicè fungitur, nimirum motu, ac sensu, ita & deglutitioni possit aliquantulum intendere; & hoc citra dubium suffocationis à ferofitate, quæ rationabiliter in parte vteri inferiori, & inter duas tunicas secundinas dictas, vti excrementum moratur: cum os infantis „ versus superiora (& si parum inter genua inclinans) detineantur: „ producantur enim (ait *Hipp. lib. de ost. par. 2.*) omnes sursum habentes caput. ] Et sic esse, mulieres quoque patientes asserunt, quæ manifestè sentiunt, fætum exiturum versus inferiora volui. Imò illi libenter, liberèq; subscriberem, si modò viam, qua lac è venis mammarijs fætus ori offerri posset, aliquis commonstraret; In quo non omninò improbanda est pro parte opinio doctissimi Io. Claudij de la Coruèe, arbitrantis, succum inter secundas, & embryonem detentum nutritum esse, & ore ab eo sugi: quod tamen vellem intelligi de aliqua portione (salub vmbilici vlu) ori fætus oblata post primos menses (non autem de totali eiusdem entrititione); & ea cum restrictione, non è chylo immediatè, sed è sanguine talem procreari succum, vt ipsemet, & Harucius intelligunt, contra quàm referat sine rubore Pallierius. Magna enim duo illa argumenta sunt alui stercus, & fuctus sic subitò nato cognitus; quibus accedat lac sine vlla pueri passionis, vel detrimento exugi, quæ non viderentur euitabilia in subitanea cibi mutatione, vt ipse etiam Deusingius optimè aduertit: qui tamen in hoc hallucinatur, dum putat, & fætus primordia, & alimentum progressum omnem à lacte, seu veriùs chylo fieri, eoq; non à mammis, nec per mammarias venas exporrecto, sed à pancreate, & per lactea vascula ad vterum deduci, & in vocatam placentam acceptari; vbi autumat quandam illius mixtionem fieri cum sanguine à fætus corde illuc demandato per arterias, & circularitèr per venas in Cor deduci; quæ omnes ingenij chimeræ sunt, ad saluandas introductæ circulationis leges adinuentæ. Clara autem Hippocratis Aristotelisque sententia est, lac illud fætus solatio errogatum à dulcissima sanguinis portione, & pinguiori succo procreari, in venasq; vtero, ac mammis communes venire.

Cum histamen certissimum apud hos Authores est, proprium, ac genuinum fætus a limentum per vmbilicum ingredi: Etenim *Hipp. lib. de molim. part. num. 4.* his verbis vsus fuit: Ac verò vmbilicus, per quem „ alimenti, ac spiritus ingressus pueris contingunt, solus ex omni corpore vtero adhæret. ] Et *lib. de nat. puer. 5.* iuxta mediam autem carnem vmbilicus distat, per quem spirat, & alimentum, ac incrementum „ caput. ] *Aristot. verò cit. cap. 5.* sic statim fatur: Augentur fætus, „ qui forma animalis nascuntur per vmbilici annexum, vt ante diximus: Cum enim vis quoque nutriendi in animalibus insit, vmbilicū „ statim, quasi radicem, agunt in vterum. ] Quæ sententia, vbi sic se verè seruari debeat, nec modus deficiet, quo in ventriculum aliquid fucus prorumpat per venas à iecore illuc implantatas, sanguinemq; ali-

Genuinum  
fætus alimē-  
tū per Hipp.  
& Arist. ab  
vmbilico for-  
tat.

*lactifera*, (quæ tamen se nunquam vidisse, aut nouisse, fatetur ingenuè) magis esse patula ob diffusum a fœtus corda allicientem calorem: Horum autem vasculorum naturalem hiatus arguit à naturali interioris vteri humiditate, quæ plurimis etiam sanis vsuuenit: Atuerò, præterquam quod ea vascula dari, minimùm adhuc anceps contenditur, si sibi talia dentur, vel hoc ipse dare cogetur, conceptum faciliùs obuienturum ijs, quæ tales vteri humiditates, seu muliebria patiuntur: ita enim prompta esset materia ad iuuandam conceptionem apta: Sed hoc est contra experientiam, quæ docet, similes mulieres rarissimè fœcundari, & non nisi arte, vel natura exsiccentur; & contra rationem, cum illa excrementa humida sint, inibi ab imbecillo calore genita, vel illuc ab impuro corpore demandata, non autem vtilia ex superfluitate alimentii redundantia, vt indicatur ab excretorum qualitate, vt Prædici omnes docent, & vt differens vtilium natura commonstrat. Rursus falsum est, plurimas mulieres tales humiditates habere naturaliter. Item quomodo à crassitie, & lentore adhærescentis genituræ clauduntur ora venarum, ad quæ sanguis calidus sæpè confluit, & recluduntur, aut minime occluduntur ora vasculorum serositatem veluti resudantium? quæ ratio illi materiæ præsidet, & cur à calore fœtus dilatantur hæc vasa exanguia, frigidaq; venæ autem calorisferæ restringentur? Inualida nimis hæc mihi videntur, cum nil sit, quod rationabiliter chyli maiorem prouentum incitet, sanguinem verò coerceat.

Quarto argumento quis pro Parte respondere posset, non omninò frustra mulieribus tantam sanguinis fœcunditatem datam esse, etiam si fœtus ratione minimè deferuiat; cum hoc fuerit, vt earum pulchritudo, venustas, & mollities augetur; vt conciliarentur alacritas, pietas, viuacitas; aliæq; muliebres gratiæ propagarentur, quibus illaqueatus homo, magis studiosus, & ad seria deditus, in earum brachia festinans, Veneri succedaneas pænitentias, lassitudines, tædiaq; floccifaceret, sicq; generatio, alioqui vacillans, in Mundo perennaret; nec frustra illam sanguinis ad vterum propensionem, facilemquæ ab eo exitum datum esse; cum hoc fuerit, vt huius humoris calore, spiritositatq; tirillata, ac irritata in sic venerea parte mulier, in Viri concubitum ferè inuitè allecta, grauidationis, partus, lactationis, nutritionisq; tædia, dolores, molestias, ac miseras nihili penderet. Cui talis sanguinis fœcunditas nil damni allatura erat grauidationis tempore, quo, chylo in fetum absumpto, tanta inde cessaret eiusdem procreatio. Verùm enim

Ad quartum  
pro sanguine  
argumenti  
obicitio.

Resoluitur;

verò acuta quidem, & ingeniosa, sed leuissima talis responsio censenda est: nam & citra similem sanguinis feracitatem tot poterant nihilominus mulieribus gratiæ donari, vt viris quoque multoties in iuuentute donantur, ex quibus multi, præsertim adolescentes, in talibus dotibus fœminis minimè cedunt, nec minus alliciunt, quàm alliciantur, maximè cum ad easdem sufficeret, imò præstaret sanguinis mediocritas, citra superfluitatem, quæ illas potius & lædit, & minuit. Sicuti, & absque

abſque profluuiorum periculo, & exitus neceſſitate, & poterant, ſola vteri temperie, ac arteriarum numero mutatis, non minus, quàm Viri, coitum mulieres affectare; & euentus id probat, cum ſalaciores ſint mulieres, quibus parè, quàm quibus copioſe menſtrua fluunt. Quam obrem non ob ſic leuia intentà arbitrandum, adeo ſeria, ac diſcriminofa pericula mulieribus minitaſſe. Naturam, ſicq; leuiter anſam dediſſe ſuperfluū, vt cogeretur poſtea in alterum ſuccum ſuperfluitatem tranſmutare.

Ad quintum  
pro ſanguine  
argumentum  
obicito.

Pollicitur;

Ad quintum quoque argumentum noſtrum tale pro Deuſingio reſponſum dari poſſet, Naturam non ſe inſipidam, impiam, ac inanem, ſed ſapientiſſimam in lacte factum nutriendo ſe ſe prætuliffe, vt quæ ſic inutilem circuitum euitare, & repentinas mutationes effugare mauuluit; fruſtra enim videretur in matre chylus in ſanguinem mutari, ſi in venis mammarijs, vel alijs vteri venis lac iterum redire deberet, vt inde in ſetu iterum fieret ſanguis; Et cum natus infans lacte alatur, rationabiliter dicendum, eodem in vtero nutrirī. Sed ex allatis auctoritatibus Hippocratis iam viſum eſt, factum propriè per vmbilicum trahere ſanguinem, qui recta in iecur abit; ſi quid verò ex ſuperfluō, & expreſſo dulciori ſucco ad factum ore trahitur, id eſſe in vltimis tantum menſibus, & quid ſupraplus ad ſupplendum alicquem defectum vmbilici, qui paulatim indureſcens ſuas videtur conſtringere venas, & maiori ſic alendo ſætui non ſufficit; Et ſic imò placida mutatione procedi, à ſolo ſanguine gradatim lacti aſſueſcendo, vt natus puer lacte ſolo vtens, inde quoque pedetentim durioribus adaptetur, & ordinatè poſtmodum ſolis hiſce vtatur alimentis. Sic imò etiam euitari quencunq; circuitū, ſi qui futurus in ſætu ſanguis eſt, iam factus ſanguis conſuat, vt imperfecto addatur perfectio, & imbecillo labor ſubtrahatur omnis.

Ad ſextum  
pro ſanguine  
argumentum  
reſponſio.

Reſoluitur.

Ad ſextum inſuper poſſet reſponderi, negando minorem: non minus enim ſuperflua ſuis temporibus eſt profuſio chyli in glandulas tūm meſenterij, tūm vberum, quàm ſanguinis in venas vteri; ac inſuper cum minori virium diſpendio fore illius, quàm huius conſumptionem: Verum negari non poteſt, hoc chyli ſuperfluū, reſpectu vteri) incognitū adhuc eſſe, incognitam viam, incognita vaſa illud detinentia; & ex altera notiſſimā ſanguinis ſuperfluitatē, notiſſimum iter, notiſſima vaſa illius: nam ſi de pancreate, receptaculo, vel lacteis nouiter inuentis dicatur, ea omnia & anguſta eſſe vaſa, & cum (ex ipſorum Inuentorum dictis) ad Cor chylum deferant ſanguificandum, pauciſſimum, vel nullum potiùs, poſſe ad vterum ferre ſuccum, conſtat. Sit autem quoque verum, chyli conſumptionem cum minori matris detrimento futuram, veriſſimum tamen, & erit, eam cum minori ſætus vtilitate, & eius maiori cum labore futuram.

Ad ſeptimū  
pro ſanguine  
argumentum  
reſponſio.

Ad ſeptimum reſponderet Deuſingius, ex eo non conculcari, quin lacte poſſit alī ſætus: quia, hoc ſuppoſito, dici poteſt, per phleboto-  
miam venas inaniri ſanguine, inde partes matris alendas ſolito fraudari  
alimen-

alimento, & ita, cum auidè trahant à ventriculo, & intestinis, totam, vel plurimam chyli absumere, ac rapere partem, itaut infanti debiliore sua subtrahatur portio, indeq; abortus periculum. Sed dicimus, nimis à longe damnum conijci, cum euident fit immediatum: illud etenim solam supponeret futuri alimenti, non iam in lacteis vteri, vel fœtus existens privationem: hoc verò (nimirum ob phlebotomiam sanguineis venis accedens) immediatam supponit subtractionem eius, quod iam fluxum, & iam etiam in ipsum fœtum introiuit; cum per vnus venæ sectionem omnes citò possint inaniri venæ, & eò citius, quò proximiores, & incisæ communiore sunt; ultra quod venarum vniuersalitas ad vterum potest concitationem parere. Cum itaque videamus, quandoque ex phlebotomia eadem die subsequi abortum, (vt iam visum, & lectum) non est, vt à tam longinquo ratiocinemur causam discriminis, si proximam, & certam cernimus. Respondetur præterea, in Pecqueti opinione non valere talem responsum, qui putauit, & scripsit, chyli transmigrationem totam impulsione fieri: nam sic clarum, non minus impellendum fore in lacteas, quam ante phlebotomiam fieret.

Ad octauum verò sicuti eadem, quæ primo, dari possit obiectio, ita & eadem illius supra allata peremptio valere potest.

## CAPVT SEXTVM.

*Obiectiones contra secundas superiores rationes, chylum excludentes, falsæ, vel factu faciles solvuntur.*

**N**Vnc igitur videndum, quid ad cæteras pro chyli exclusionem quarto capite allatas rationes posset ab aduersa parte obijci; vt tandem nebulis omnibus excussis, clarior veritatis lux appareat.

Ad primam itaque si respondeatur, fœtum tempore ieiunij trahere id, quod adhuc seruabatur in via, seu in vasis galaetio foris nuncupatis, cum rationabile sit, non omnino ea vnquam vacua remanere, quin, sicuti venæ sanguinem, ita & ipsa chylum, siuè lac pro sua cavitare moderanda retineant; Debilis inquam hæc responsio nimis, & Lactearum Inventorum iudicio, & Autopsiæ ipsorum minime cohærens: ipsi namque fatentur, si quarta, vel quinta hora post pastum aperiantur, videri eas chylo plenas, ac citissime per illas ipsum moueri, itaut nonnulli (quamuis inaniter) ausi fuerint motum eis adscribere peristalticum; qui pro indubitato quoque ponunt, si ieiunium secetur animal, nil, nisi serum, in ijs inueniri, & imò eas tunc ferè inuisibiles esse. Quod si aliquis in ijs longius lactis existentiam protraxit, non ultra viginti quatuor horas id admisit, vt primo Libro vidimus. Ergo demus, aliquid in eis detineri, quod possit à fœtu necessitate coactò, trahi, id valeret pro vnus, vel alterius cibationis carentia. Sed quid si plurium? num sine cibo nutrietur, viuet augebitur? Porro si de puero dixit Hipp. cum

*Ad primam  
contra chyli  
rationem res  
ponso.*

*Diffoluitur.*

*difficil-*



difficillimè ieiunium ferre, quid de formando, simulq; nutriendo, & augeſcente dicendum?

*Ad ſecundam  
contra chyli  
rationem reſ-  
ponſio.*

Ad ſecundam poſſet quidem pro aduerſo opinantibus reſponderi, etiamſi mulier primis menſibus grauidationis parcè cibetur, non ob id conſutari factus alitionem ex chylo: quia, occluſa menſtruorum via, ſanguis ſuperfluus in venis retentus matri ad fui alitionem ſufficit, itaut pauciſſimo adiuumento ex chylo indigeat, & ſic illa levis cibatio tota ferè ad factum, qui & paucis in principio indiget, commodè poſſit excurrere: Levis tamen obiectio: quia vt plurimum, vt dixi, ſunt conceptus finitas menſtruis, ſicquè corpore à plenitudine liberato: vnde venæ inanitz, & iecur matris validum ſuam chyli ſolitam portionem à denibus imbecillis non remittent: quomodo ergo ex pauciori cibo plus chyli? & quomodo ex pauciori chylo factui dabitur (qui quid plus matre ſola eſt) formatio, & augmentum? Sed detur, factum trahere velocius venis; cur ergo ſi à ventriculo trahitur, non adeſt appetitus velocior, & ſic congrua cibatio? manifeſtum quippe, etiam ſanguinis quotidie partem diſſolui, & ideo illum quoque inſtaurandum.

*Ad tertiam  
contra chyli  
rationem reſ-  
ponſio.*

*Verò ſeruitur.*

Ad tertiam poſſet pro Iſpis reſponderi, ex prauis illis cibarijs lædi quidem factum, & ideo videri multoties, in ſic inordinatis mulieribus, & abortus inſequi, & infantes exire prauis inſtructos humoribus, & multis paſſionibus obnoxios. Verùm enimuerò, eſſi negari non poſſit, aliquando abortus inſequi, & imbecillos pueros erumpere ob prauorum ciborum ingluuiem, vt qui nec à forti iecore, nec à venarum valida vi poſſunt quandoq; euinci; attamen, cum plurimi factus, harum præcipuè fæminarum agreſtium, etiamſi prædicta errata committant, ab vtero ſanioriantur, hoc futurum fuiſſe non videretur, ſi cibaria illa ſic immediatè à ventriculo ad vterum confluere, quantulacunque præparatio ſupponatur fieri à lacteis, partibus frigidis, imbecillis, & potiùs excrementorum, quàm alimentorum ductui, idoneis.

*Ad quartam  
contra chyli  
rationem reſ-  
ponſio.*

*Impropria  
monſtratur.*

Ad quartam dicitur, quod quamvis cæteris temporibus ad vterum per lacteas ſola levis portio conſugit, vtero tamen geſtante, ob attractionem factus maior chyli portio veniet, & eà, quæ tùm factui, tùm vtero ſufficiat ſicuti mammis accidit, ad quas factus tempore lactis abundantia colligitur, cum cæteris temporibus pauciſſimum ex fui alitione ſuperſit: Verùm improporcionata eſt hæc illatio: nam ad mammæ lac non peruenit, ſed in ijs fabricatur, in ijs tubuli capaces extant, & virtus commutatiua fortis, itaut ſola requiratur materia vndique fluens, & illius ſuctio; quæ omnia in vtero deſiderantur: nec enim tubuli capace, non glandes, non lactea virtus obſeruatur; & ſic cum aliunde, & per determinata vaſcula debeat prouenire, patet, non maiorem copiam peruenturam, quàm capacitas eorum vaſorum, quæ paruiſſima, vt potè inuiſibilia, (vel potiùs nulla) eſſe debent, ferre poſſit.

*Ad quintam,  
& ſextam ad  
adductas.*

Ad alias duas, quid iuſſè, vel apparenter obijci poſſit, non video. Ad ſeptimam obijcit Deuſingius, chylum, qui ad vterum fertur, elaboratiorem

boratiorem esse lacte mammarum, eo quia in pancreate non minus, quàm in vberibus elimatur, & sic adhuc ampliùs in itinere à pancreate ad vterum elaborari, & propterea non tot excrementa super futura esse, vt puero foris lactenti. Sed faciliè hoc responsum redarguitur: quia si ipsimet Auctori standum est, lac ad mammas defluens in pancreate quoque conficitur, & ideo non minus in via ab eo ad mammas adhuc magis perficietur, quàm in via ab illo ad vterum. Imò, si rationi attendatur, in mammis ipsis propriissimè ampliùs elaboratur, ab earum infinita facultate, & à vicino cordis calore adiuta. Neque rursus ab ea ratione excusat, quod factus in lucem editus voraciùs, vt qui animali incipit sensu duci, lac exugat, ac fortiùs, trahat: quia, hoc etiam concessio, proportionaliter nouimestri spatio faciliè conijci potest, quam plura acuerentur excrementa; Quod inconueniens, facillimum visa est, multò meliùs ex suppositis nostris euitari: Nam sanguis, iam à matre elaboratus crassas faeces reliquit, bilem superfluum amisit, atram faecem deposuit, & feri partem dimisit (quorum plurima in chylo permanent) vt vel paucissima hepatis infantilis vix indigeat eliminatione, à qua per consequens paucissima quoque excrementa remanent; vel non nisi quæ à tertia coctione resultant, benigniora fecalia supersint.

Contra octauam dicitur, Chylum à matris ventriculo euictum, ab adenibus mesentericis bonificatum, ac à vasibus ducentibus colatum, dulciterq; attractum, nulla alia ventriculi egeret coctione, à soloq; iccoris, cordisq; infantilis opera perficiendum; cum alioqui à mammis exsuctum lac, vt quod violentè, & frequenter nimis à pueri ora lugitur, copiosioribus excrementis scateat, & ob id, etiam ventriculi puerilis ope elaboratum, nil melioris conditionis acquirat, quàm alterum sine ea possideat: Replicatur autem, vt tactum est, lac in mammis cordi proximis, copiosisq; ac magnis glandulis, & pinguo sitatibus instructis, etiam si à chylo ab eodem pancreate ad eas iuxta Deusingium procedente fieret (multò ergo magis si ex sanguine) meliùs concoctum, ac elaboratum iri, quàm id, quod à solo pancreate, & vterinis ductibus expoliretur, idcircoq; duriùs cum fetu, quam cum puero ageretur, vt ratio concludit.

Contra nonam tandem diceret idem Deusingius, in muliere menstruis orbata necessariò calorem imbecillitari non solum in sanguificatrice, sed & in chylicatrice facultate, cum imò videamus, in huiusmodi ventriculum præcipuè pati; vt propterea ineptus chylus sit tum ad conceptum, tum ad factus alimoniam: Sed excusatio ista leuissima est: quia dantur mulierum multæ, quæ post quadragiennium non amplius concipiunt, cum tamen habitus boni sint, appetitu gaudeant, & ventriculi polleant robore. Sed quid dicetur de adolescentulis, quibus, nisi menstrua erumpant, nec vteri gestatio succedit? annè calor imbecillus est. & chylicatio deficit? absit. An deficit ætas? nec hæc, sed quia deficit conceptionis materia potissima, puta sanguis superfluum, nec vtero gerant.

Ad Septimam  
contra chyli  
rationem ob-  
iectio.

Desiciunt.

Alia obie-  
ctio tollitur.

Ad Octauam  
contra chy-  
lum rationem  
obiectio.

Fugatur.

Ad nonam  
contra chy-  
lum rationem  
obiectio.

Soluitur.

*Afferuntur pro fetus enutritione lactea tùm Deusingij,  
tùm Sequacium, argumenta.*

Oui exem-  
plo concep-  
tio sine san-  
guinis inter-  
uentu pro-  
batur.

**N**E propterea tamen putes, beneuole Lector, præstantissimum Antonium Deusingium vnà cum ceteris sic ruditer in talem abijsse sententiam, quin à multis, nec contemnendis rationibus adeam fuerint adacti; Et quia forsant tibi stomachum mouere posset, quod à conceptione quoque, nedum à nutritione, ablegarint sanguinem; scias, apud ipsos Cor esse proprium sanguificationis organum, itaut (iuxta eorum mentem) ex utroque semine primò omnium Corde genito, in idq; indito vitali spiritu, sanguis propria eiusdem virtute procreetur, ad cætera membra tùm fabricanda, tùm alenda idoneus: Sic enim in ouo videmus fieri, e quo videmus sine sanguinis interuentu animal sanguineum gigni, alboq; inde ipsius, vel, ut vult Deusingius, vitello nutrirì, vsque quò perfectum inde exeat. Hoc itaque præmissò, varia hic Illorù argumenta ponam, quæ huiusmodi sunt.

I. Difficile captu est, quòd tam subito Natura mutationem faciat, ut fætui loco sanguinis, quo in vtero creditur ali, lac illicò simul atque in lucem editus, voluerit destinatum: Imprudenter siquidem id fecisset ipsa, ex cuius constanti lege sancitum est, omnem subitam mutationem etiam in adultis periculosam esse: melius igitur putabitur, ex chylo, seu lacte, etiam in vtero ipsum naturaliter enutrirì.

II. Si sanguine mensuris spatij externi solito nutriretur færus, multis prægnantibus ea quantitas in tantam fætus molem nouimestri spatio confiandam non sufficeret: cum experientia doceat, plurimas grandes emittere infantes, quibus vix quinque sanguinis vnciæ quolibet mense excerni solitæ fuerant; nihiloq; minus tanta simul lochiorù moles congesta sit, quantam vix tota nouem vnita menstrua compleant. Cum his insuper cernimus nihilominus maiorem sanguinis copiam in vasis detineri, adeout quandoque venam secare sit necesse.

III. Si sanguine menstruo nutriretur embryo, conceptus vitalis esse non posset, paucis diebus post menstruam purgationem: deficeret enim alimentum saltèm tribus septimanis. Quini mò nec paulò ante fluxum menstruorum: obrueretur enim à copia tunc fluentis sanguinis tenella organizanda, vel nuper organizata moles.

IV. Si antiquæ opinioni standum esset, nequaquam ratio dari posset, cur, facta conceptione, non ampliùs fluant menses: nam, quod in embryonis alimentum totus absumatur sanguis, dici non debet: qui enim primo mense tanta copia in tantillum corpusculum abiret? nec sufficit dicere, partem sanguinis in venis restagnare: etenim talis stagnationis causa reddenda est. Quod si nouæ insistamus opinioni, hæc

redde-

reddetur ratio, quod ipsa sanguinis materia diuerſi incipiat, lacte pro nutrimento factus ad vterum conſuente, & quod ab illo affluxu, & conceptu mutatur vteri natura, menſtrua fermentans, itaut non exurgat excretriſ vteri facultas.

V. Si ſanguine aleretur factus, minus ſuperflui redundare deberet in vltimis menſibus, cum factus ſit grandior, quam ante: Sed contrarium cernitur, cum magis mammae tunc turgeant, & lac in ijs ſit genitum; cuius cauſam Ariſtoteles, & alij referunt in maiorem copiam vſq; adhuc retenti menſtrui.

VI. Sed, & euidentiffimum argumentum ab Autopſia deſumitur; quod nempe vaſa matris ſanguinem continentia nō communicent cum factus vmbilico: nam nec illa vltra vterum, nec vaſa factus vltra vterinum hepar (ſic placenta nominant) exporriguntur; itaut ſi ſanguis excerni ſolitus ad vterum conſlueret, ibidem extrauafatus hæreret, & inflammationes pareret: Alia ergo materia illuc conſluere ſtatuenda, atque per venam vmbilicalem attrahi, quæ cum ſanguine in embryo-  
genito, ad placentaq; vulgo dictam per arteriam tranſmiſſo, mixta, intrō per hepar, & Cauam reuehatur ad Cor ipſius in ſanguinem ver-  
tenda: quare ſanguis ille, qui putatur à venis matris exporrectus, ab ipſo embryo-  
ne venit, & circulariter ſic mouetur.

VII. Atque hoc ipſum denuò colligi poteſt eo argumento, quod, ſi quis vterum prægnantis contueatur, omnia illius conceptacula lacte plenaprehendantur. Ad quod ſpectat, Laurentium ſcripſiſſe, pluri-  
mas puerperas copiam lactis per vterum excreuiſſe.

VIII. Eidem rei ſimiliter fidem facit id, quod notatur à Backio *Diſſert. de Cord. cap. 3.* nimirum ſuccum illum, qui è corpore vteri deſcendit, non forma ſanguinis, ſed oui albumini ſimilem prodire.

IX. Confirmat item hanc ſententiam Analogia ſanguificationis, ſeu potius chymoſis, quæ peragitur in adultis: quippe chymoſi illi, quæ ſit ex contemperatore chyli per lacteas prodeuntis cum ſanguine per Portam ad hepar remeante (ſit enim circulationis ab His introductæ leges ſanciunt) vt inde in Corde elaboratior reddatur, reſpondebit illa chymoſis, quæ in vterino hepate peragitur ex miſcella lactis ab vtero attrahi, & ſanguinis à corde factus illuc per arterias deportato, vt per venas reuehatur ad Cor.

X. Nec eſt præterrationem, quod ait Entius, ſerum illud, quod in vtero ſtatim à conceptu colligitur, præcedaneum eſſe craſſiori chylo; aquam verò, cui factus innatat, partem illam chyli tenuiorem eſſe, quæ in nato per renēs in veſicam deponitur: nam ſi ſanguinis materni ſerum eſſet, nequaquam acrimonia careret, adeoq; fieri non poſſet, quin tenerum infantem tanto temporis ſpatio vlceraſet, ac læderet.

XI. Huic item ſero analogum eſt illud, quod primis menſibus colligitur in mamma: Analogia autem illa identitatem materiae arguit, qua lac gignitur, & qua alimentum capit in vtero factus.

XII. His addito aliud ex Pallicio argumentum, nempe Fætum, vt emissis ab utero est, lac avidissimè ex mammis fugere, sanguinem verò respuere, quod indicat illum tali cibo vsque tunc vsum in utero fuisse: nec enim (inquit) dicendum, Naturam non edoctam, quæ vtilia sunt peragere; quia nulla dabitur ratio, qua non ad congenericum, diùq; familiarem succum potius rudis, ignarusq; puer spontè duceretur, quàm ad insuetum, nunquamq; antea fuctum; Quod quidem argumentum ex supra allato Hippocratis videtur pro parte desumptum esse.

XIII. Valet etiam alia eiusdem ex Harueio adducta ratio; quod scilicet in ventriculo tenuibusq; intestinis recens educti fætus reperitur quid lacti coagulato simile; quodd bile, & vrina, quæ secundæ coctionis excrementa sunt, vtraque vesica turgescit; & quod si mammaræ ipsius premantur, lac exprimitur, omnia indicia, chylo infantem ali, non sanguine.

XIV. Sed & si sanguis ad vterum pro nutriendo fætu protruditur, quomodo si illi detinetur, & eo pascitur fætus, ad mammas, vt lac euadat, transmittitur, & quam ratione tertio, quartoq; mense lac candicat, si tunc grandior fætus infans maiori indiget alimonia?

Hæc ponderosiora argumenta sunt, quibus Iuniores ad veterem eliminanda de fætus alitione sententiam vti solent, & quæ sequenti Capite ponderabuntur.

## CAPVT OCTAVVM.

*Soluntur omnia supra allata Partis argumenta.*

Respondetur ad exemplum ab ovo pulli deest tribus de causis innotidum monstratur.

**H**IS tamen omnibus nil obstantibus, certam tenere debemus Antiquorum opinionem tum circa conceptum, tum circa alitionem fætus: Nam quod primò afferitur exemplum de ovo pulli, vel alterius volatilis, nequicquam contra facit tribus de causis, quarum prior est, in ovo facundo vnà cum collecto masculi, & fæminæ semine adesse etiam vel actualiter, vel proximè sanguineum succum (vt multoties in ouis edendis non subuentaneis punctus sanguinolentus conspicitur), ex quo, & substantia, ac vi seminis, valido incubantis matris calore adiecti, putandum est, rationabiliter hepar generari, & Cor, neq; cerebrum; ea inuicem separari, & varia inter hæc nasci vasa, itaut postmodum per vmbilicum attracto succo paulatim cætera plasmenitur membra, ac simul alantur; tandemq; ex albo quoque in sanguineum. hepatis virtute, verso totum perfici, & augeri pullum. Circa quod obiter notandum quantum cum *Arist. lib. 3. de gen. ani. cap. 2.* fallatur Deusingius, quando supponit *lib. de motu cord. & sang. num. 10.* pullum generari ex oui albumine, & vitello nutrir, cum apertè videamus, punctum sanguineum vitello insitum esse; cum hic sit albo in sanguinem mutabilior, natura prius sit centrum circumferentia, & interior alitum alimento.

Sed

Sed & hoc apertè docet *Hipp. lib. de nat. pue. num. 4.* hisce notis: Volur-  
„ cris ex luteo oui nascitur hoc modo &c. ] Ergo etiam huiusmodi ani-  
malia ex semine, & sanguine gignuntur.

Altera causa est, quod ouum fecundum dicitur conceptum, forma-  
tumquè (vt in viuiparis embryo) vi seminis in matris vtero, & poten-  
tialiter viuens, extra tamen velociter educum ob multiplicatam fac-  
tum. Luteus autem ex sanguine sanè gignitur, vt illius temperata,  
dulcis lenis, nutrimentosq; substantia eiusdem suadet, sicuti, & albu-  
men feminosam esse substantiam, patet. A matre foris aliud non ha-  
bet, quàm natiui caloris auxilium, per quod membra, & actualis vita  
inducuntur, sicuti à mulieris vtero embryoni, & forma fœtus, & ani-  
malis vita subinduitur. Ergo ex sanguine, & semine fit, & alitur pullus,  
vt & homo.

Tertia ratio, quod alia est generatio animalis in vtero materno or-  
ganizati, & actualiter viuents; alia extra vterum formati, & ad ani-  
malis vitæ actum extrinsecus perducti: in illa enim, intruso semine  
ab vtero ipso suisq; vasīs suppeditatur materia conceptui, & alimenta  
necessaria debito tempore, ac vsque ad perfectam animalis forma-  
tionem, porriguntur: in hac autem, cum non aliunde posset de cæ-  
tero aliud obuenire, (intus enim vtero viuens affigi non debuerat) Na-  
tura totum id, quod generationi, seu verius viuificationi, organizationi,  
alitioniq; vsque ad fœtus perfectionem necessarium existit, in duriscu-  
lum putamen includit; eoq; amplius modo dispositum, vt homini quoq;  
cuius gratia cuncta huius Mundi à Deo creata sunt, pro optimotum ali-  
mento, tum medicamento inferuiret: cuique enim patet, quantum oua  
nutriant, & aspera demulceant: ideo hæc non actu sanguinea, quæ ab  
hominis natura horrentur, sed virtute quidem, & potentia proxima ta-  
lia esse debuerant, vt facile à cubantis calore ducerentur ad actum; Qui  
respectus in vterinis fœtibus, quibus vndique proximus sanguis actualis  
adeſt, non vigeat.

Quare non bene ab vno ad aliud exemplum sumitur. Et hic valde  
miror, quomodo tantum momentum faciant omnes hi moderni Scrip-  
tores in dicta formatione pulli, vt inde deducant formationem, ac ali-  
tionem hominis, inter quos maximè tanta diuersitas tum membrorum  
omnium, tum vasorum est, vt videmus. Quod si tamen insistatur ali-  
quam inde analogiam elucescere, videbimus, non minus, imò magis  
multò nostram exinde firmari opinionem, quàm contrariam; & primò  
ex illa bulla sanguinea vel plus, vel minus in ouo adhuc integro, vt di-  
ximus, inuenta, si fecundum sit, & vitelli sanguinea temperatura; se-  
cundò ex diuersitate alitionis pulli adhuc in ouo existentis, ab ea, quæ  
statim egresso sit: intus enim vel vitellus ad perfectionem vsque omniū  
corporis partium, vel oui albumen in vsum venit, cum foras pullus  
emissus grano, milio, pane &c. sine alterius mediatione cibi vtatur, &  
abq; timore absurdū, à ratione pro infantis vterina alitione lactea ad-  
dūcā adducta prætensi.



Soluitur pr  
imum argu  
mentum.

Nunc verò, ad argumenta veniens, ad primum respondeo, quod, si cum Hippocrate sentiatur, iuxta iam allatam eius interpretationem, quam nullatenus impugno, Natura ordinatissimè procederet, alens primo embryonem solo sanguine; deinde ipsi grandescenti, animalibusq; viribus excitatis, vltra sanguinem per vmbilicum introeuntem, modicum lactis per os degustandi addens, vt foras eductus lacti soli, dentire verò incipiens solidioribus paulatim se cibis debet: Si verò ab aliquo contendatur cum Galeno, ac cæteris, solum sanguinem per totam vteri gestationem inferuire pro cibo, à quibus neque diffentio, iam nec illa mutatio post emissum sætum mirabilis, cum non inconueniat, mutatis gradibus perfectionis, mutari quoque non intentionem, aut virtutem, sed secundarias solum cibi conditiones; nec periculosa, cum hac paucissimum à sanguine distet: etsi enim dixerit *Gal. 5. simpl. 2.*, lac mediū esse inter sanguinem, & pituitam, subdit tamen statim, recedere illud magis à pituita, accedereq; ad sanguinem. Quinimò hæc mutatio saluberrima censenda est: sicuti enim puero additur coctio ventriculi, quæ sætū feriabatur, ita conueniens erat alimentum quoq; inferius coctibilitate esse, quemadmodum & validiori facto ventriculo, à lacte ad solidiora alimenta transire decuit. Neque aliquis hic replicet, lac imò sanguini coctione præstare, si per nos verum est, lac è sanguine per mammarum coctionem fieri: nam huic iam dubio responsum fuit *supra cap. 2.* Hæ vero mutationes alimenti manifestè videntur etiam in cæteris nascentibus animalibus naturaliter obuenire: Etenim omne volatile intus oui liquore vescens, exterius semina, panes, cæteraq; symbolica alimenta ore deglutit, vt dictum est, & pisces, bombyces, cunctaq; ex seminali ouo nata animalia exteriore se statim alimento, & inueto connutriunt.

Soluitur se  
cundum ar  
gumentum.

Ad secundum dicitur, Naturam aliud agere spontè, aliud verò coactam: spontè enim mulier vsque ad decimum octauum annum circiter, vel parū ante, sicuti & adolescentulus, nil fundet sanguinis; quibus tamen si libra sanguinis extrahatur, vel aliquo ex casu, aut occasione à naribus exeat in maiori etiam copia, vel nil patientur, vel minimum. Cum ergo aliud sit mensium excretio, quæ spontanea est, aliud sætus alitio, quæ ex parte coacta, iure dixerò, malè ab vno ad aliud argumentari. Quod autem naturam mulieris partim coactè sætum nutrire dixerim, ex hoc prouenit, quod is per se viuens, & egens, ad se per hiantia, sibiq; continuata vasa alimentum allicit necessarium; matris verò natura partim transfert, quod sibi superfluum est, partim quod nec superabundat, attrahi permittit: Quare non mirandum, si mulier, solita quinque vel sex uncias tantum sanguinis quolibet mense excernere, sætum pariat multas libras pendentem: Idem namque videtur etiā in lactatione, quæ matri multò durior, & spontanea excretionem copiosior est: cui tamen ipsa sufficit plerunque ad puerum perfecte educandum. Hinc euenit quippè, vt mulier, cum grauida (tertiò, vel quarto mense

menſe tranſaſto), tùm lactans, quò excretioni, & diſſolutioni reſiſtat, multò plura cibaria ſumat, & maiora pocula ſiccet, ſi modò ad perfectiorem partus, & lactatio debet produci. Quod ſi vel ob ſtomachi imbecillitatem, vel ob iecoris inualiditatem, obſtructionemue, vel ob delicatulam naturę complexionem nec tantũ poteſt mulier alimentũ ſumere, nec tantum gignere ſanguinem valet, hinc abortus, hinc variandarum Nutricum neceſſitates quotidie à partibus familias perſentiuntur.

Vnde quaſo tot factuum ſponſinæ deperditiones, tot factantium demacrationes, tot facundarum imbecillitates, & ſenectæ præcoccs, niſi à nimia ſanguinis, & ſpirituum iaſtura? Alioqui ſi robuſta ſit mulier, quantò magis ex ea ſanguinis fugitur, tantò magis (largiori ſumpto cibo) adaugetur, & ſanguinis procreatio: hepar enim, ſi validum ſit, quicquid ei ſurripitur, à ventriculo rapit, & attrahendo refundit, vſquequò poſſit: Natura ſiquidem proportionatas inuicem, & conſentaneas hepatis, & ventriculi actiones conſtituit, itaut in ſano corpore, quantum coquit ventriculus, tantum & (ſacibus detractis) recoquat hepar, & e contra.

Neque tamen pueri Iuniores, mirandam ſanguinis quantitatem ad factum augendum, alendumq; requiri, quin poſſit à mediocri complexionem ferri: Nam hic ſupponendum eſt, ſanguinem ſuauiſſimè, & ſine ſpirituum iaſtura, ac ſerè furtim à factu rapi; nullam, vel pauciſſimam in factu ſequi reſolutionem tùm ob quietem aliti, tùm ob interdictum aeris acceſſum ( hæ autem duæ cauſæ ſunt in corporibus præcipuè diſſoluentes, motus, & aer), modicaq; excrementa ſeiungi ob attractæ benignioris materiæ, puritatem. Sed quod omnem amouet lapidem, quæ maior ratio, cur poſſit mulier ſufficere alitioni ex lacte, non ex ſanguine? qualecunque enim ſit, vel ex chylo, vel ex ſanguine lac, eadem erit materia vel ſanguini dempta, vel ipſi denegata, vel ob deſſuſionem ad vterum intercepta.

Ad tertium dicitur, nec de futurum conceptui alimentum, menſtruo ceſſante; quia alius ſuper eſt in venis ſanguis, qui menſtruo ſemper ſuccedit (nec enim alterius à reliquo ſanguine generis illum eſſe, putandum) & à genituræ vi trahitur, cui nec plurimus in principiis erit opus; Nec ab adueniente menſtruo obruendam fore: quia conceptus ipſe ora vaſorum occupat, nec plus admittit, quàm ſibi ſit neceſſe. Alioqui idem, imò maius eſſet periculum, ſi chylo deberet ali: niſi enim aduenienti ſanguini via præcluderetur, ſuffocaretur certius embryo, illius nihilo in alitionem conſumpto.

Ad quartum dicitur, imò ex antiqua opinione optimam reddi rationem, cur facta conceptione, ceſſent menſtrua, dicendo, id euenire tùm ob iam dictam vaſorum à genitura viſcida factam obæcationem; tùm ob totius conſtrictionem vteri, & per conſequens oris, & vaſorum eius; tùm ob conſumptionem ipſiuſmet ſanguinis etiam in primis menſibus in quantitate conſiderabili, & ſerè menſtruo æquali: tunc enim non ſolum

Solutur reſolium argumentum.

Solutur quartum argumentum.

solum embryo, sed & secundinæ, & ex secundinarum vasīs vmbilicalia quoque vasa formantur, itaut, etiam si paruitas embryonis paululum parvuli exquirat, inuolucrorū multiplicitas sanguinis partem absumat. His alia additur ratio, quod tunc gravidæ appetentia minuitur, & fastidia incipiunt (vt sentit *Hipp. lib. 5. aphor. 62.*) & vellitationes, aut picæ succrescunt, vnde & minus sanguinis gignitur; quæ omnia è contra esse deberent, si fætui, vltra matrem, chylus exsolceretur. Contra verò, si noua teneatur opinio, non sic promptum est rationem quadrantem reddere: vtcunque enim dicatur, diuerſi materiam gignendo sanguini aptam, quid dicetur de genito, de subito fluxuro, vel de actu fluente? vbi, & cur restitabit? quæ causa chylo iter mutabit? quæ ipsi ratio, qui motus, quæ noua attractio, vel impulsio insurget? quid valitura erit vteri naturæ mutatio, quæ non subito fit, ad affluentem, & iam confluentem sanguinem compescendum, chylum verò alliciendum?

Soluitur  
quintum ar-  
gumentum.

Ad quintum dicitur, rationem contrariam esse quidem verissimam, sed suppositum omninò falsum; maior enim multò sanguinis redundantia, (quicquid de excrementis aliud dicendum sit) quatuor primis fæturæ mensibus in matris corpore extat, quàm vltimis; cuius indicia corporis grauitas, ac segnities, venarum turgor, inappetentia, sanguinis è naribus eruptiones, & nonnunquam ex vteri ceruice, capitis dolores &c., quæ omnia, vel plura in principijs enata, exinde (si fælix succedat fætatio) paulatim cessant, & contraria assurgunt. Illud autem maioris redundantie postremis mensibus anatae argumentum à lacte desumptum, leuissimum est; cum arguat quidem maius fætui superfluum alimentum ob eius validiorem vim, à Cauæ germinibus validius attrahentem, ad mammas deponi (cuius signum est, lac primò post partum exiens aliquoties vitiosum esse): non autem copiosiores sanguinem in toto corpore retineri; sed contrarium potius esse, vt indicat matris extenuatio, oculorum liuiditas, & virium languor; Sicq; intelligendus venit Arist., & cum eo omnes alij, qui in similem causam lactis generationem referunt. Quod si aliquando ad venæ sectionem, vt præcaueatur abortus, confugere sit necesse, quis vquam vltimis mensibus, & non primis (ni morbus aliquis subſit) ad hoc illam laudabit?

Soluitur sex-  
tum argum-  
entum.

Ad sextum dicitur, inualidam nimis illam esse Autopsiam, cuius nomen tam crebrò inaniter ab his chyli fautoribus vsurpatur: ei siquidem tot fide dignorum Auctorum antiquissima, solidissimaq; repugnat Autopsia, per quam statuitur, à venarum, arteriarumq; matricularum osculis venas, arteriasq; per placentam in totum secundinarum ambitum produci, & ab ijs tum venas, tum arterias vmbilicales sanguine sca-  
tentes in embryonem insinuari, ipsiq; alimentum deferre. Sic statuit  
*Aristot. lib. 2. de gen. ani. 5. in principio, & Auerr. in comm. Gal lib. de  
format. fæt. cap. 2. Vesal. lib. 5. de corp. hum. fabr. cap. 17. alij;* per mul-  
ti Hippocrati innitentes, qui *lib. de ossim. part. loc. cit.* asserunt, vmbili-  
cum infantis vtere adhærere. Quibus & euentuum ratio applaudit; cū  
in

in violentis abortibus sanguinis ingens copia sequatur, quod non esset, nisi vasa sanguinea sætui inhiarent, inuolucris continuarentur, & ob violentiam vno diuelleretur. Quinimò, & in plurimis partibus aliqua sanguinis plus vel minus portio vna cum lochijs exit, & ad aliquot durat dies: vndenam ergo, nisi ab hiantibus adhuc sanguineis vasis? His fauet Bartholinus ipse, qui *lib. 1. Anatom. reform. cap. 36.* manifestè tradit, venas vteri sanguinem in placentam ferre, & ab hac vmbilicū eundem sanguinem ad sætum nutriendum ferre, quod pluriès dixerat cap. 28. Ostendant nunc aduersam tuentes opinionem, sic esse de suis lactiferis vasis, & quomodo sætui implantentur, & quomodo alimentum ferant: quicquid enim de alio succo ad placentam veniente comminiscuntur, imaginationis potius, quàm rei, specimen præfert.

Ad septimum respondetur, commentitium esse, quod de lactea substantia, conceptaculis omnibus vteri adhærescente, asseritur, nec tot Anatomicis, qui grauidos vteros conspexere, notum, qui solum concedunt, aliquid phlegmatis, mucī, pinguedinis, & feri, tū in vteris reperiri, tū sætus ambitu hæreret, tū à partu excerni. De Laurentij autem testificatis dicendum est, illum forsan in hoc falsum esse, putantem, quicquid album visitur, vel exit, chylum, seu lac, esse, vel ex his fieri; nil curant, siue lentum, siue fustum, siue crassum, siue tenue, siue pallidum, siue candicans illud sit, quasi lac sit quoddam genus, omnia alia præter sanguinem comprehendens, vel in similia degenerans. præterquàm quod à rarò contingentibus doctrina seria non sumitur. Hoc vnum scio, quotquot puerperas interrogauerim dixisse, solum ferum primū in omnium in naturali partu excerni, (aquæ ruptionem vulgo vocitant), de in puerum excuti, inde secundas, cruenta lochia, ac sanguinem; postremis verò diebus ichores, mucositatesque exire. Variant quidem hæc non rarò ordine, quantitate, & qualitate varijs de causis: non eò tamen vt adhuc vsque lacteum audierim, vel viderim à quaquam exiisse humorem. Semel tantum in vrinis sætantis febre longa detentæ per plures dies obseruaui similem lacti sedimen copiosum adfuisse (quod & in Viro febricitante vidi) cuius originem crudis crassiq; humoribus in venis affluentibus semper adscripi; quod confirmauit euentus: quamuis enim illa ritè; & vitalem, superstitemque puellam deinde pepererit, ipsa tamen tandem ex longa illa febre occubuit. Quinimò, si Hippocrati *lib. 5. aph. 45.* creditur, in quibus vteri acetabula sunt plena mucoris, abortus periculum indici potest.

Ad octauum dicitur, si quid vel post partum, vel ante, vel alijs temporibus albumini oui simile per vuluam exit (quod non semel euenit) longè a lactis natura distare tū consistentia, tū colore: cum lac magis album, crassumque sit, minus autem lentum, minusque lucidum: illud verò vel non nisi pruxita est, quæ ibi ex alente crudo sanguine remanet, & vtero vasique ob partum hiantibus exit, aut à corpore cacoehimo in cloacam secernitur, indeque, ore ad tempus referato, egredi-

Soluitur septimum argumentum.

Soluitur octauum argumentum.

tur; vel quicquam a spermaticis patibus elabescens: Dicerem enim, sperma aliquando esse, si vel gonorrhæa detineretur mulier, vt & viri solent, vel longo tempore ob viduitatem, aut aliam causam retentum semen, illa vteri deplendi occasione nacta, profluere; aliquando verò pituitositatem ab iisdem, & cæteris vasibus elabentem. Quicquid autem sit, distat longe ab oui albumine lac, nec ab vno ad aliud rite infertur.

Soluitur no-  
tum argu-  
mentum.

Ad nonum dicitur, Analogiam illam esse penitus fictitiam; cum ad placentam non quidem à corde fœtus exire sanguinem, sic asserendum, sed bene inde à venis vteri trahi, vt per vmbilicum ingrediens ad iecur eat, inibi ab aliqua cruditate vindicandus, & ad vniuersas partes deuehendus. Neque illa analogia necessaria extat, imò esset iniqua: quia sicuti exterius aliud est infantis, aliud adulti alimentum, ita rationi consonum est, proportionaliter aliud embryonis, aliud pueri nutrimentum.

Circulatio  
sanguinis in  
fœtu reser-  
uatur.

esse, vt superius quòque diximus, : Ad quid autem sanguinem exire à fœtu, putandum, vt iterum introeat? Et quæ ratio alia dabitur alimenti à matre in fœtum adeuntis, nisi dicamus, vel illud à fœtu trahi, vel ab vtero propelli, vel vtroque modo adigi? Vt cunque verò sit, quomodo duo simul contraria à fœtu fient? vt hinc trahat, illinc foras emittat? Vnde alitio, si tantum, vel maius esset id, quod per arterias exiret, quàm quod per venas remearet? et si enim venæ arterijs ampliores sint, celerior tamen in his motus. Præterquàm quod circulationi matris repugnaret circulatio fœtus, si matris arteriæ in arterias pueri debilioris impellerent, venæ autem illius ab huius venis redirent, vel è contra. Sed & quis circulationi infœtu statuatur finis? non sanguinis in extremis ab ambiente refrigerati, vel ob cordis distantiam incrudescens recalcificatio, vel recoctio: quia, vnde quaque ab vtero matris amplexus, ab aere fœtus vindicatur, & vbi à proprijs visceribus distet, matris magis viscera calidiora tangit. Non vt alantur partes; quia ad hoc sufficit, tantum ad membra sanguinis deriuari, quantum eis opus est, non superfluum. Non vt pulsui cordis materia suppeditetur: quia ad hoc motus sanguinis, & spirituum a corde, & arterijs ad venas, & ab his ad illa confluxio sufficit; sanguis verò solus potius liberam reciprocationem dyastoles, & systoles impediret.

Soluitur deci-  
mum argu-  
mentum.

Ad decimum dicitur, aliud esse serum, aliud lac, nec vbi serum, ibi lac succedendum: alioqui & ad renes, & ad vesicam magis, quàm alio lac colligeretur. Quinimò & in sanguine contineri, & ab eodem serum effluere, certissimum omnibus est: à lacte verò solummodò hoc mammis dari (vbi illud cernitur) vel etiam alijs glandulis (vbi supponitur), non alibi, rationi congruit: Ergo serum illud in vtero prægnante coaceruatum supponendum est à sanguine ad embryonem attracto superesse, & per vrinaculum vmbilicarem, vel per fœtus pudendum inter ipsum fœtum, & membranulam amnion excipi, prout Anatomicis hucusque placuit. Nec dubium, quod ab eo erodi possit cutis, tum ob benignitatem attracti sanguinis, ab infantis hepate vterius percolati,

&

& à bile feiuncti; tùm ob sordes illas, quæ cuti adhærent, in grandioribus seu adultis per lotiones, & indusia detractas; sic docente Vesallio loco supra citato. Ergo ex illius feri aduentu ( vt inuat repetere ) melius sanguinem illuc fluere solitum, quàm lac adesse, ac suggeri arguetur.

Ad vndecimum brevis est responsio, admittendo, eandem esse lactis materiam, & ex qua alitur fœtus. Ideo cum superius probatum sit, lac ex sanguine fieri, sic etiam concludendum videtur, fœtus alitionem ab eodem provenire.

Solvitur vndecimum argumentum.

Ad duodecimum respondetur, quod, si ab interpretata Hippocratis, Aristotelisq; opinione teneatur, cum per eam admissum sit, fœtum in utero, vltra umbilicale alimentum, aliquid etiam lacteæ substantiæ postremis mensibus degustare, clarum est, cessante in eius nativitate umbilici officio, remanere solam exsuctionem lactis iam ex parte assueti: Si verò strictim sanguine solo per umbilicum attracto nutrirî, existimetur, non inconuenire, sicuti mutatur agens, seu attrahens, ita & mutari obiectum: Umbilico igitur, qui vena, arteriaq; constat, adæquatam obiectum fuit sanguis; ori autem, in quo gustus instrumentum residet, magis adæquatam lac erit, utpotè quod tepidius, dulcius, sineq; alia exuperante qualitate, prout è contra sanguis calidior, asperior, & alicuius acrimoniæ non omnino expers, quiq; e vena emissus, etiam in ipsomet corpore calido concrevit, & venositatem quandam induit, ut ex hypochondrijs, & cordis passionibus, in huiusmodi casu eueniens, constat. Natura itaque magistrante, fuget quidem lac puer, non fuget sic sanguinem; vltra quod nec mulieri data papilla est, per quam sanguis, ut lac, possit emulgeri. Nec alio doctore opus habuit puer, cum & pullus sciat milium fugere, passeret sequi; granum, & milium mandere, zizaniam deferere. Et quis puero risum gemitum, ploratum, respirationem indicauit? horum verò nullum antea in utero exercuisse credibile est, quamuis vix emissus spiret, ploret, gemat, rideat. Sed quid plura? Etiam plantæ sibi congenerum trahere succum sciunt, & vbi is non adsit, potius emoriuntur, & arent.

Solvitur duodecimum argumentum.

Ad decimumtertium dicitur, etiamsi quid in ventriculo, tenuibusq; intestinis chylo simile reperiet, donetur, illud non chylum reuera, nec lac, sed vel superfluum quoddam alimenti esse illarum partium, vel potius excrementum eius, quod per venas mesaraicas è iecore trahi, superiori cap. 5. monstratum est. Quod bilis in felle, & serum in vesica adsit, certissimum esse signum secundæ coctionis, quæ sit in hepate, libenter admittimus: illud enim non esse omnino otiosum decebat. Et quamuis sanguis ei offeratur, è quo immediatè ali possit; nò tamen ad o perfectum illum à matre venire, arbitrandum est, ut aliqua non egeat iecoris expositione; idq; tribus de causis, & quia sanguis mulieb. is virili crudior; & quia qui ad uterum venit, nò omni vitio caret, & quia is in utero, ob huius excrementosam naturam aliquo modo conspurcatur; Et sic

Solvitur decimumtertium argumentum.



quid bilis, feriq; fecerni, est necesse, aliàs multò copiosiorum, si lacte aleretur infans, vt dictum est. Quod item in mammis pueri lac infit, sicuti & in thymo, pancreate, glandulis alijs, lacteisq; vasis; cum illud sit earum partium alimenti superfluum, non mirum, si partibus producentibus, quamvis alantur sanguine, simile fiat: quicquid enim gignitur, gignenti simile gignitur. Quod quidem negari non potest: alioquin eisdem suamet positio redarguet: qui enim ex chylo, ex lacte, ex semine fieret sanguis? Hæc autem dicta sunt in patrocinium sententiæ communioris: Nam si altera Hippocratis teneatur, omnia hæc subitò cadunt obiecta.

Solutus de-  
cimū quartū  
argumē-  
tum.

Ad decimum quartum dicitur, ideo vtero gerente, lacin mammis colligi, quia sanguis fluere ab vtero solitus, retinetur, ideoq; in mammis, quæ illi ita celebriter communicant, & ad excipiendam redundantiam videntur enatæ, deponitur: nec tamen probum gignitur lac, dum sanguinis ad eas delati pars melior in fætus alitione consumitur; melius inde gestationis progressu euadens ex suæ in minera moræ longitudine, & mulieris ob cor additum infantis aucto calore, & pinguiore aliqua succi parte illuc ab extento abdomine expressa iuxta iam dicta Hippocratis dictamina.

## CAPVT NONVM.

*Tot exempla Neotericorum à brutis sumpta non valere in hominis vterino alimento statuendo, monstratur.*

**V**ideretur sanè ex præmissis, optimè omnibus cōtrarijs argumentis satisfactum, communisq; & antiqua de fætus alitione stabilita opinio: Sed quoniam passim Deusingius, Harueius, ac alij illorum Affectæ, vt concludant, fætum humanum in vtero lacte, vel chylo solo pasci, ad hoc vtuntur exemplis aliorum animalium tùm quadrupedū, tùm volatiliū, tùm reptiliū à quorum dissectis grauidantibus vteris, vel ruptis ouis fætantibus, & iustratis omnibus, venantur, vel venari imaginantur talem illorum alendorum materiam; Ideò hic quàm malè, & in his determinandis, & in sanguinis officina statuenda tali argumento adeò innitantur, monstrare, operæ prætium duxi. Aliquam scilicet analogiam, & seū genericam alitionis formam inde desumi, nō inficiabor quidem (, cum communis omnibus vegetatiua anima infit): at specificam, vel individualem indidem alendi materiam argui, constanter nego. Vtpotè.

Exemplum  
brutalis ali-  
menti ad hu-  
manum, esse  
incongruum,  
ratio prima.

Si cuique speciei data est aliqua in pluribus peculiaris differentia multò magis cuique generi: aliud autem homo est, aliud sensibile animal, aliud planta: Hæc siquidem tria animarum præcipua genera ponit Philosophus, eoquē ordine inter se disposita, quod perfectius imperfectum quidem sub se continet, sed perfectiori modo dispositum: aliam

enim

enim videmus plantæ aliam animalis alitionem, alia instrumenta, aliam electionem. Initio itaque sumpto ab hominis dignitate, non valde circa hanc dilatabo ratiocinationem meam, cum quisque libenter concesserit, hominis conditionem supra omnium aliorum animantium naturam adeo præcellere, ut non immeritò illorum Dominans à Deo fuerit constitutus: Illius namque rationalitas cæteris cunctorum viuientium dotibus sola præfulget, & diuersam adeo constituit prærogatiuam, ut sicuti animalia plantis, ita homo cunctis animantibus præferatur, & diuersi generis constituatur. Sicuti igitur deforme esset animalium alimentum succum merè terreum statuere, propterea quod plantæ cum quibus illa communem habent animam vegetantem, eo nutriantur; ita non minus inconuenit ab alimento brutorum ex eo, quod communis utrisque sit anima sensitua, hominis alimentum conieciare.

Sed & si hominis tum animi mores, tum corporis temperaturam perpendamus, talem, & sic excellentem mediocritatem in omnibus seruare comperiemus, ut non iniuria sit velutilinea recta, iuxta quam obliquis omnibus norma præbetur: Ad illius namque benignitatem, pietatem, amorem, patientiamquæ cætera comparata animantia vel minus, vel magis talia nuncupantur; sicuti, & ipsius temperiei respectu animalia alia, & plantæ ipsæ calidæ, vel frigidæ habentur. Idem de accidentali illius forma aliorum animatorum respectu dicendum: gratia enim, pulchritudo, mollities carnis, membrorum proportio, corporis dispositio, aliarumque; externarum qualitatum fulgor sic aliorum sensibilem accidentibus præsidet, ut non minus hæc illis, quàm his plantarum figuræ, & dispositiones corporeæ cedant.

Hinc mirum non fiat, etiamsi gratis concederetur, cætera animantia in utero, chylo, lacte, pituitositate, vel alio his analogo, succo nutrirî, (quid enim de his, quæ foris sunt, pensitamus? Veterinarijs remittantur) hominem sanguine purissimo ali. Quæ varietas rationalis quoque esset, ut scilicet temperamento aliti corresponderet alimentum, utq; Genitorum animæ naturalia quæq; semina à primis suis natalibus imbereret homo: qui enim mores hominis homo, & matris filius retineret, si ex chylo illius nutrire, & auferceret? Quam cordis sympathiam, naturalemque morum similitudinem secum vehet chylus, qui è ventriculo per mesenterij ductulos procedat? Dicent, à Corde spiritus ventriculo impartiri: Sed spiritus tenuissimus, aereusquæ cum sit, facillimè dissoluitur, ut non possit morum symboleitatem imprimere, ac permanentem efficere.

Hanc autem varietatem vterini alimenti verisimiliter adesse, vltra allatas rationes plura arguere possunt. Primò nutritionis exterioris diuersitas: nam quamuis terrestrium animalium multa in sui ortus principio lacte pro cibo vtantur; plurima tamen, & omne volatiliū, & aquatiliū genus (præter Delphinum) sine lacte aluntur, ac viuunt: transactis verò in cunabulis, quàm rudiore tum cibo, tum potu cætera quoque

Varietatem  
humani, &  
feriarum ali-  
menti in utero  
multa argu-  
unt, & pri-  
mò externis  
cibi diuersi-

Inflammation  
firus, & nu-  
meri varietas

Diuerſitas  
materie, per  
tempora sa-  
pe concepti  
excutiis.

Differentia  
temporis vte-  
ro gestatio-  
nis.

Differentia  
vterorum &  
vaforum in  
eis existen-  
tium.

Diſcrentia  
excutiunt  
post partum.

quoque lactifera nutriantur, quàmque ijs delicatioribus, quauè arte tùm coctis, tùm fermentatis, conditis, & contritis ijsdem vteratur homo; cuique patet. Secundò diuerſitas ſitus, numerique; mammarum: nam hæ in cæteris animalibus, præter ſimiam, & pauciſſima alia, propè vterum, meſenterium, & pubem implantantur, itaut facillimum ſit à ventre aliquid per inconſpicuos ductus, vel porofitates in ipſas eruſtari, ſicuti, & ab ijs per anastoſes, & canaliculorum communionem aliquid lacteæ ſubſtantiæ in vterum deriuari: atuerò mulier mammæ habet in peſtore per ſeptum à ventre ſeiuncto, quarum ideo venæ à ſuperioribus, nempe axillaribus, & Cauæ ramis trahunt originem, ſolaque; aliaque anastoſi, & connexione cum vteri venis communicant. Item, & plures multis brutis mammæ, binæ autem mulieribus inſunt, & ſic in illis copia maior lactis. Tertiò diuerſitas materie ante conceptum in matricem prouenientis, ac ab ea ob ſuperfluitatem exeuntis: nulla enim alia animalia præter mulierem rubra, & ſanguinea menſtrua habent, vt docet *Alex. Maſſar. lib. 4. præſt. Med. cap. 1.* nam ſi aliquando aliquid ex vtero aliorum animantium exit, mucoſitas ſola, & quid ſeroſum eſt, nunquam ſanguis. Quartò diuerſitas ſætationis: Omnia enim alia animalia præſinitum à Natura tempus habent vteri geſtationis; nempe Equa duodecimo menſe, bos decimo, ſus tertio, canis ſecundo parit &c.: Mulier autem, & ſeptimo, & octauo, & nono, & decimo parturit menſe, vt idem *Maſſar. ex Hippocr., & Arſtot. tradit citato lib. cap. 11.* Quintò diuerſitas vteri, & vaſculorum eius: nam ſi Veſalio oculatiſſimo Anatomico creditur, *ls lib. 5. de corp. hum. fabr. cap. 16.* ſtudioſè inquirens, quid de acetabuli nomine intelligatur, dicit, ſe in oue prægnante varios in ſuperficie vteri ſinus adinueniſſe, in quidam ſemiglobuli eminebant, ac ſi piſæ dimidium agglutinatum eſſet. Idem & in Vacca, capra, ac Cerua obſeruaſſe, ſcribit. Multiplices quoque tùm arterias, tùm venas ſuis ſinibus in hæc capitula ex tuberare, ac conceptus tempore illa tubercula aperiri, ſemenque amplecti, & vaſa umbilicalia in ſætum exporſecta efformare, tradit: fruſtra autem (inquit) in muliebris vteri cavitare tubercula illa, quæ ſubſtana, & dimidiatae piſæ ſimillima eſſe diximus, indagabis: cum illa his penitus non donetur. ] Inſuper (ſubdit) in muliere, quæ non ita pridem concepit, in caſſum ſinus illos, quos coxendicis acetabulo conferebam, inquires; quod non ſolum hinc conijcio, quia non prægnantium mulierum vteri illis tubcribus proſus expertes ſunt, ſed quod per reſerutionem in muliere fuſte à marito interfecta, & quæ non multò ante conceperat, id etiam didicerim. ] Sextò diuerſitas exeuntium poſt partum: Vix enim videas mulierem ſine ſanguinis effuſſione parere, & cui non per aliquot dies rubra puerperia durent, multòque magis ſi violentus partus, vel abortus ſuperueniat; ſignum, ſanguiferas recludi, ac dehifcere venas: At alia animalia, ſolo ſeroſo humore, vixque; rubra mucoſitate cum ſecundina excretis, nil aliud inde, niſi aliquid viſcidi per paucos

paucos dies excernitur. Septimò diuersitas telpectu factus excundi modus: nam puer adhuc integro cum vmbilico secundinis continuato, & sanguinis non experie exit, vt illum refecare, & alligare sit necesse, adeo vt inuenti infantuli sint, qui ex neglecta ligaturæ integritate sanguinis copiam excreuerint, & post aliquot dies de vita periclitati sint, prout de infantula Alacis nata mihi certè relatum est: At aliorum animalium vmbilicus ex se ipso se iungitur, nec vllò vt plurimum opus habet ministerio, vel ligatura. Item & secundinæ nonnunquam mulieris adhuc vtero alligatæ cum magno ipsius periculo retinentur.

Quantum autem diuersitates illæ diuersum quoque humani factus à cæteris alimentum persuadere possint faciliè cuique vel leuiter in naturalibus experto patebit: De prima siquidem non est dubium: nam dum ab exterioribus, & visibilibus faciliè in interiorum, & inuisibilium cognitionem venimus, si sanguineorum animantium tot species lac nò gustant; vinum, aut cereui siam cuncta quoque alia minimè potant; cibos verò plurima diuersos mandunt; solus autem homo tot ciborum, potuumq; cocturis, purificationibus, custodijs, & dispositionibus utitur; nonne & sic diuersificari in vterina alitione, iuste dubitari potest?

De secunda, si proprium lactis gignandi membrum mamma est (: quod enim in cæteris corporis glandulis residet, lacti quidem simile quid est, sed non verum lac, cum & dulcedine, & mediocritate substantiæ careat) facilius quidem erit mutua lactis inter mammas, & vterum anadolis, si mammar prope ipsum vterum, sint, quàm si è longinquo. Si verò diceremus cum Hippocr. lac ad factum veniens non esse mammarum, sed quid pingue ab omento, & dulcissima sanguinis parte expressum, id quoque facilius veniet si mammar super ipsum omentum sint, quam si procul; Eademq; vigeat ratio, quando per lumbares ductus veniret, vt Deusingij Pars supponit. De tertia satis clara est diuersi-

tatis quoque alimenti deductio: nam si ab excretis cognoscimus, quæ, & in quibus partibus exuperent; nullum autem in natura datur superfluum frustra; cognoscimus etiam ex erumpentibus menstruis, in vtero superfuitatem adesse sanguinis ad factum humanum alendum vtilem, quicquid sit de brutis solas mucositates, & rarò, excernentibus. Quarta, quamuis paruum habere vim in intentam differentiam indicanda videatur, non tamen omninò reiicienda, cum ex ijs quoque temporum varietatibus naturæ, sicuti & alimenti aliqua varietas commonstratur: suum siquidem cuicunque generi datum esse à natura etiam alimenti modum, verisimillimum est. Quinta cæteris ad coniectandum validior: si enim muliebris vteri conformatio, & coryledonum, vasculorū, succiq; forma ab vteris, acetabulis, succoquè brutorum variant, variare simul, & concipiendi, & alendi modum, potest aprè deduci. A sexta adhuc maius discrimen arguitur: excretio namque sanguinis in muliere pariente illius retentionem in factante ad aliquod bonum arguit: Si verò sanguis ad alendum omnium aptissimus iudicatur, quid aliud boni

arguetur,

Differentia  
nutriendi  
modi, in pu-  
ris, & brutis  
obseruati.

Quid probet  
prima diuer-  
sitas.

Quid secun-  
da diuersitas  
valeat.

Quid tertia  
diuersitas in-  
ferat.

Quid quarta  
pollicet.

Quid quinta  
improbet.

Quid sexta  
arguat.

Quid sapientia  
concludat.

arguetur, quàm ab eo alimentum subministrari factui? in alijs autem animalibus sint illæ mucoſitates vel alimento deſtinatæ, vel alimento ſuperſint, quid ad nos, qui ſolum hominem contemplari volumus? ratum autem eſt, pituitam ſuccum incoctum eſſe, qui ſi ulterius coquatur, poteſt aptè alere. Septima tandem nec parùm in indicando varietatem ſupradictam valet: nam ſicuti in naſcente homine vmbilicus adhuc integer ſecundinis continuus, ſanguinis non inops mollisq; poteſt illius præſentaneum vſque tunc vſum ( ſanguinem ſcilicet ad factum vehendi ) manifeſtare; ita in cæteris animantibus illius facilis, ſeu ſpontanea ſeiunctio, ſanguinis, & conniuentia poſſunt atteſtari, eundem tandem inutilem ed vſum prædictum ob cutis ſuperereſcentiam euafiſſe, ita ut tunc factus ore ſugere cogeretur.

Si itaque tanta diſſimilitudo inter mulierem, & bruta cernitur, quod vetat, quamvis de his conuinceretur ( quod non conceditur ) chylum, ſeu lac ad conceptus alimoniam deſiderari, quin ſuſtineatur, humanum factum, vti nobiliorem, excellentiori anima donatum, ac ad egregia genitum, delicatiori ex materia formari, nobiliori, alimento nutriri?

Communi-  
tas vegetan-  
tis animæ nil  
contra con-  
cludit.

Neque iterum aliquis hic mihi obijciat communitalitatem animæ vegetantis, cuius opera videntur in omnibus vniformia eſſe debere: nam hoc intelligitur circa modum agendi in genere, non autem ſpecificè: inſtrumento quippe actionis, & ſpecifica, ſeu formalia obiecta diuerſo generi genere diuerſa, diuerſæ ſpeciei diuerſa quoque ſpecie conueniunt. Et ſic aliud arbori, aliud animali, aliud homini nutrimentum; aliaq; huius aſſumendi, coquendi, diſtribuendiq; organa cunctis efformata fuere: quæ tamen analogum operandi modum, ſinemq; cuncta habere, patet.

Quantuncunque autem donetur, etiam humanum factum, vti dictum eſt, aliquid in fine per os ſugere, nam illud chylum eſſe credendum? nequaquam, ſed potiùs lac è ſanguine ipſo in vterinis quibuſdam tubulis ſtagnante, vel à mammarijs venis exportatum eſſe, arbitrandum eſt. Et ſic *Lud. Mercat. lib. 3. de ſteril., & prægn. affect. cap. 19.* putat, ſanguinem, quo puer alitur, in vtero quoddam lactis rudimentum accipere. Harueus ipſe, qui albo ſucco factum paſci prædicat *lib. de gen. anim. p. 329., & 331.* tubulos illos in vtero animalium ( hic notandum, non de muliere dici ) eminentes, ac conceptui hæreſcentes plurimis arteriolarum, venularumq; ramulis ſcatere, vaſeq; vteri in carunculas illas deſinere, & ibi ex ſanguine lacteam gigni ſubſtantiam, ſcriptis mandauit. Et licet Deuſingio, qui per propria potiùs vaſcula ad vterum venire chylum, imaginatur, videatur, ex Harueij obſeruatione ( quæ Veſalij quoque eſt. *cir. lib. 5. cap. 1.* ) potiùs concludendum, factum illa ali ſanguine, vt & nobis & Veſalio etiam videtur: Attamen pro Harueio quis reſpondere poſſet, albugineum illum ſuccum ex ſanguine ab illis venis, arterijsq; non exeunte, ſed reſudante, in illis carunculis, veluti in glandulis generari.

Niſi

Nisi velis melius dicere, si quæ vascula in vtero sæmineo succum quandam albugineum, ouiq; albo similem continere reperiantur, vasa seminaria esse, quæ à testibus derivata, lacteorum æmula per vteri membranas disseminantur, & per eius latera corruata partim per vterum cornu in cavitatem vteri semen effundunt, partim infra os eius illud in cervicem efferunt, vt tradit, & ex Zerbo, Fernelio, Laurentio, & Varolio refert Bartholinus *lib. supracit. cap. 27.* Cum quibus vasculis, quid mirum, si conceptus aliquo modo communicet? Et hæc forsitan eadem vascula sunt, quæ vellet Deusingius, vel cuperet, pro Lacteis venditari.

Quamuis autem Aristot., & cum eo nonnulli contendant, sæminas femine carere: id tamen adeo viriliter impugnat Gal., & iuxta illius mentem discutit *Alex. Massar. lib. supracit. cap. 5., vt nunc omnibus* Anatomicis in confesso sit, eas semen profundere: etiam si aliqui falsò opinati fuerint, illud infæcundum esse. Et reuera idem Arist. deberet, & sæmineum semen, & sæcundum facillè ex suismet assertis concedere: nam *lib. 10. de hist. anim. cap. 4.* prosequens inditia aptitudinis muliebris, ad conceptum, ab vtero ea petit, sic dicens. Quæ autem circa ipsum, vterum euenire oporteat, hæc sunt. Primum vt in somnis tamquam cum viro coeat mulier, & profundat facillè perinde, ac si concumberet, ret, quod quantum sæpius euenire visum fuerit, tantò melius; vtq; surgens huiusmodi interdum curatione indigeat, quam, vbi cum Viro rem habuerit, adhibere consuevit, interdum exsiccatione. ] *Cap. 5.* Iam ore sic dixit: Nam & mulier sæcundum semen emittit. ] *Cap. 7.* vt fiat conceptus æqualem maris, & sæminæ concursus in semen emittendo desiderari scribit. Ibidem, & *cap. 8.* sæminas in somnis semen profundere, asserit, & vbi hoc efficitur, aliquando eas subleuari, cum satis multum est, quod superest, aliquando imbecillitari, scribit, sicuti quando cum Viro coeunt; necnon et ad conceptionem concurrere; Aues autem sæminas sine mare subuentanea oua concipere, quia semen intra se emittunt. Et quamuis id videatur negare *lib. 1. de gen. anim. cap. 20.* aduertatur tamen, rationem, quam adducit, debillimam esse, nam cum dicit, voluptatem, quam in coitu sentit mulier, ex perfricatione partis, & spirituum emissionem provenire, huic experientia repugnat; seminis enim emissio, vt in Viro, cum voluptate excidit, & finita emissionem, delectatio cessat. Cum vero dicit, id, quod emittitur, non esse seminale humorem, sed vteri excretionem, facile visu est, sub excrementi nomine ab Ipso semen includi; item quod nonnisi in coitu, vel coitus imaginatione, nec nisi cum delectatione illud in somnis exire, obseruatur. Sed ad quid sæcunditatem illa profusio in somnis facta ex parte mulieris arguet, & concursus in emissionem generationem adiuuabit, si inutile excrementum est?

De his plura possent dici, si res mea hæc esset. Tetigisse tamen volui, breui hac occasione nata, vt colligatur, quid illud aliquando sit, quod

Quid sit sæcundus albus, in vteri quibusdam vulnibus cõtentus.

Mulier semen habet, & illud sæcundum.

Idem ex Arist. assertum.



quod ab utero muliebri emanat oui albo simile. Quibus si quis contradicat, & pro Aristotelis contradictione indicanda asserat, prioribus in locis sub seminis nomine intelligi menstruum, fallitur; quia ibi de humiditate agit, quæ similis sit, ac si mulier cum Viro concumberet, & in *lib. de gen anim.* se solum tuetur cum hoc, quod sit excretio uterina.

## CAPVT DECIMVM.

*In fetus conceptu cum semine non chylum, sed sanguinem requiri, probatur ulterius.*

**H**Actenus de fetus alitione uterina egimus, quam, nisi me mea fallit affectio, ex sanguine fieri, vel si quid minimum in fine gestationis de lacte exquiratur, hoc quoque e sanguine gigni, satis superque probatum, & confirmatum est. Nec de conceptu quædam generaliora tacuimus. Nunc de hoc specialius disquirendum: Innata enim est nobis via (ait *Arist. 1. Phys. 2.*) à notioribus nobis ad notiora naturæ procedere. In quo quidem conceptu cum duo, præter formam, & finem, necessario exquirantur, unum scilicet, à quo principium motus, alterum ex quo fiat, seu circa quod versetur actio, nempe materia, sepositis ijs, quæ ad Medicam facultatem parum, vel nil facere videntur, hæc duo hic nunc quærimus; nunc scilicet ex sanguine, & semine fetus generetur, ut hucusque à Peripateticis, Medicisque; ferè omnibus tentum est, & ut in anterioribus non parum tetigimus, necne; Alterum ex quo semen ipsum in animante gignatur: Neque enim in Antiquiorum dilucidationibus acquiescere Iuniorum natura suffert; sed noua semper appetens, etiam vetera in hoc inuertere, & nouiora adducere festinat.

Fuit circa hæc quæstio celebris inter Aristotelem, & Galenum, an sanguis muliebris solius materiæ, semen autem solius principij à quo in generatione hominis munus obiret, an verò simul, & semen, & sanguis præter efficientiam in materiæ etiam officium intrarent. Aristoteles siquidem priorem sententiam patrocinator, merum efficientis munus virili semini attribuit, materiale autem sanguini menstruo assignauit: Sed Galenus notiori ab euidencia demonstratione usus, credidit, & erudiuit, semen utrunque esse quidem principium efficiens, sed & simul materiale, ex quo solidæ partes dictæ, & vasa præsertim spermatica constant; sanguinem verò nec materiæ solius vices supplere, sed & aliquid simul effectiui conferre. De qua quæstione, vti lucidissimè, & doctissimè à multis agitata, sed præcipuè ab *Alex. Massar. lib. 4. Pract. Med. cap. 5.* iam supra citato ne crambem recoquere videar, nolo quicquam dicere sufficiat tantummodò pro instituti nostri ratione annuere, mihi multò verioremi videri Galeni sententiam, qua supponitur, seminis substantiam ipsam in substantiam fetus transire, sanguinem sibi vomitem asciscendo, ad multaque peculiariter extendo.

*Verum*

Verum nunc ultra sentire videntur quidam Neoterici, inter quos forsitan Harueius principem locum obtinet, quem sequuntur Io. Claudius de la Couruee, & Anton. Deusingius, sanguinem cum eo ab huiusmodi functione prorsus ablegare, & eius loco lacteam substantiam substituere conantes: in hoc tamen dissentientes, quod illi lac vltimum quid arbitrantur ex sanguine dimanans, hic verò chylum à pancreate, & vasculis purificatum. Non hic se continet Pallierius in cæteris Deusingium sequutus, sed vterius progrediens, quam ille ancipitem, hic firmam, & asseuerantem protulit positionem, semen è chylo, non è sanguine produci constituens, vt videre est apud eum libro nuper edito cap. 22.

Quæ Harueii & aliorum de conceptus materiæ sit sententia.

Pallierius, semen è chylo fieri, tradit.

Quæ de fetu alitione dicuntur, de conceptu etiam valens

De priori tamen assertione (altera ad sequens caput dilata) in primis nonnulla hic annectenda videntur mihi: pauca tamen, tum quia de ea iam multa superioribus capitibus dicta fuere, tum quia cætera argumenta, quæ pro fetu alitione adducta fuerunt, sat sustinent, & concludunt, etiam ad conceptum requiri sanguinem, non chylum: Nam si quod minus videtur inesse, inest, ergo, & quod magis, minus autem naturæ opus est alitio quàm generatio: Si ergo ad illam non chylus, sed sanguis requiritur, ad hanc idem erit, & magis.

Sanguinis eminentia supra chylum ad conceptum hominis acit primo.

Vbi autem hoc propter aliud non conuinceretur, ex eo saltem videretur prorsus euincendum, quod sanguis nimirum animæ sit sedes præcipua, & proximum ad omnes actiones obeundas instrumentum, cui spiritus tum viuifici, tum naturales implantantur, ac indistincti inhærent: chylus autem, vt cunque per glandulas, & strictos aditus percoletur, semper quid frigidum est, & serosum, non alitioni immediatæ solùm, sed & conceptui quoque ineptissimum, quoadusque per hepatis transiens, & in sanguineas venas defluens arteriaci sanguinis per mutuas venarum, arteriarumque anastomoses spirituositatem foueat, & ad viuificandas actiones aptus constituatur. Tunc verò sanguis est, non amplius chylus: nam hepatis mæandros prætergressus, priorem formam amisit, nouamque purpuram indutus, vniuersale alitionis, & generationis imperium est assequutus. Propterea, quicquid de alijs esset animalibus (de quibus tamen idem sentiri, fas est), saltem in hominis omnium animantium Reguli productione non chylum quidem, sed sanguinem à Deo deputatum fuisse, quo naturales animæ influxus omnes sic intimè genitæ intruderentur proli, constantissimè tenendum.

Ad conceptum requiri sanguinem, probatur Autopsia Hippo

Et hoc insuper inuictissimè roboratur ab irrefragabili illa magni Coi Autopsia circa mulieris genituram dierum sex, quæ cuique panditur lib. de nat. pue. num. 4., quamque ad verbum refert, & fusè explicat Gal. lib. de fet. form. cap. 1. 2., & 3. Erat autem (ait ipse) velut si quis, ouo crudo externam testam circum circa adimat; in interna verò pellicula inclusus liquor pellucescat. Modus quidem talis erat, & vt abundè dicam, ruber erat liquor, & rotundus. In pellicula verò libræ quædam albæ, ac crassæ inesse videbantur cum cruore crasso, &

„ rubro obuolutæ : circum autem pelliculam foris cruenta vestigia  
 „ instar sugillatorum &c ] Quæ Autopsia veracissima cum sit, quid  
 poterunt dicere Neoterici, ab ovo pulli ad hominis generationem ar-  
 guentes? Tunc ne cor formatum iam esset, & sanguinem funderet?  
 Manifestum, quod non, & tamen ruber ille liquor intus, & in pellicula  
 cruor, & extra ipsam signa cruoris erant. Ex rubro autem illo globulo  
 non cor solum, sed & hepar, & cerebrum primò omnium erant fabre-  
 facienda, vt clarissimè ibidem innuit Gal., ac nouissimè Galtruchius in  
 sua *Physica particul. disput. 3. cap. 2.*

Probatu-  
 riam aucto-  
 ritate Theo-  
 log. Poet., &  
 Historiogr.

Addatur his auctoritas Theologorum, qui Christi conceptionem  
 memorantes, non lac, non chylum, sed sanguinem Mariæ purissimum  
 ( Spiritus Sancti obumbratione efficiente ) pro materia ex qua propo-  
 nunt. Poetæ item, & Historici omnes alicuius genealogiam proferen-  
 tes, semper ad sanguinem recurrunt, & stirpis communionem consan-  
 guinitatis nomine insignant; pro quo plura ex Ijs possem citare loca,  
 nisi vereretur frustra cartas implere.

Idem probat-  
 ur ex Salo-  
 mone,

His & sacræ paginæ acclamant, dum Salomon in sua Sapientia cap. 7.  
 „ Se in ventre materno carnem figuratum, decem mensium tempore  
 „ in sanguine coagulatum, ex semine hominis, & delectamento somni  
 „ conueniente appellat.

Respondetur  
 authoritati  
 ex Iob à Pal-  
 ladio citatæ.

Ex quo loco clarè patet, dictum illud *Iob. cap. 10.* ad huius nostræ  
 communis opinionis contradictionem à Pallerio adductum minimè  
 valere; quod melius adhuc constabit, si illud intimiùs consideremus.  
 „ Nonne ( inquit ibi Iob, Deum alloquendo ) sicut lac mulsisti me, &  
 „ sicut caseum me coagulasti? Ex quibus verbis, è lacte hominem fieri,  
 deducere vellet Pallerius: tibi autem non materiam, sed formandi mo-  
 dum Iob annuere, habetur ex Isidoro Clario in commen. his verbis:  
 „ Hic graphicè formatio hominis describitur; comparando scilicet  
 „ semen lacti, quod funditur primò, & deinde semen conceptum coa-  
 „ dunatur, vt concipiendis membrorum lineamentis sit commodius. ]  
 Et equidem ibi Sanctum Iob non de substantia ad conceptum requisita,  
 sed de modo, quo fit conceptio, loqui apparet ex illa dictione [ sicut ]  
 addita verbis actiuis [ mulsisti, & coagulasti ], vt innueret scilicet simi-  
 litudinem actionis, quæ magna, & palpabilis est: Sicut enim emulge-  
 tur è mammarum papillis lac, indeq; in vase opportuno, vt caseus fiat,  
 coagulatur; ita à turgente vtero quasi emulgetur è Viri membro semen,  
 & in se receptum comprehenditur, coagulaturquè à nativo eius calore  
 in sanguine, vt inquit Salomon. Quod si contendat ipse, illam dictio-  
 nem sicut non ad verba illa actiua, sed ad nomina [ lac, & caseum ] re-  
 ferri, ita ut similitudo materiæ non actionis ibi indicetur ( quæ tamen  
 non sic congruit ); Sciatur, hoc illi in nullo prodesse, tum quia similitudo  
 substantiæ arguit non identitatem, sed similitudinem originis, & sic  
 sicuti lac est alimenti superfluum, ita & semen: sed illud mammarum,  
 hoc testium; tum quia etiam si deduceretur identitas originis, vti supra  
 abundè

Vere illius  
 Iobi interpre-  
 ratio.

abundè probatum est, lac e sanguine fieri, ita & semen ex eodem esse, infra statuitur: Cum his verò nec sanguis a concursu, & adiutorio minime arcetur, qui per alteram superiore sententiam clarè admittitur.

Viget autem opinionem hanc de conceptu nostram, & magnum ex eodem Pallierio obicem affert, quod sanguis menstruus prauis qualitatibus videatur esse imbutus, vt deducitur ex quibusdam prauis, & ferè venenosissimis effectibus, qui de eo referuntur à Plinio, & à nonnullis vulgaribus facillimè creduntur: nam in hanc causam præcipuè reduci solet exitus variolarum, vel morbillorum cuique mortalium communis, & non raro perniciosus: Quare videtur absonum supponere similem materiam esse conceptioni proficuum.

Huic obiectioni respondetur primò cum Galtruchio in sua Physica part. disput. 3. cap. 1. menstruum esse optimæ notæ sanguinem (quatenus scilicet natura mulieris datur), sola ideo quantitate excedentem, ac superfluum ob illius frigidiorē temperiem, quæ sanguinis alioqui ferax parum, & minus, quam Vir, ex eo dissoluit; Item talem ad congruam generationem requiri. Hinc est, quod, si aliquando sanguis ille sit vitiosus, vt in quibusdam intemperatis, & morbosis mulieribus accidit, vel non, vel vitiosa fiat conceptio, & morbosus fætus ex ea generetur.

Quod si qui narrentur è menstruo in plantas, herbasq; venefici effectus, vel falsi sunt, vel in corruptionem sanguinis ipsius extrinsecus ab aere factam reducendi; vt enim dici solet, corruptio optimi pessima (& sic videmus quoque sanguinem virilem extra vasatum, si in corpore detineatur, lypothimias, & angores adducere); vel in vitiatam omnino menstruantis intemperiem, Variolarum verò, & morbillorum exitus, vel non in similem menstrui malitiam referendus venit, vel non prauitatem, sed solam ebulliendi aptitudinem arguit. Illud quidem, cum non omnibus, non sine influentia quadam epidemica, non eadem ætate, nec senex tantum singulis excitentur: hoc autem, quia, nisi illa epidemia subsit praua, ac pestilens, synocam, eamquè benignam, febrem inuehunt.

Sed quando aliqua menstrui prauitas detur (prout & dari potest) nec ideo à generatione hominis ablegandum esse, dicendum: siquidem in primis illa in vocata placenta, & membranis remittitur; sola benignior pars à valido semine attrahitur; & hepate genito, adhuc expositur, & coquitur vterius; vt hinc pateat, hallucinari eos, qui arbitrantur, embryonis hepar otiosum fore, ni chylus ad id feratur. Præterea huic incongruo ipsa Natura prospexit, cum vt plurimum de finente menstruo, & non nisi in sanis mulieribus, vel conualescentibus, purgatoq; corpore, ritè conceptio fiat, vt sanus exeat infans.

Verum dato etiam cum his omnibus, quod aliquod in eodem sanguine vitium inemendabile, & inuitabile insit, an propterea chylus aprior putabitur? Si in viridi hæc sunt, quid fiet in arido? si chylus ruior

Obiectiones  
menstrui ma-  
litiæ.

Respondetur  
primò.

Effectus ex  
menstruo prauo  
in quam  
causam con-  
sistendi.

Quid de va-  
riolarum exitu  
sentiendū

Respondetur  
secundò.

Respondetur  
tertio.

rudior est, minusq; defæcatus, quomodo, & cur erit magis à prauitate immunis? Et vnde gratia hæc rudi chylo, quæ depurato sanguine denegatur?

## CAPVT VNDECIMVM:

*Semen ex puriori sanguinis substantia, non è chylo fieri, probatur.*

*Ironicè chylo, ac ventriculo arrogata dignitas ampliat.*

**Q**uid nunc autem de semine audio? num & hoc ex chylo immediate gignetur? Equidem cum hoc in doctissimi Physici Opere conspexi, non potui non mirari diuersitatem humani captus, & ingenij: Et quid hoc maius dici poterat? Cadat nunc è folio suo sanguis, vel pronus assurgens ministro suo salue dicat. Cedat illius purpura incultæ chyli lanæ. Præsit aqua nero, præsent crystallæ rubinis. Cor, cerebrum, & hepar iam iam sedeant in antro, & salienti in Thronum Ventriculo assurgant; Nec iniuria, cum hic Rex humani corporis cum Q. Screnio ab eodem Pallierio cap. 16. nuncupetur. Quid ergo Regia valet, si omnes ad Coquinam accurrunt? Et quis Rex alter, quàm qui scit, & valet lautas, sapidasq; cunctis præparare, & exporrigere dapes? Quid adhuc ergo de Principatu vos tres corporis humani Principes simul contenditis, si quartus vltra vos, & ad altiora confurgit? Viuat Ventriculus, qui toti corpori, totiq; Naturæ hominis suppetias affert, & spirituum affluentium sola ope contentus, totum Microcosmum nutrit, regit, omninoq; suo nutu disponit. Sic est: quia sine chylo non viuit homo, chylo aluntur solidæ partes, è chylo lac gignitur, è chylo factus nutritur, & ex chylo generatio tota descendit; Sedet verò sanguis iners, vel irrequietus circular, quid superfluum, solaq; vigente necessitate aliquid boni ferens. Quinimò nec ferè inorbus oritur, cui non ventriculi affectus ansam dedit, & natiuitatem.

*Eidem Ventriculo ironica præfertur Pancreas, & Receptaculum.*

Sed cur amabò non Ventriculo Pancreas, venarum lactearum foboles, vel Pecqueti Receptaculum præfertur? quippè in his albedinem, puritatem, splendorem, ac omnimodam nutriendi facultatem (si his statim Auctoribus) acquirit chylus, qui priùs è ventriculo facibus mixtus, & eduliorum adhuc aliquo colore tinctus emanauit; Ab his toti corpori (carnibus exceptis) alimentum distribuitur, ab his lac in mammas abit, ab his semen in testes, ac in vterum factus origo, & nutritio dimanant.

*Sanguine clamat.*

O dirum fatum, quod nec parcat Heroibus. Ergo, & Principibus Coqui, ac depuratores; fontibus emunctoria; Plateis ductus inquinati præcellant? Ita nunc est, quando omnia retrogrado passu incedunt, præpostero modo tenentur. Mittamus ergo nugas.

*Improbatur Pallierij sententia de sanguinis gignendi materia.*

Equidem, cum de cæteris hucusque disceptatis aliqua verisimilitudo chylum euehat, in hoc de semine nouiter assumpto nullam prorsus adesse, contendo, præter albedinem, quæ videtur ab albo deuenisse, quæ

quasi albi omnes liquores, albaq; corpora vel ex albo fiant, vel illius sint germina. In quo quantum erretur, quivis faciliè percipiet, qui minimam naturalium facultatum cognitionem habuerit: Natura enim partium ea est, quæ in sibi similem liquorem ad se delatum conuertit, non è contra. Si sic autem non esset, quomodo ex albo chylo rubeus sanguis fieret? quomodo ex vino rubro, viridi edulio, flauo melle, & nigro tubere chylus albus exiret? quomodo sanguis ruber in solidis, & carne iterum albesceret? Et ex albo tandem quomodo nigra cutis in Aethiopo, nigra in oculo pupilla gignuntur, & aluntur? Sed hæc sunt, quæ Pallierio dura, & inutilia videntur, cum satius existimet, cuique parti similem à sagacissimo dispensatore porrigi succum. Hoc autè in sequentibus discutietur capitibus. Nunc de semine agendum. Circa quod illud inter nos conuenit, semen esse superfluum vltimi alimenti virtute testium elaboratum, & in proprijs vasculis seruatum. In hoc differimus, quod è sanguine, tamquam materia proxima illud fieri, ego ex Maiorum nostrorum opinione profiteor: Ille autem ex chylo. Hoc darem, si sano modo sumeretur, nempe ex chylo sanguinem, ex hoc lac, semen, & humidum radicale produci, ac instaurari, ita vt omnia è chylo mediata effici statuerentur: Sed hic non sistitur, dum immediatè ipsum solida alere, lac gignere, statum nutrire, semenq; producere, sustinetur.

Porro è sanguine semen fieri, ostendunt multa; Et primo continuatio spermaticorum vasculorum cum arterijs, ac venis sanguineis, quæ arguit quoq; continuitatem contenti succi, nisi quod à figura, & natura varia partis diuersificatur quoque contentorum substantiæ modus. Etenim, vt præclare affirmat *Gal. lib. de sem. cap. 12.* Arteria, & vena, ad utrumque testem descendere conspiciuntur non recto itinere, vt reliquæ omnes, sed instar capreoli, aut hederæ varijs modis inuolutæ: vnde vt puto, à dissectionis professoribus partim hæderaria, partim capreolaris natura ipsarum fuit appellata. In his verò capreolis, & anfractibus, quos faciunt, antequàm ad testes perueniant, albescere paulatim sanguinem videre licet; tùm demùm vbi iam ipsos testes attigerint, seminis substantia in ipsis manifestè apparet. Illi cæteri fauent Anatomici, & in specie Bartholinus *lib. 1. Anatom. reform. cap. 21. 22., & 23.* Ex altera autem nullum aliud vas illuc chylum ferens ad hucufq; Anatomicis patuit.

Vidit huius rationis vim Pallierius; ideo dixit, chylum vel per proprios ductus, vel per venas fluere: Sed vbi hoc esset, dicendum est, vel chylum hunc priusquàm in venas has feratur, hepatis parenchyma transfretare; vel per nouos ductus in Cavam, indeq; in testium venas; vel, vt vult Pecquetus in Cor, & ab eo in arterias, ab his autem in testes confluere. Si primo modo, quis imaginari poterit, in tot venularum gyrationibus, & icorarij parenchymatis contactibus quid impermixti manere, & non in sanguinem verti? Si secundo, cur Natura voluit præ-

Ex sanguine  
semen fieri.  
prima ratio  
à vascorū con-  
tinuitate.

Quid respon-  
deat Pallie-  
rius.  
Aduertitur.



Chylus sanguini mixtus sanguis fit.

terire hepar, vt candidum seruaret chylum pro seminis productione, & inde in sanguineas venas ducere, & cum cruore miscere? Et cur chyli minimum multo sanguini mixtum non fiet sanguis? vel quæ contra Seipsum sententia, quæ circulationem, cui latè suberibit ipse destrueret? Equidem si viuât sanguis, & nutritur, vt videtur is admittere, dum illum ex se moueri, affirmat, & ali ex Hipp. auctoritate autumat; manifestum, quod fiet sanguis: si autem non viuât (vt qui nec ex se mouetur, nec rectè ali, sed metaphoricè dicitur) sola mixtio plurimi minimum corrumpet, & vel à venis ipsis, quibus talis ab hepate facultas inditur, in sanguinem mutabitur. Sed & quomodo illud dabitur, si suæ Circulationi, quæ venis reductionem, non adductionem permittit, stetur? Si tertio, quomodo Cor pertransiens, & arterias peruadens, adhuc poterit chylus consistere, & non vocitari, fieriq; reuera sanguis? Patet ergo, è sanguine, non è chylō semen fieri.

Secunda ratio à subsequenti sanguinis emissionē.

Pallierij responsio refellitur.

Idem probat assumptum, quod, si quis nimis validè, & frequenter Veneri incumbat, sanguinem loco seminis emittit; quod indicat properatam euacuationem, vt non potuerit sanguis adhuc concoqui, & in semen abire: nam ad id & alteratio, & tempus commodum exquiruntur. Et hoc idem fuit argumentum Hippocratis loco inferius adducendo de hom. struct., & Aristotelis 1. de gen. anim. 19. Cuius vim nequaquam infringit responsio Pallierij, ubi dicit, hoc ideo accidere, quia exhaustis semine vasculis, ac crebritate emissionis, corporisq; concussionē infirmatis, sanguis accurrit, vt proximior, & rarefactus, reclususq; a forō osculis, tenuissimus cum sit, profilit postmodum exhausti seminis vice. ] In primis enim à suamet conclusionē refellitur pag. 127. ubi hæc protulit: Chylus igitur, siuè per proprios ductus, siuè per venas deuehatur, rudior est seminis materies, ex qua inde perfectè conficitur, spermaticis ipsum vasculis præparantibus, & excoquentibus aduenientibus inde iunctisq; spiritibus cum sanguine arterioso, qui fermenti quodammodo vices gerit, nobiliori forma decoratur. ] Vanè ergo recurritur ad reclusionem osculorum, cum sic ex eo possit optimè à calefactis arterijs adducentibus sanguis educto semini succedere. Item quia si ora venarum recluderentur, non sic facilè cessaret sanguinis emissio, quin & inuoluntariè per semel obtentum exitum emitteretur, aut in cavitates alias laberetur, maxime ex arterijs, quæ difficilè ocluduntur. Item quia si verus esset, & ordinarius illuc chyli accessus, non sanguis, sed chylus deberet vice spermatis emanare.

Tertio ratio à seminis ratione quædam.

Probatur item ex hoc, quod è paucō semine gignitur animal simile in specie, & in indiuiduo, nempe Genitoribus: non in facie solum, sed multoties in quolibet membro, nec solum circa efficiens, sed & circa vires, & affectiones tum corporis, tum animi, & in quod obstat, etiam intellectus. Hanc autem sic eximiam virtutem in parua materia supponere aliter non licet, nisi dicamus, illam vel ab omnibus, vel saltè à nobilissimis partibus; & ijs, quæ virtute cæteras omnes continent, in

testes deriuatam, ibiq; vltèriùs expolitam esse. Eam igitur aliunde venire, nisi per riuulos neruorum, arteriarum, venarumq; quæ toto cum corpore, singulog; membro communicant, à fontibus animalium, vitulum, naturaliumq; actionum, cerebro nempe, cordè, ac iecore, quis possit iustè imaginari? Per eos autem canales aliud influere, quàm spiritus, ac sanguinem, sensui non patet. Ergo ex iisdem semen fieri, est asserendum. De priori verò propositione experientia rerum magistra fidem facit. Videmus enim tum filios, tum filias et plurimum patri, vel matri, vel vtrique assimilari informatione, habitu, viribus secundum partes ipsas quoque; itaut podagrici, phytici, nephritici, lienosi &c. sæpissimè in filios propriam labem transferant, nisi ab alterius Parentis contrario robore alterius imbecillitas euincatur. Ita etiam rixosi, iracundi, melancholici, faceti, audaces &c., etiam similia multoties habent germina. Et sic de reliquis.

Hic verò opponent Contrarij, huiusmodi non esse certa, cum videamus à sanis aliquando parentibus vitiatos, & à morbofis sanos edi parit, sicuti, & in cæteris omnibus accidentibus; itaut concludi possit, illas similitudines potius casuales esse, quàm à vi seminis prodire. Pareant verò mihi, in hoc non benè sentiunt. Dicerem quidem ego, merè casuales dissimilitudines, quæ à mille euentibus, vel imaginationis vi tum in vtero, tum in educatione obueniunt; non similitudines, quæ Naturæ, si quid aliud familiarissimè sunt; cum aspiciamus, non animalia solum, sed & plantas ipsas similes patri, matri, vel vtrique fætus producere, non in specie, & natura tantum, sed & in accidentibus quamplurimis magnitudinis, coloris, figuræ, temperiei, virium. Ne ergo opponant cæcum, vel mancum aliquando ab integris, & lynceis parentibus productum: quia, si in vtero talis fiat, id non nisi ex aliquo externo, accidente, vel interno vteri symptomate eueniet: si verò extra, merò euentui imputandum; Neque opponant videntem à cæco, & integrum à mutilo productum: quia saltem alter genitorum, & validior, videns, & integer erit.

Comprobat etiam ex eo, quod Vir, ac mulier, semine emisso, tristantur, cum antea gesticantes, & voluptuosi ambo essent: Ergo signum, semen in se aliquod lætificans continuisse, quo amisso, tristitia insurgat. Nullus autem humorum ad lætitiā confert, nisi sanguis, cuius temperies Cor exhilarat. Ex hoc ergo semen constare, asserendum. Probatur illud ex Hippocrate, qui lib. de hom. stru. num. 2. dixit Qui puri sanguinis non in expertes sunt, hi vsquequaque ridet, & aspectu, ac corpore floridi, necnon perspicui coloris existunt. ] Quod de chylo nec is, nec alius dixit. Et sic ideo vinum Cor lætificare dicitur, quia sanguini analogum, & in sanguinem facillimè transit.

Conualidatur quoque eo, quia, si modum excedat Coitus, summè corpus debilitatur; & tamen pauca est materia, quæ excernitur: signū ergo eam nobilissimam, & validissimam esse. Quis autem valor è ven-

Filij parentibus similes etiam in partibus sunt.

Oppositum ad eandem.

Tollitur.

Dissimilitudo filiorum casualis similis à natura.

Quarta ratio à succedente tristitia post Venærem.

Soluti signa ex humoribus hilaritatem confert.

Quinta ratio à debilitate coitum inferente.

*Pallierij re-  
sponſiones  
eliduntur.*

*Dupliciter  
exiunt à va-  
ſis ſpiritus.*

*Vbi ſanguis  
chylus cedit.*

*Sensu ratio à  
fecunditate  
ſanguineorū*

*Obieſtio.*

*Reſponſio.*

*Omnes in  
hepate gi-  
gnuntur co-  
genei hu-  
more.*

triculo, & à materia rudi, vt chylo? Dicet Pallierius, id à ſpirituum excretorum copia euenire: Sed qui ſpiritus à lacteis vaſis ſemini ſuppeditari poſſunt, quæ vt eorum fautores volunt, à nullo principalium membrorum trahunt originem? Dicet, ab arterijs, ac venis ipſis ſuppeditari: Sciat autem, exinde ſpiritus exire, vt & à neruis, dupliciter, hoc eſt vel aeris modo, vel cum ſucco aliquo mixtos. Si dixerit primo modo, iam non magis valoris in ſpermatice imprimetur vaſa, quàm in ventriculum, inteſtina, & veſicam: in has enim partes non minus ea implantantur, ac ſpiritus fundunt, quàm in vaſa prædicta, & tamen ab illis partibus copioſa euacuata materia, non adeo languent vires, vt ab his exigua. Ergo non eo ſolo communicari modo ſpiritus, ſed peculiariter imprimi, dicendum, prout, & Pallierius ipſe, vti iam ſupra ex eo attulimus ſentit. Si ſecundo, iam habemus intentum: ad quid enim chylus, ſi ſanguis adest? Vbi maior, minor ceſſat. Et ad quid ſanguis, ſi chylus? vnus eorum ſuperfluus; fruſtra fit per plura, quod per pauciora fieri poteſt. Agnouit autem robur argumenti vir eruditiffimus, ideoque; addidit Atterò cur admittere chylum, qui arteriaci ſanguinis ope indigeat, & reiſcere ipſum ſanguineum, qui ſimul cum venali, & materiam ſimul, & vim imprimat? Si enim a ſanguine arterioſo ſolam vim ſpirituum exhiberi contendat, quam mihi aſſignabit cauſam, quæ illam ſubſtantiam ablegget, ſola virtute relictæ? Quod ſi dixerit, a venis retrahi, ac reduci ſanguinem verſus Cor, vt volunt Circulationis fautores, quam viam aſſignabit ipſe chylo per venas, quæ ſit contraria dictæ reductioni? niſi intricata repugnantia.

Addatur, quod ſemine abundant, qui bono corporis habitu præditi, & ſanguinei ſunt, non qui copioſè edunt, ſi obæſi, vel extenuati. Ergo &c. Declaratur antecedens: Conualeſcentes ex longa ægri tudine, et ſi copioſè edant, benèq; chyliſcent, niſi mediocrem ſanguinis quantitatem fuerint adepti; & phlegmatofi, bilioſiq; quamuis moderatè alantur, & concoquant, vel pauci ſimū, vel morboſum ſemen emittunt. Reſpondebit ipſe, conualeſcentes non aſſuere ſemine, quamuis copioſè edant; quia corpus egenum præripit chylum, & non feratur ad teſtes; phlegmatofos autem, vel bilioſos chylum prauum gignere, & ineptum ad ſeminis productionem: Sed inutilis hæc reſponſio ei, qui poſuit, chylum ex ſe per corpus moueri: ſi enim ex ſe mouetur, cur non omniquaque confluet, & in ſolitos ductus? quæ ratio ei inerit, vt ſomniet, ſibi eundem ad hepatis, non ad teſtes? Adde, & cæteris, quod teſtes inter validiora membra adnumerantur, vt propterea dubium non ſit, quin magis de chylo, quàm plura alia, ad ſe retraherent, ſi modò aliud à ſanguine ei iter ineſt, & cibatio affluens. Circa phlegmatofos autem, & bilioſos, quamuis nonnullis videatur, phlegma in ventriculo produci; communior tamen opinio eſt, humores omnes gigni in hepate, vt qui ſanguini conuaſcuntur; in ventriculo autem ſolum conteri cibum, & ad ſanguinem,

guinem, sicuti, & ad excrementa fecernenda parari: si ergo per ipsum chyli portio, quæ adenosas, solidasq; partes alere, mammæ replere, vterum fecundare, testesq; semine donare debet, per nouas lacteas, vel per porositates defluit, non est, cur in ijs non generetur semen cibo respondens. Tollitur verò magis omnis obiectio, si dixerò, in ratione supponi moderatam tum cibationem, tum chyli ficationem, quæ possunt cum phlegmatico, & bilioso, saltè ad tempus, consistere, & sic si peculiaris chylo ductus pro semine datur, patet, antecedens supradictum verificari, & per consequens ad intentum nostrum conclusionem elici.

Vltimò semen è sanguine confici, vniuersa ad hucusque Medicorum, Philosophorumq; Schola tenuit cū Principibus suis Hippocrate, Galeno, & Aristotele. Sed quia Pallierius omnia sua ex Hippocratis doctrina stabilire stotente, reliquis prætermisiss, in hoc solo insistam. Is ergo *lib. de hom. struct. num. 6.* sic loquitur: Lac autem, & eodem modo genitale semen hominis ex sanguine gignuntur; & hoc certum est: si enim homo genitali plus nimio vtatur, sanguinem pro semine emit- tet. Similiter autem, & fæminæ si plus nimio lactare cogantur, sanguis elicitor. Quid clariùs dici poterat? Quo commento hic opus? Eadem est materia lactis. & seminis, nisi quod alia ad semen, alia ad lac opus est elaboratione, aliaq; parte concoquente. Hucusque acquiescit Pallierius: sed (inquit) lac ex chylo fieri, probatum; ergo & semen. At cur dimidiare auctoritatem? Is non solum dixit, eandem esse materiam seminis, & lactis; sed è sanguine vtrunq; fieri perhibuit. Testis dictum diuidi non potest, vt communiter Iurisperiti tenent, & in specie *Surdus lib. 2. cons. 173. num. 68., & Giurba consil. 23. num. 3.* Inciuile enim est (ait *lex 24. ff. de leg., & Senatuscon. lib. 1. tit. 3.*) nisi tota lege perspecta, vna aliqua particula eius proposita, iudicare, vel respondere.]

Sed videamus nunc, quid dicat *Hipp lib. de genit. num. 1.* Genitura Viris (inquit) provenit ab omni humido, quod in corpore existit, ita ut id, quod robustissimum est, fecernatur. Argumentum autem eius, quod robustissimum fecernitur, est, quod à Veneris usu, paucula ad eò remissa, imbecilles redduntur. Stabat autem res hoc modo: Venæ & nervi ab omni corpore in pudendum vergunt, quibus, dum aliquantulum teruntur, & calefcunt, ac implentur, velut pruritus incidit, & ex hoc toti corpori voluptas, ac caliditas accedit. ] *num. 4.* viam designans, sic ait: Atuerò pueris venulæ tenues, & repletæ, existentes, genituræ transitum impediunt, & pruritus ipsi non similiter accedit, & propterea neque conquassatur in corpore humidum ad genituræ secretionem. Quin & Virginibus, quo vsque iuuentulæ fuerint, menses non procedunt propter eandem causam. Postquam autem adoleuerint & virgo, & puer, venæ in pudendum pueri tendentes, itèmq; virginis in vterum amplæ sunt præ augmento, & oscula ipsarum, aperiantur, & via, ac transitus per angustias contin-

Septima ratio ab auctore citata.

Vera Hipp. sententia.

Quid dicat Hipp. lib. de genit.

*Idem expli-  
entur senten-  
tia.*

git. ] Ex his apertè patet, quid ex eo sit semen, nempe quid robustissi-  
mum; ex quo in genere fiat, hoc est ab omni humido; & per quam  
viam, ad testes ducatur, scilicet per venas. Annuat & proportionem,  
analogiam, & similitudinem, quam semen viri cum mulieris mensibus  
possidet, tùm iuxta ætatem, fluxus causam, ductus, ac per consequens  
originem: Vnde ex hoc loco verosimile est, Aristotelem, qui multa ab  
Hipp. mutuauit, suam desumpsisse opinionem, quæ insinuat loco cit.  
*p. de gen. ani. 19.* circa vtraque hæc vilia excrementa. Reliquum er-  
go est, vt quod in genere dixit Hipp. specificè declaratur: Effer enim  
anceps nimis oratio tam vniuersalis, nempe ab omni humido: sic enim  
ritè quis potuisset suspicari, etiam à sero, chylo, mucos, semen exire. Sed  
,, suspicio omnis tollitur per ea, quæ 5. subiungit, & sunt hæc: Porro  
,, genituram dico à toto corpore secerni, & à solidis, & à mollibus,  
,, partibus, & ab humido omni in toto corpore. Sunt autem humidi  
,, species quatuor sanguis, bilis, aqua, & pituita: tot enim species con-  
,, genitas homo in seipso habet, & ab his morbi fiunt, aut etiam ex  
,, morbis discretiones. ] Quid autem aliud est in corpore sanguis ge-  
neraliter sumptus, quàm massa illa cruenta constans ex sanguine stri-  
ctius sumpto, pituita, & vtraque bile, nempe flaua, & atra? hi enim  
congeniti in nobis dicuntur humores, qui elementis vniuersalibus, &  
annit temporibus respondent, & ex quibus tùm gignimur, formamur,  
nutrimurq; vt tradit *Gal. 8. de placit. Hipp. & Plat. 4.* hic autem per  
aquam intelligi melancholiam obichoris, seriq; copiam ipsi ingenitam,  
siue annexam, constat ex alio Hipp. loco, nempe *lib. de hom. nat. num.*  
,, 5. & 8. vbi sic loquitur: Atuerò corpus hominis habet in seipso san-  
,, guinem, & pituitam, & bilem duplicem, flauam videlicet, & ni-  
,, gram, atque hæc sunt ipsi corporis natura, & per hæc, & egrotat,  
,, & sanus est. ] Sicuti, & hos homini esse congenitos humores, fuscè  
ibi idem explicat.

*Quid per om-  
ne humidum  
intelligat  
Hippocr.*

In vanum ergo Pallierius extorquere conatur ab Hippocrate, & se-  
men, & lacex chylo fieri: illam namque propositionem, semen ab  
omni corporis humido secerni declarauit, quando, quid pro illo omni  
humido intelligat, subiunxit: notum enim est, per speciem derogari ge-  
neri; Et inclusionem vnius esse exclusionem alterius. Quis autem  
dixerit rectè, chylum, qui propriè in via alimentum est, & proxima  
sanguinis materia, esse humidum corpori congenitum? Aut quis alius  
sperabit talem ex Hippocrate deducere conclusionem.

*Confirmatur  
alia Hipp.  
auctoritate.*

Quod si vel his ipse non acquiescat, audiat alium eiusdem Auctoris  
,, locum *lib. 4. de morb. num. 1.* vbi hæc sunt verba. Ad hominis ge-  
,, nerationem de omnibus, & Viri, & mulieris partibus semen progres-  
,, sum, & in vterum muliebrem illapsum condensatur, temporeq; ve-  
,, niente, natura hominis formam referens producitur. Habet autem  
,, & mulier, & Vir quatuor species humorum in corpore à quibus mor-  
,, bi fiunt, qui non violentia fiunt. Sunt autem species hæc pituita, san-  
guis,

## CAPVT DVODECIMVM. 277

„guis, bilis, & hydrops, suæ aqua; & de his non minima, neque debiliſſima in ſemen procedit portio. Ex hoc tamen loco aliquid ad ſui fauorem videbitur ſibi trahere Pallierius, dum parùm infra dicit Hipp., quod Ventriculus dum plenus eſt, omnium horum humorum corpori ſons eſt. Sed quomodo intelligi hoc debeat, declarat, dum dicit, in omnibus cibis, ac potibus, & bilioſi quid eſſe, & aquoſi, & ſanguinei, & pituiſoſi; quæ dum comedit, ac bibit homo, corpus omne per venas trahit è ventriculo. Conceditur autem, ſanguinem venoſum gigni ex chylo, & ex hoc eodem omnes emanare humores: At ex eo ſemen produci, antequàm iſdem geniti fuerint, nec dixit Hippocrates, nec ex dictis deducitur. Mediatè hoc fieri, iam inter nos conuenit: ſed ſic improprie loquemur, & non ad propoſitæ quæſtionis incudem: hoc verò modo, & ſemen à pane, vino, & carnibus fieri, etiam dici poſſet; cum ab his chylus fiat, inde ſanguis, & hinc alimenti ſuperfluum in qua; parte: At ſimilis impropria locutio hic non habet locum, ubi diſputatur, nùm ſemen ex ſanguine, vt voluit ex Hippocrate Galenus: nùm verò ex chylo, vt quidam Neoterici ſentiunt, qui vellent ſe Hippocr., vmbra tueri, immediatè producat.

Nec verò rurfus diſputo de legitimitate eorum librorum, cum res mihi ſit cum Viro, qui ſibi hanc legem præfixit, quæcunque Hippocrati Opera adſcribuntur, tamquam eius propria acceptandi; neque ob id viro de improprietate nominis aquæ humori atro attributi, vt colligitur ex adſcriptione ſplenis pro eius fonte facta: ſufficit enim mihi monſtraſſe, chylum non includi inter humores homini congenitos, niſi priùs per venas toti corpori diſpenſetur, quod lingua noſtra ſonat niſi priùs in chymum, ſeu in ſanguinem latè ſumptum, fuerit verſus: Sed quid ad nubila cùrrimus, ſi clara habemus? Quæ ex libro de hom. ſtruct. allata ſunt, nulla indigent interpretatione.

## CAPVT DVODECIMVM.

*Proponuntur in eodem ſubiectò contrariæ pro chylo rationes,  
& diluuntur.*

**H**ÆC, & alia, quæ poſſent ex ijs, quæ de lacte ſupra diximus, addi adminicula, in claram nos ducere veritatem videntur de ſeminis geneologia, & origine, quam nimis deiſcere mihi viſus eſt Vir doctiſſimus, dum natalia adeo rudia ei aſſignauit. Is attamen, ne omninò ſeminis decori detraheret, voluit in alio illud nobilitare, excrementi nomen, quod ab Ariſtotele, & Galeno iuſtè ei inuſtum fuerat, extirpare ſtudens: promulgauit enim, incongruere ſic nobilis ſpeciei reparatori cognomen ſæcibus, & inquinamenti commune. Scrupuloſa conſcientia, quæ ſtudet quoslibet alteri illatos defeſus compenſare: Inanis verò compenſatio, & manca, quæ pro re detracta titulos, & accidentia reponit.



Nomina ge-  
nerica spe-  
cietum nobi-  
sitali nō ob-  
sunt.

ponit. Nè tamen hoc illum sollicitet: generica enim nomina non obesse solent claritati specierum, quæ per differentiam additam ab alijs inferioribus distinguuntur, suumque dignum recuperant, imò retinent locum. Quid leoni derogat nomen corporis, quod, & lapidibus. & luto competit? Adiuncto animati cognomento, tota iactura refarcitur. Quid hominem obscurat animalis nomen, quod cum tot feris, obscænisque animalibus commune obtinuit? ipsi rationale additum totum refundit honorem. Patiatur ergo Pallierius, & quivis alius, semini nomen excrementi inditum fuisse, cæteris inquinatis excretionibus etiam oppositum: vilis namque cognomine iuncto, omnis reponitur dignitas, & ea, quæ super inutilia alia excrementa sublimat; Veram autem ex altera ei ex genesi à nobilitate sanguinis, & spirituum parte manantem, vt ex supra allatis constat rationibus, restituat, & sic competens detractiōi restitutio fiet.

Excrementi  
nomen semi-  
nis dignita-  
tē, Vt illi ad-  
dito, non mi-  
nuat.

Prima ratio  
ab Hipp. au-  
thoritate.

Ijs autem non sic facillè acquiescet ipse, aut alius aliquis novitatum amans, nisi prius contrariæ rationes, quæcunque sint, diluantur. Suam igitur Viri iste intentionem in Hippocratis auctoramento repōnens, præter allatam ab ipso auctoritatem lib. de genit., cui abundè satisfecimus nos, eam contra afferentem contorquentes, nonnullas alias in medium affert, è quibus vel antiquam prostrernere, vel novam eleuare propositionem satagit. Ex libro igitur de alimento num. 8.

Ex lib. de  
alum. num. 8.

hanc extraxit positionem. Lac, & sanguis alimenti sunt redundan-  
tia ] per quam innui videtur, aliam esse laetis genesis præter sangui-  
nem; si enim ambo ex alimento superfluiunt, ergo neutrum illor-  
um ex altero: sed nulla alia materia aptior chylo ob mutuam simili-  
tudinem, ergo è chylo lac fiet: Eadem autem est materia semi-  
nis, & laetis, vt alibi dixisse Hippocratem, supra allatum est: Ergo &  
semen ex chylo. Alter locus ex eodem libro nu. 1. desumptus est,  
vbi Hipp. dixit Alimentum, & alimenti species vnum, & multa: vñ  
quidem, quatenus vnum genus est: species verò humiditate & siccita-  
te finitur. ] Cum ergo diuersum sit alimentum partium, non ex sanguine omnes alentur, & sic plures ex chylo, & inter illas testes glandularum æmuli; Ergo & semen, quod eorum superfluum est, ex chylo gignitur. Tertius locus ex eodem pariter libro num. 2. extractus est;

Ex eodem  
lib. num. 2.

quod & ad sanguinem peruenit alimentum, sicuti, & ad pituitam &c.: non ergo sanguis ipse alimentum est, & sic nec ex eo semen, cum & hoc sit ex alimenti superfluo. Verba Hipp. sunt. Facultas alimenti peruenit & ad ossa, & ad omnes partes; & in neruum, & in venam, & in arteriam, & in musculum, & in pelliculam, & carnem, & pinguedinem, & sanguinem, & pituitam, & medullam, & cerebrum &c. ]

Prima hæc  
ratio refel-  
litur.

Sed nimis à longe petitur consequentia talis: Nam de genuina Hippocratis mente sat ex dictis in proximè anterioris capitis fine constat: quare sufficiat solum monstrare, eum à contradictionibus esse immunem. Et circa primò allatam auctoritatem hoc facillè fiet, si hic adaptetur

tetur Gálēni sententia, quam statim in primo Operis capite attulimus ex lib. 6. de placit. Hipp. & Plat. cap. 8., ubi quomodo chylus ventriculi, sanguis autem iecoris sit alimenti superfluum, declarat his verbis: „Sicuti igitur ventris reliquæ iecori accommodæ sunt; eodem modo „quod a iecoris alimenti superuacaneum est, reliquis omnibus utile „efficitur. J. Quo exemplo patet dubij solutio: sicuti enim ex eo quod chylus & sanguis dicantur alimenti superfluum, non ideo benè negatur, sanguinem ex chylis & hunc ex mensis, ac potatis fieri, ita quamuis lac, & sanguis dicantur a cibo alimenti redundantia, non ob id tollitur, quin lac, quod è mām;inarum alimento superest, sanguini, qui iecori alito superabundat, sua debeat natalia, sicuti & semen. Id enim comparatum natura est; vt vnaquæque pars alteri successiue, ac vicissim inferuiat, quamvis pro se ipsa tantum laborare videatur. Imò ex hac Hipp. testificatione discere poterat Auctor hic, non benè ab ipso mām;inata, quæm fœcus, & lactis retinacula tantum statui, cum lac sit ipsarum gratiosum opificum, quod quæ suo iecori prodigo dispensatori ob sui imbecillitatem reddere nequeunt, alijs infantum iecoribus liberaliter retribuunt: nam nil naturale iners, nil inutile, nil ingratum in Natura.

Respondetur  
ad primam  
auctoritatem

Non benè  
mam;ina di-  
cuntur fœcus

Minus ex secunda auctoritate contra sanguinis dignitatē alimentitiā concluditur, quæ imò in eius redundat fauorem. Etenim sanguis, si propriè loquamur, vnum alimentum genere est, totiq; aptè corpori commune; plura verò specie, cum sit substantia proprium quidem formam retinens, sed varijs composita succis, secundum quos cuilibet parti proprium subministrat alimentum, vel pinguis, vel biliosum, vel melancholicum, vel purè sanguineum, vel aqueum, vel mixtum iuxta diuersitatem partium, quæ quod sibi magis simile, natura ducente, trahunt, sibiq; verè assimilatum addunt. Sed (quod ad radices penetrat) extra rem illa facit auctoritas: ibi enim nil aliud intendit Hippocrates, quàm primam alimenti diuisionem facere in humidum, & siccum, quasi dicat, alimentis aliud comestibile aliud potabile: nūm verò ex chylis, vel ex sanguine contingat imediata alitio ne quidem ibi per somnium. De hoc autem in sequentibus disquiretur capitibus.

Respondetur  
ad secundam  
auctoritatem

Sanguis ali-  
mentum vñ  
& plura di-  
citur.

Ad tertiam auctoritatem dicendum est, dupliciter intelligi posse aliquid nutriri, scilicet propriè, vel impropriè, siuè similitudinariè & equiuocè. Si de prima nutritione agatur, ea solis viuentibus, & animatis partibus corporibusq; competit, vt quæ sit alimenti contentio in eandem aliti substantiam, quod dissoluta instaurentur, & viuificæ operationes exerceantur; Et hæc nullo modo sanguini competit nutritio; nam nec viuut ille, nec stabilimentum possidet ad viuificas in se actiones exercendas; nec nutriendi corporis proprias dimensiones, secundum quas omnes quid ali dicitur, à natura obtinuit; & in summa quia succus, seu liquor est, cuius proprium est alieno termino tetminari, non terminare, prout competit viuenti, vt propterea is tantum sit proximum viuentis

Respondetur  
ad tertiam  
auctoritatem

Vera nutritio  
solis viuenti-  
bus compe-  
tit.

Sanguis nec  
nutritus, nec  
vinit propriè

animæ

Improprie  
nutritio cuius  
bet rei potest  
adpreari.

Quomodo  
quid possit  
& alens, &  
alitur dici.

Secunda ra-  
tio Pallierij  
ab ista, quæ  
semen sug-  
nit, vel diss-  
pant.  
Dissoluitur.

Ure, & se-  
men, quæ su-  
gat, & quo-  
modo.

Quæ semen  
gignunt san-  
guinis sunt  
secreta.

animæ instrumentum ad omnes obeundas actiones aptum. Si de secun-  
do nutriendi modo agatur, qui vnicuique corpori, siuè fluxili, siuè solido,  
siuè viuenti, siuè non conuenire potest; æquiuocè enim dicimus, ignem  
ali oleo, lignis, esca, flumina fontibus &c. Hoc inquam modo sanguinè  
quoque, & pituitam, & serum nutriri, dici potest. (Hæc etiam euocari  
potest & alius alendi modus, scilicet metaphoricè dictus, qui & accideti-  
bus ipsis aptè attribuitur, vt si quis asserat, rixas susurratationibus, irasquè  
nutriri minis.) De ambobus autem ijs modis nutriendi ibi loqni Hippo-  
cratem constat, cum dicat, alimentum attingere & solida, & succos, &  
spiritus, & calidum, & humidum. Quare, cum diuersimodè sumatur, &  
alio, & alimentum, patet, posse quid simul dici & alens, & alitum; alens  
nempe propriè, alitum verò per similitudinem, vt in casu nostro san-  
guinis. Ex ipso enim, vniuersum corpus alitur, is verò à cibis, ac po-  
tibus, varijs tùm ventriculi, tùm venarum, tùm iecoris interscedenti-  
bus alterationibus instauratur. Nisi cum ijs sentiremus, qui sanguinem  
quoque viuere, & ali, ac alere, opinantur, sed absônè.

Altera ratio, qua vitur Pallierius, est, quod multa passim remedia  
ad incrementum, vel decrementum seminis exhibentur (sicuti & pro  
lacte fit), quæ non videntur respicere sanguinem: Atuerò huic facili-  
est responsio, si cum Galeno *lib. 5. de simpl. med. facul. cap. 21.* dixerò,  
Lactis, & seminis effectrices facultates esse partim in medicamentis,  
partim in alimentis. In medicamentis, cum, succos pituitosos ex-  
calcfacientes, in sanguinem vertimus; in alimentis autem, secundum  
substantiæ totius similitudinem, vbi videlicet boni sunt succi, & mo-  
deratè humida, ac tepidè calida, cedit ipsum lac. J Sed peculiarius de  
semine cap. 23 vbi sic legitur: Vt lac, ita & semen quædam generare  
dicuntur, & quæ his sunt contraria, extinguere: tùm quædam pro-  
uocare, & ipsis contraria suppressere &c. Igitur semen generant cibi  
quidem, quibendè nutriunt, & flatuosi sunt, toisq; substantijs fami-  
liares: medicamenta verò flatuosa, & calida: Extinguunt autem  
desiccantia, & refrigerantia omnia, & quæ totis substantijs sunt  
contraria. Porro prouocant, quæcunque calida sunt, & fluuiosa  
absque desiccatione; suppressunt verò contraria. J Ex quibus con-  
stat, quæ semen gignunt, si alimenta, optimi nutrimenti esse, & sic  
sanguinis feracia, in medicamenta, etiam temperie sua sanguin m ipsum  
imitari: quæ verò semen interimunt, siuè alimenta, siuè medicamenta  
sint, frigida, & sicca esse, & ad sanguinem ineptissima. Hæc quiuis  
experiri potest in seipso: nam si quis per plures dies carnes, ouaq; relin-  
quens, edat pisces, fructus, olera; locoq; vini aquam bibat, manifestè  
sentiet, in se Veneris sctus retundi; qui alioqui carnibus, ouis, ac vino  
utens, carnis stimulos persentiet acutiores: Cætera autem, quæ vel  
prouocare, vel frænare coitum dicuntur, ad nostram rem non faciunt,  
cum aliud sit semen affluere, aliud ad Venerem incitari; Vel si facere  
quis velit, manifestum est, multò facilius sanguinem calidum, spiritu-  
sumq;

sumq; moueri, quàm chylum, eius respectu frigidam, ac segnem, sicuti, & calida, non frigida, ciere.

Facilis motus  
ab immoderato  
coitu coitus  
quàm chylum

## CAPVT DECIMVM TERTIVM.

*Alia adducuntur rationes pro chylo facientes, & dissoluntur.*

**Q**uoniam verò quò magis impugnatur veritas, eò magis elucescit, non erit incongruum hùc alias quasdam ad idem asserre rationes.

Ijs igitur addatur, quod qui nimio coitu vtuntur, in primis, & ante omnia ventriculi imbecillitatem magnam contrahunt: Signum ergo, ex effusione seminis dæsum fuisse, quod non esset, nisi ab ipso peculiariter procederet semen.

Prima pro  
chylo ratio  
ab immoderato  
coitu coitus  
effectu de-  
sumpta.

Respondetur, non magis lædi ventriculum, cæteris coquentibus partibus, iecore, corde, cerebro &c., solummodò verò facilius, citiusq; eius læsionem sentiri, vt qui non solum naturali coctioni, velut cætera, sed & animali appetitui præest. Argumento sit, non minus facile sentiri oculorum languorem, nervosarumq; partium debilitatem, quæ in sensationis actu elucet facillimè; ex altera verò, quamuis non minus lædantur reliquæ partes, non tamen sic promptè illarum percipi notas. Respondetur vterius, ex eo non argui seminis immediatam originem à ventriculo, sed propriè natiui caloris imbecillitatem: sicut enim illius robur præcipue in coctionibus vniuersalibus innotescit, ita & debilitas: Sic enim &, si sanguinis fluxerit multitudo, quamuis eius immediata coctio fiat in iecore, ventriculus tamen læditur quamprimum, vt desumitur ex *Gal. 4. aphor. 27.* multò ergo magis ex immodico coitu, in quo magna sit dissolutio spirituum, non solum ob excretionem seminis, sed & ob actionis ferè tensiuam violentiam, & volupuosam cutis ab incalescentia rarefactionem.

Ad eam rō  
spondetur.

Ad idem probandum tendit ventriculi cruditas à coitu proximè post cibum initio proueniens, propter quam sanitatis tuendæ consultores non nisi in paucissimis quibusdam casibus, illum hora simili permittunt. Quid autem arguet, nisi magnum seminis cum chylo, & testiu cum ventriculo consensum? Veruntamen (non negato interim damno, quod ab educto semine, vbi maximè illius aliqua penuria subsit, toti, & ventriculo prouenit, de quo in proximè antecedenti solutione dictum est), nunc dicimus, alias esse causas hic adductæ cruditatis, præter seminis cognitionem cum chylo; nempe spirituum, & natiui caloris distractionem a coquente ventriculo ad pudenda, ac ad omnes partes exteriores; veluti si quis ebullienti lebeti flammam detrahat; qua ratione etiam importunæ vigiliæ, cerebri; profundæ meditationes statim à cibo eidem obsunt eximè; Et violentum alui, clunium, & vniuersi corporis motum, à quo cibi, potusue e ventriculo intempestiuè trahuntur; nam etiam vio-

Secunda ratio à cruditate ob intemperatum coitum orta.

Solutur.

Quoniam autem  
causæ extrinsecæ  
distantur ex coitu  
post cibum.

lentæ tunc temporis exercitationes non parum coitioni officiant. Vbi autem causa clara est, ad quid confugere ad sympathicam, & occultam?

Tertio ratio  
à ieiunio. &  
erapale efflu-  
tu circa Ve-  
nerem.

Soluitur.

Sed & si quis sanguinis copia seu plenitudine mediocri polleat, ieiunium verò seruet, semen ei deficit; & è contra si quis opipare viuat, quamvis plenus non sit, ad eorum incitatur: Ergo ex chyli, non sanguinis abundantia fit semen. Soluitur autem argumentum hoc, detecta propositionum fallacia: in priori enim adducitur plenitudo, sed additur mediocritas, quod tamen additū plenitudinis energiam destruit, per quam supponitur sanguinis excessus, quo existente, dubium nō est, si ex tolerabili ieiunio destrueretur semen, dicendum fore, non ex sanguine, sed ex chylo semen produci: Verum sic sumpta plenitudine, falsa propositio est: nam imò sicut plenitudo nutritioni obest, & ob id talem habitum statim solvere iubet Hipp. p. aphor. 3. ut rursus nutrirī incipiat, ita & productioni feminis oberit, ut propterea ieiunio potius propagari, non minus censetur: At si de mediocri sanguinis quantitate intelligatur, vera quidem propositio est; patet enim tunc ex ieiunio defuturū semen: sed consequentia fallit: quia tunc rationabiliter deficit semen, cum eius materia, nimirum sanguis deficiat: in ieiunio namque magna sit dissolutio sine reparatione, & sic citò ex mediocritate parcitas inducitur. Ventriculus item, dum plenus est, omnium humorum corpori, fons est: verum ubi vacuus, corpore fruitur colliquecente, (ait Hipp. lib. 4. de morb. num. 2.) Quare cum semen ex superfluo sit, cessante superfluo, necessario cessabit & ipsum.

Alterā itē propositio amphibologiam continet, qua soluta, soluitur & vis rationis: Dum enim dicitur, si quis opipare viuat, quamvis plenus non sit incitatur ad coitum, sub illa narratione plenitudinis potest intelligi vel sanguinis mediocritas, vel penuria. Si mediocritas intelligatur, currit propositio, non consequentia: quia in vita opipara cum sanguinis mediocritate facillimè superfluum in sanguine inducitur, & sic apparet, tunc rationabiliter semen redundare ab ipso chyli aduentu: At si intelligatur sanguinis penuria, curret quidem consequentia; Sed non inmittitur propositio: quia, ut in anteriori capite diximus, antequam ad mediocritatem sanguinis corpus perveniat, non erit superfluum, & sic nec feminis superfluitas fiet. Quod si contendatur, nonnunquam sine sanguinis mediocritate aliquando ad eorum incitari, ut in melancholicis, & conualescentibus accidit non raro animadvertendum est, aliud esse feminis redundantiam, aliud incrementum ad coitum: incitatur enim quis vel ob turgentiam affluentis feminis, vel ob imaginationis vim, vel ob aliquam iritantem qualitatem in spermaticis ductibus existentem. Et sic quisquis femine superabundat, ad Venereum inclinatur, non autem è contra quisquis incitatur, femine affluit: furit enim in sathyrasi homo, & in insano amore, etsi femine careat; melancholici, ac hypochondriaci sunt elaces ob flatuum copiam;

&c

## CAPVT DECIMVM TERTIVM. 283

& conualefcens nonnunquam, vel cibo venereo vtens ex acrimonia, feminis vel noctu polluitur, vel ad venerem prolicitur. Sicq; patet alia amphibolon >ltima præmiſſarum, dum dicitur ſine ſanguinis redundantia quendam ad coitum incitari, quod quid diuerſum eſt ab intentâ feminis affluentia.

Non minus facit, quod quæ ad Venerem proliciunt, paucarum horarum ſpatio ad turgentiam deducunt; veriſimile ergo, ex illo cibo, non eſt ſanguine, qui antea Venas occupabat, illam luxuriæ incitationem, & cōſequenter feminis aſuſione provenire: Sed reſpondetur, niſi impedire, quin medicamento, vel alimenti viſ horarum ſpatio per Venas pna cum ſanguine iam exiſtente deuehatur ad locum, quò naturaliter inclinât, ibiq; naturam ſtimulando rentiginem inducat multò melius quàm per inconſpicuos meatus: proprietates enim remediorum ineffabiles ſunt, & mirabiles eorū effectus, vt in hoc tempus terere non ſit opus. Non benè autem à medicamento ad alimentum arguitur: illud enim abſque quod in chylum abeat, operatur; hoc non niſi coctum, in chyliq; ſubſtantiam mutatum in Venas rapitur, nec niſi ſanguis fiat, alit, aut ſuperfluum gignit.

Vrget quoque id, quod aliquando experimur, nonnullos gonorrhæa correptos quotidie excernere ſemen, & tamen, ſi iuuenes ſint, & viuunt opiparè, non valde viſes imbecillitari; quod arguit, non adeo egregiam, nobilemq; materiam eſſe ſemen, quin poſſit ex chylo faciliè generari, addita vi teſtibus a ſpiritibus, qui copioſi illuc per arterias deſluunt: Dicitur tamen, non parem eſſe rationem ſeminis cocti, ac laudabilis cum ſemine vel crudo vel vitiatis humoribus commixto; item & diſſerre colationem, quæ ſine vlla vi, & ſine adiumento ſpirituum, ſed ſpontè, ſit, ab emiſſione viuida, & robuſta, in qua copioſi, & concurunt, & diſſoluuntur, & educuntur ſpiritus; & tandem non valere argumentum à præternaturali ad naturalem excretionem. Patet autem, magis multò imbecillitari corpus ab educatione congeneratorum forti, ac violenta, quàm ab educatione extraneorum, demiſſa, aut ſuperabundantium. Id quod etiam in gonorrhæa ipſa experimur, in qua quidein, ſi verum ſemen educatur, ſummè viſes fatiſcere, corpusq; contabefcere videmus; ſi verò virulenta, aut pituitofa crudaq; exeant, parùm debilitari corpus, conſpicimus.

Tandem ſi plantas conſideremus, videbimus, ab ipſis adeo aliquando copioſum erumpere cum fructu ſemen, vt ipſa ſola vniâ totam plantam ſerè pondere æquent, idq; nec ſemper, ſed ſola anni parte Vere, æſtate, vel Autumno. Arguit hoc ergo, nec ſic egregiam illius eſſe materiam, nec à congenito, ſed à nouiter affluente generari ſucco; aliter nec ſic copioſa eſſent, & ſemper erumperent. Hoc etiam de plurimis animalium conſtat, quæ quadam ſola anni tempore ad Venerem ſeruntur cum cæteris non minus ſanguine ſecurum.

Soluntur autem dubia hæc ſequenti modo. Pauciſſimam in primis

Quarta ratio  
ab incitantibus  
ad Venerem.

Soluitur.

Quinta ratio  
à gonorrhæa.

Soluitur.

Sexta ratio à  
plantarum,  
& animalium  
exemplo.

Soluitur.



esse proportionem inter plantarum, cæterarumq; animalium, ac hominis ipsius generationem (quicquid de nutritione, actu purè naturali sit) ex hoc constat, quod, ut in homine perfecta, ita in plantis nulla, in animantibus imperfecta datur eiusdem electio: illæ enim purè naturales, terræq; affixæ cum sint, non possunt nisi cum terræ statu, ac cæli constitutione regi; Et sic, dum hyeme terra quiescit, & alget, Sol verò longiùs abest, nec possunt plantæ nutriri superflue, sed sola ijs vitæ sustentatio datur. Vere autem cum Sol vigeat magis, terra autem moderatè calefeat, humescatq; datur quoque, illas copiosè ali posse, & sic germina, ac frondes vndique exsudent, quæ postmodum fructus suos, ac femina simul emittunt, ea copia, quæ naturæ suæ terræq; succositate competit. In quo quoque advertendum, aliud esse totum fructum, aliud semen in eo reconditum: quantumcunq; enim fructus copiosissimi sint, (qui sætibus respondent quodammodo, seu verius ovis), semen tamen pusillum est, & longè minus, ut ideo materiæ prætiositati neque in his copia præiudicet.

Animalia quoque, et si, uti terræ non affixa, loca mutant, prout alimenta suppetunt commodiora, & sanior anni tempestas finit aptè Solis, radijs, & aeris clementia frui: non vsque tamen adeo ea cerebri iuvat imaginatio, quin omnino tùm cæli influentiæ, tùm terræ vel defectui, vel affluentia subiaceant non parùm: quare solum cum talis anni regnat temperies, quæ illorum naturæ congruit, & alimenta quoque suæ complexionì congruentia affluunt, tùm concipiunt, tùm pariunt. Aliàs in Cæli in clementijs latitant, vel alimentis carent, vel non ijs, quæ ad superfluum congerendum commoda sint, potiuntur; Sicq; quædam hyeme (quæ nempe frigido gaudent), quædam Vere, & quædam æstate, vel autumnò generant. Homo autem cæterorum animantium dignissimus, quiq; à Deo relictus in manu consilij sui, omnium creaturarum, & creatorum dominans, non potest quidem se prorsus à cæli influentijs custodire, multos tamen habet se tuendi ab illius terræq; iniurijs modos, suaq; alimenta prudenter eligit, servat, perficit; quolibet anni tempore, dummodo sanus sit, & coire (ac per consequens gignere), & si inavult abstinere assolet; cum non minus in electione hominis concubitus sit, quàm cæteræ omnes actiones voluntariæ. Ut hinc hæresicarum manifestè redarguantur disteria, quibus probare nituntur, hominem fornicando non peccare ex eo, quod opus naturale exerceat: quia, si sic esset, quomodo Adam, vet itum edendo pomum peccasset? patet autem, non magis in hominis electione esse in cibis, quàm in Venere temperantiam, quæ multis quoque modis, & auxilijs propagari, & custodiri potest.

Sed verò quicquid sit, nil impedit, quò minus dicatur, & in plantis, & in animantibus, sicuti, & in homine ipso, semen à congenitis fieri succis etiam si in ijs solo determinato tempore redundet, ac turgeat: quia utcumque sit, nisi succus noviter affluens priùs in congenerum plantæ,

## CAPVT DECIMVMQVARTVM. 285

ac animalis succum degeneret, fructus, fetusq; minimè producentur.

Ex eo igitur opposito argumento nil magis de chyli, quàm de sanguinis concursu ad seminis propagationem concluditur. Sed quid dico? multò magis de sanguine conijcitur: quando ex generationis cuique animanti naturali, ac determinato tempore elucet, generandi principium intrinsicum, ac ingenuum esse, non aduentitium; cum alioqui non minus alijs temporibus edant, quibus nec turget, nec affluit semen.

Generandi,  
principium  
intrinsicum  
non aduenti-  
tium.

## CAPVT DECIMVMQVARTVM.

*Num è sanguine alantur omnia corporis membra, disceptatur,  
& pro affirmatiua arguitur.*

**S**anguinem esse commune omnium partium alimentum, adeo apud omnes Veteres innotuit, vt aliud determinare, vel solum annuere, pro Medica alias hæresi habitum sit: Quamuis etenim nonnulla inter Philosophos, Medicosq; aliquando insurrexerit altercatio ijs solo sanguine, his non eo solo, sed alijs humoribus commixto, corpus totum enutrirî tenentibus: ea tamen verbalis, non essentialis contentio fuit: primi enim sanguinem pro tota massa sanguinea, & prout in venis moratur, sumentes, iussè pro solo sanguine concludebant: Alij verò sanguinem strictè, pro quarto scilicet totius massæ humore ponentes, veridicè quoque negabant, ipsi soli totam deberi nutritionis gratiam; cum clarè affirmare posse crederent, omnes congeneos humores, pro partiu diuersitate, plùs minusuè ad earum nutritionem concurrere. Et verò in priori illo sensu hic sanguis à nobis sumitur, cum dicimus, sanguine omnia membra enutrirî.

Multa autem, eaq; non inualida, argumenta sunt, quæ sanguine cunctas ali partes, ostendunt; sumpta quidem alia ex parte sanguinis alia ex parte ipsarum alendarum partium; Et hic ea annexere volui, ne gratis Antiquis assentiri, ab alijs verò dissentire malè videar.

Et primo illud suadet mira illa venarum, & arteriarum in vniuersas particulas ramificatio, adeo ut etiam in ossa ipsa quælibet aliqua ex ijs (licet inconspicuè) insinuetur, vt optimè ex Gal. & alijs docet locis allegatis Deusingius; vixq; minima cutis particula incidatur sine sanguinis effusione; Quod non esset, si simplici sanguis fotu partes singulæ fuissent afficiendæ; suffecisset enim ad hoc arteriarum diramatio, vel venarum contiguitas.

Ratio prima

Secundò sanguinis tum venosi, tum arteriosi copia, quæ in viuente homine obseruatur, & cuius si dematur quantitas considerabilis, continuò dissoluitur, demacatur, & consumitur corpus; si verò minuatur excessus, florescit idem, ac renutritur; quorum neutrum esset, si ad nutritionem is non concurreret, nec requireretur succus: Id enim, quo præsentè, aliquid sit, & quo absente cessat, causam esse, apud omnes homines

Ratio secunda.

mines

mines in confesso est . Quod si reponat quis, posse esse causam, verum non materiam, sed efficientem, quatenus suo calore fouet, viuificat, & spiritus adducit ; respondetur, frustra duplicem causam requiri, vbi vnica sufficit pro vtraque : si ergo chylus ex se non sufficit, vt partes alantur, cur ad eas concurrat ? & cur sanguini additur chylus, si hic ex se potest sufficere ?

**Ratio sexta.** Tertiò diuturnum ieiunium pleno corpori innoxium, ac facillimum, quod nec esset, si aliunde, quàm à sanguine, corporis alitio, quæ continens est, proueniret : vnde enim refarciretur, quod continuè diffluit, & in auras, ac spiritus abit, nisi superflueret alens succus, qui dissoluti loco succedat ? alioqui, si chylus nutrebat, cessante solita cibatione, cessaret nutritio, & hac cessante, vires labefcerent .

**Ratio quarta.** Quartò ipsius sanguinis moderata temperies, quæ cunctis partibus plus minusuè congruit : nam ipsius qualitates tum in calore, tum in humore temperatæ sunt, & sic faciliè ad omnia potest adaptari ; quod non fieret, si vel frigidior, vel calidior, siccior, aut humidior esset : quia tunc contrarijs partium temperamentis incongrueret, difficiliusq; euinceretur .

**Ratio quinta.** Quintò ipsius substantiæ mediocritas ad omnia faciliùs aptabilis, quam si in aliquo excederet : videtur autem sanguis tum in visciditate, tum in crassitie, tum in densitate, ac illorum contrarijs moderatam seruare qualitatem, quæ ideo vtriusque excessibus proximior est ; vel opposita minus .

**Ratio sexta.** Sextò ipsius quantitatis cum appetitus intensiōe in sanis hominibus conuersio eo modo, quo si quantitas copiosa adsit sanguinis, appetitus modicitas, si illius penuria, huius intensio subsit, indicium, quod inter assumptionem, & alimoniam partium sanguis intercedat, à cibis, ac potibus augendus, vel non, prout competens eius copia renuit, vel deficiente requirit .

**Ratio septima.** Septimò ipsius sanguinei coloris viuacitas, splendorq; , culus intuitus in sine sanguinis effusione occisus, & adhuc magis in actu enutritis, viuētibzq; apparet, quibus nec ossa, nec nerui, nec cutis ipsa ( quamuis alba natura sint, & spermatica ) sic pallida cernuntur, vt in mortuis, & nutritione priuatis . Signum, ea rubro, & splendenti succo enutriti, qui tamē à partium natura euincatur, & ad albedinem toseam reducatur ; ideoq; mortuo homine, & corrupto calore, pallor, & fulgoris languor succrescunt .

**Ratio octaua.** Octauò color, statusq; nutriti corporis similis naturæ, & qualitati sanguinis in eodem redundantis : nam si sanguis naturalis, & laudabilis sit, ac mediocris, color vniuersi corporis, vt nunc dictum est, ex rubedine, & albedine mixtus ; si biliosus, ad flauitiem, si pituitosus ad albedinem ; si melancholicus, ad fuscum, & liuidum vergens cernitur, nec solum quoad cutem, & carnes, sed & quoad pinguedinem, medullam, solidaq; ipsa ( quantum scilicet illorum proprius, & naturalis color patitur )

titur) quod esse non posset, nisi de sanguine eodem nutrentur partes.

Nonò partium enutriendarum dignitas, quæ non imperfecto, sed perfectiori succo indigent, ut dignè refocillentur. Nemo enim ritè dixerit, solidas, ac spermaticas partes non esse digniores carne ipsa, utpotè cum hæc sit potius tamquam pars compaginans, vniens, veltiens, & ab iniurijs extrinsecis muniens, quàm quid aliud; solidæ autem partes sint fons adionum, passionum subiecta, & animalis domicilia vitæ. Si ergo ad carnem alendam; Neotericorum iudicio, sanguis, & probè coctus, requiritur, quomodo ad alenda solida chylus, qui quid imperfectius est, sufficiet? & cur non potius elimator succus, qui semen æmuletur, exposcitur? Gignitur autem huiusmodi ab ipsismet partibus sanguinem vltèrius coquentibus, & in sibi similem, congeneramq; naturam vertentibus.

Vltimò quia ex semine, & sanguine vniuersum corpus, ex sanguine vero semen ipsum constructum est, ut hæcenus ostensum est: Ergo & ex sanguine, ac semine alentur cuncta, si modo eadem generationis, & nutritionis materia est, ut sæpè inculcauimus.

Quæ omnia opposito modo de chylō se habent, & concludunt: Nam circa primum, siuè Pecqueti inuentis lacteis, quæ per ipsum, ad solas subclauias venas, & nonnullas glandulas pertingunt; siuè lymphaticis Bartholini vasculis, quæ truncum non possident, sed per abdomen, & thoracicum tubulum repentiā, in aliquibus solummodò artubus patent, insistendum sit; siuè ad Bilsij toriferos ductulos sit recurrendum, nullibi inueniemus pro chylō viam, quæ in solidas partes omnes, nempe ossa, nervos ligamenta &c. inferatur, & per quam chylus in abdomine deperatus (ut aiunt) possit ad omnia pertingere, ac intimiùs insinuari: Si verò via venarum cum Pallierio eligatur, tunc, vel supponimus, chylum transire in Cavam per hepar, vel non. Si per hepar, iam ille non amplius chylus, sed chymus, siuè sanguis nominatur, seu Antiquis, seu hodiernis stetur Auctoribus, & is ille est, qui vel cum His ad Cor deferretur perficiendus, indeq; per arterias in totum corpus dispergendus; vel cum Ijs per venas omnes ad alendum corpus, sicuti, & ad Cor, ut sæpius dictum est, commigret: Si autem per lacteas, ipsas in Cavam, in subclauias, cæteraq; venas chylus dispergatur, iam ex circulatorum mente per venas omnis earum succus dirigitur ad Cortin sanguinem vertendus; vel ex Platonis traditis à venis ipsis in sanguinem conuertitur; vel saltè ex miscella sanguinis longe vbetioris corrumpitur, & in sanguinem abit non secus, ac pauca aqua copioso mero admixta. Et sic non apparet, quomodo succus is, qui venas peruatit, chylum nomen, vel essenciam retineat; aut quomodo pars sanguis fiat, pars remaneat intacta in iisdem ductibus, & in fontibus ipsis: Nisi forsā autumat Pallierius quicquid chylū siuè hepatis, siuè cordis coctionem subterfugit, chylum esse appellandum, (quem succum pituitam omnes cordati Medici cum Principe Galeno dicerent): sed sic impropiè chylum nomen

nomen assumetur, & confundentur auditorum ingratia. Si autem tandem cum Bakio ad nervos confugiat, plures multò inuenta novitas patietur defectus, de quibus adamussim à Deusingio discribitur in citatis opusculis; siuè ipsorum nervorum spectetur sine cavitate conformatio, saltem visibili, sicquè chyli per ipsos ad cerebrum, & illinc ad vniuersas partes disseminatione impossibilis; siuè eorum attendatur progressus, qui nec ad ossium intima penetrant, nec cum alijs solidis partibus, aut vasculis conspicuas anastomoses possident.

*Chyli quantitas modica, & post aliquot horas quiescens.*

Circa secundum, si de chyli, siuè roris, siuè lymphæ (vt cum Neoterico loquar) agamus copia, in lacteis contenta, clarum est, ex inuentorum ipsorum mente solummodò in benè pastis per aliquot horas pauculam adinueniri; item exillima esse illa vascula, itaut oculos intuentium, etiam acutissimos, plerunque effugiant; & sic minimum illud esse, quod ab his potest deducendo suggeri.

*Per ieiunium chylus deficit, & quid quando solùm repertur in lacteis*

Quinimò (quod pro tertio ponebatur argumento) si per vim, vel mentis deliberationem quis in ieiunio detineatur per duos, vel tres dies, unde chylus ad membra cursitabit? Et tamen nutritio ex plurium mente continua est, & solummodo in excretionem praua, & inutilis interturbata.

*Chyli temperies frigida.*

De chyli autem temperie (quod quartum erat pro sanguine argumentum) quid dicendum, nisi quod, siuè spectetur coquantis ventriculi, intestinorum, ac pancreatis temperamentum; siuè actualis eorum, quæ pro potu, ciboque ordinariè assumuntur, vel virtualis totius in sano corpore assumpti pastus qualitas attendatur; siuè sapor, qui à studiosè durante ventriculi coctione, elicitis ructibus percipitur; siuè substantiæ tenuitas, & aquositas eorum quæ in lacteis reperiuntur; frigidus, & ipse sit, & aquosus? quomodo ergo calidis faciliè adnectetur, ac vnietur partibus? & quomodo frigidas concalefaciat, ac attemperabit? Vtpotè Natura continuè quidem excessui attemperationem exposcit, ac appetit, eo tamen modo, quo alimentum, in principio dissimile, faciliè assimilari, indeq; apponi, & agglutinari possit.

*Chyli in lacteis suppositi substantia tenuis, & aquosa.*

Quoad substantiæ modum, nulli dubium, quin, siuè chylus, siuè ros, siuè lympa sit id, quod in repertis ductibus (ex Auctorum ipsorum dictis) moratur, pertenuè sit, fluxile, & aquosum; vt propterea à Bilsio, Glissonio, & Pallierio ipso ad attemperandum cor, & os irrorandum aptum natum esse, statuatur: huiusmodi autem qualitates ad nutriendum partes crassas, duras, solidas, ac tenaces, nisi per multas intermedias alterationes assimilentur, habiles esse, quis rationabiliter dixerit? quæ præterea alterationes non omnes ab ipsa possunt alenda parte provenire, cui sat est, vt ultimam possit ijs dedere manum; Et ideo Natura commodas, & ordinatas iure instituit coctionum officinas ventriculorum, iecur, venas, cor, ac partes ipsas, vt scilicet pedetentim cibi, potusq; alterentur, & excrementis depositis, in substantiam alendam similem, & eandem conuertantur.

Circa

## CAPVT DECIMVMQVARTVM. 289

Circa sextum argumentum videre est, chylum vel album, vel pallidum omninò esse, & coloris extremi (album enim, & nigrum sola contraria sunt, cæteri verò colores mediam dispositionem nanciscuntur), & potius morientis animalis, excrementorumq; vel affluentiam, vel excernendorum colori analogum: quomodo ergo Aethiopum cutis, & pupilla nigricans ritè nutriuntur ex eo? cum e contra viuacitas, ac igneitas viuentis corporis purpureitatem spirent, vel temperatum ruborem à sanguinis colore manantem præferant, qui facillimè in nitidum quoque nigrorem voluitur, vt in sanguine ipso extracto, & Soli expositio agilis experientia docet.

Nec chyli penuria cum appetitu coincidit, nisi & sanguinis simul penuria subsit: videre enim est, permulta corpora tum sana, tum ægra, quæ, si sanguine nimis abundant, per dies integros, & plures nonnunquam, sine appetitu, & ieiuni consistunt, in quibus tamen chylum affluere, ex anatome, & ratione nec constat, nec datur.

Pro octauo argumento, cui potissimum inhæret Pallierius, qui super albedine partium ossæarum, neruofarumq; chyli colori congenca fundatur egregiè, iam supradictum est, albedinem illam, viuente animali, rubedine quadam effulgere, quæ in mortuis pallida magis cernitur. indicium, non ex omnino albo, sed ex aliquo mixto ali. Item facilius est, partes albas rubro, spiritoso, ac vitali nutriri succo, quàm rubras albo, aquoso, & spiritibus vacuo, prout iam superioribus capitibus ostensum fuit: conueniens autem vniformitati naturæ vniforme quoque alimentum esse, dicetur ad satietatem in sequente capite.

Addatur (quod pro nono, & vltimo argumento contra chylum reppenditur) partes solidas vulgo dici spermaticas, eo quia ex semine (quamuis relictetur ad sanguinis fauorem Aristoteles) potissimum formantur: Sed semen ex sanguine, sicuti, & lac, non autem ex chylò produci, iam supra abundè probatum est: quare rationabile quoque est, non hoc, sed illo easdem ali partes.

Chyli color albus, vel pallidus est, & potius æmulentum, quàm viuentium color affinis.

Eiusdem penuria appetitum non excitat, nisi sanguinis penuria concurret.

Albedo solidarum partium in viuente quadam rubedine fulget.

Partes spermaticæ ex semine hoc, verò ex sanguine generantur.

## CAPVT DECIMVMQVINTVM.

*Contraria Pallierij rationes afferuntur.*

**C**ontigit autem huic, quod & cæteris Artis dogmatibus multis, quorum paulatina mutatio in omnino aduersam tandem degenerauit credulitatem: Cæpit enim Entius (quod sciam) de huiusmodi multa dubitare subiecto. Accessit Glissonius, qui seriosius contra sanguinem pugnavit: cum hoc tamen vt adhuc reliquis id iudicandum relinqueret. Ultra postmodum progressus Charletonus non solum sanguinem à solidarum partium enutritione reiecit, eiq; chylum ad cerebrum, & spinalem medullam per sextum per neruorum ascendentem, ac inde per alios neruos ad vniuersas subiectas partes distributum, subrogauit;



brogauit; sed imò iniurijs, derisionibusq; multis temerè in scriptis suis affecit eos, qui pro Veteribus sentientes, huiusmodi suam non amplecterentur sententiam. Hos tamen Antonius Deusingius in suis Opusculis de Sanguinis vsu, & de nutritij succi commento nouo Groningæ editis anno 1661. mihiq; ab Excellentissimo Hercule Marchello liberaliter commodatis, adeò solidè, & clarè depreffit, vt alia contra eos repastinatione, vel discussione non sit opus. Sed ecce nouissimis his diebus semimortuam illam opinionem aliquid subleuare visus est iam

Pallierij opinio de nutritione fo-  
lidorum partium ex chylo.

suprà nominatus Paulus Franciscus Pallierius in suo libello de vera Latris generi, & vsu: in eo enim probare nititur cap. 14. 19., & 21., chylum, non sanguinem partibus exanguibus, sed solidis dictis verum alimentum elargiri; in hoc solo à supradictis dissentiens, quod ipse non per neruos, sed vel per lacteas, vel per sanguineas venas chylum ad partes deferri statuit.

Is ideo, quibusdam rationibus præmissis, adeo euidentem sibi visus est conclusionem pro suo chylo elicere, vt citra vllum dubium constare, in fine decimiquarti capituli asserat, sanguineis quidem partibus, nempe carni, musculo, cordi, iecori, lieni &c. sanguinem exanguibus verò ossi, neruo, cerebro, venæ, arteriæ, ligamento, cartilagini &c. chylum præstare alimentum. Eas verò examinare, operæ prætium fuerit, quò veritas, obiectis nubibus eliminatis, candidior, lucidiorq; appareat; Et quamuis ipse indistinctè & cumulatè comprobet; nos tamen, vt clariùs ipsis satisfiat, in partes ordinatas suam partiemur comprobationis seriem.

Prima Pallie-  
rij pro chylo  
ratio.

Præmittit ergo, ex primæua diuersarum partium constitutione, earû vario vsu, & diuersa temperie, satis constare, non vnam omnibus esse nutritionis rationem: nam, cum aliæ partes ex sanguine dicantur constitutæ; aliæ verò sint, quæ cum sanguine nullam seruant similitudinem, non videtur consonum, vtrasque eodem sanguine ali, si modò a simili nutritio prouenit. Vfus quoque varius variam structuram, & sic variû etiam nutrimentum expolcit, si verum est, nutrimenta actiones prouehere; & in hoc quantam euariant à carne ossa, ab his nerui, & membrorum reliqua, non est, vt in medium (cum cuique hoc pateat) afferatur. Temperies item diuersa diuersum arguit alimentum, si modò orta suis attestantur principijs: Sed quantum hæ partes ab illis ab ijs differant, dubium apud quemquam non remanet. Quibus sic stantibus, nullus chylo videtur esse pro exanguium partium alitione aptior succus.

Ratio secun-  
da.

Sed & ex partium alimenti superfluo idem statui posse, videtur: nam vbi cum sanguine nullam illud habet similitudinem, quæ nos ratio cogit, vt sanguine illas ali, existimemus?

Ratio tertia.

Amplius si idem omnibus esset alimentum partibus, opus non foret, vt natura sic multiformiter alimenta elaboraret, ac ijs deducendis sic multiplices, & diuersos instrueret ductus; quemadmodum videmus, chy-

## CAPVT DECIMVMQVINTVM. 291

lorehendo chyliferos,lymphæ lymphaticos,sicuti & cruori sanguiferos præfecisse canales.

Nec illa esset partium distinctio, nulla diuersitas, sed una omnium temperies, una conformatio, vnus calor, si modò vnus daretur omnium alimentum: si enim ab vno vnum indicatur, ita & ab vno, quantum in se est, vnus procedit effectus.

Ratum quoque apud omnes est, corporis nostri partes congeneo alimento nutriri: ergo quæ partes sanguineæ sunt, sanguine, quæ spermaticæ alio ipsis symbolo succo enutrirî, statuendum; Et quoniam nullus à sanguine dari potest in corpore humor, qui chylo magè ipsi familiaris & ijs partibus similior sit, hic consequenter solidioribus, ac albis partibus alendis destinandus est.

Videmus insuper in Atrophis, si chyli deductio intercepta sit, quamuis partes sanguineæ abundant, non nutriri, sed chylo destitutas tabescere.

Superfluous etiam illæ circuitus est, vt ex albo rubrum, & deinde iterum album quid fiat, cum possit album persistere.

In eandem sententiam trahitur Hippocrates, qui lib. de carn. num. 13. & de alim. num. 1. alimenti facultatem ad partes peruenire, & partibus congenue apponi alimentum, dictauit; nullibi autem protulit, ad omnia idem alimentum valere; Qui imò aliquando dixit, sicuti variae arbores à terra sibi singulæ similem vel amarum, vel dulcem, vel falsum attrahere succum videntur, ita vnamquaque partem in homine à ventre, qui terræ officio fungitur, quod sibi magis simile est, allicere.

Hæcque potiora illa sunt, quibus innixus Pallierius, suam pro chylosa partium enutritione anno præterito 1663. Genuæ sententiam publicis literis commendauit.

## CAPVT DECIMVMSEXTVM.

*Vnicum succum ad totum corpus alendum, non plures requiri, probatur, & ad rationes supra positas respondetur.*

**V**T autem fundatè possimus ad contrarias hæc rationes, pro chylo allatas, respondere, & nostras fulcire validius, satius fuerit hic annexere huiusmodi propositionem; Naturæ scilicet, ritè omnia gubernantis, prudentiæ congruere magis uniformitatem alimenti communioris, quod possit ritè omnibus adaptari membris, quam cuique membro varium pro naturæ suæ varietate alimentum deberi. Et ea probabitur tum ratione, tum Naturæ consuetudine ab exemplis, & similibus petita. Ratione ergo probatur sic.

Vna est natura totum corpus gubernans, una est facultas nutriens; ergo & vnicum debet esse obiectum. Probatur antecedens; quod, siue

Ratio quæta.

Ratio quinta.

Ratio sexta.

Ratio septima.

Confirmatur Hippocratis auctoritate.

Ratio ab vltima nobiscum petita.

ossa, siuè cartilago, siuè caro, siuè quid aliud in corpore sit, omnia ab vnica natura, seu forma reguntur; aliter dicendum esset, in homine varias formas, varias naturas reperiri. Ea autem non potest nisi vni-formiter agere: nam cuiusque naturæ, seu formæ determinata est actio, & determinata facultas, eo tamen modo, quo diuersarum partium in vnum compaginatio postulat; vt scilicet vnaquæq; sibi assimilet, & inde agglutinet alteratum, & à se euictum alimentum. Consequentia est euident, quod vniuscuiusque facultatis, sicuti vna est actio, ita & vnum debet esse obiectum: quod tamen aptum natura sit, vt facillimè à diuersis euincatur partibus, itaut sicuti facultas vna varias partes regit, ita & vnum eius obiectum varijs quoque adaptetur partium temperaturis: Sed si quædam partes chylo, quædam sanguine nutrentur, non vnicum, sed duplex esset nutritiæ facultatis obiectum. Et hoc probatur; quia chylus vel propria formalitate differt à sanguine, vt Galtrucehius cum plurimis opinatur; vel potius quid imperfectius est ipso sanguine, cum sit in via ad illum, vt alij sentiunt, arbitantes vnam-quanque generalem coctionem procedere ab imperfectiori ad perfectius, vsquequò forma propria introducatur, itaut per Hus sola fiat in primis coctionibus accidentium correctio. Si dicatur ergo, quid imperfectius chylum esse, & in via ad sanguinem, manifestum, quod antequam nutriat, in sanguinem transibit; & sic nulla pars chylo nutritur: Si verò dicamus, formaliter differre, partemq; huius non in sanguinem, sed in nutritium rorem à pancreate, alijs glandibus, & alendis partibus verti, prout & à cæteris mutatur sanguis; idem esset, ac si duo fierent nutritiæ facultatis obiecta varia, nempe sanguis, & ros ille, quod naturæ, vt diximus, vnitati incongruit.

Altera ratio  
ab vnitatis  
compagina-  
tione

Vna etiam est totius hominis, & membrorum omnium compaginatio: siue enim caput, siuè collum, siuè manus siuè pes consideretur, omnia ex ijsdem, & eodem plus minusuè modo constructa sunt, tantummodò figura dissidentia, vel quantitate, aliouè accidente, prout varius omnium vsus, ac finis: Quare prudentissimè Sanctus Iob dicebat Pelle, & carnibus vestisti me, ossibus & nervis compegisti me: cum ad hæc cunctæ compaginantes referantur partes: nimirum venæ arteriæ, fibræ, tendones, ligamenta, membranæ omnes neruareæ naturæ sunt, sicuti, & cartilagineæ, vnguesq; ossæ. Ergo vna, & eadem omnium erit nutritio, ex vno nempe eodemq; succo, qui mixtæ naturæ sit, & cunctis familiaribus partibus facillè assimilabilis, & qui loco deperditi reponatur si modò viuientis corporis eadem est generandi, vt & restaurandi facultas, sicuti & eadem est conseruandi, & acquirendi in Pollicis norma, & conditio; vtpotè cum ambo ijsdem instrumentis, & regulis perficiantur, quamuis die versus finis, & diuersa oculis actio in huiusmodi offeratur non raro.

Tertia ratio  
ab vnitatis  
et ceteris in  
quem tam  
cibus tum  
potus rede-  
gitur.

Natura etiam frustra vniuersum tum cibum, tum potum in vnicum cremorem alteraret, si postmodum in duplicem succum deberet is diui-  
di,

di, ac dimidiari; Sic & frustra per plura fieret, quod per pauciora aequè benè fieri potest: At natura nil frustra facit; & sicuti non deest in necessarijs, ita nec superabundat in superfluis.

Talem quoque Naturæ esse in proposito negotio consuetudinem arguunt nonnulla, quæ ex arboribus sumuntur indicia: Vnicum enim succum vnicuique plantæ à terra suggeri, manifestum est, & deprehenditur a qualitate eius, qui in radicibus inuenitur vniformis; Et eo ali constat etero geneas arboris partes omnes iuxta cuiuslibet earum naturam, corticem nempe, lignum, medullam, frondes, flores, & fructus; Ita ut diuersitas in colore non exigit, nec arguat diuersitatem succi, sed is idem per radices attractus in cuiuslibet earum opportunum alimentum euadit. Et quod magis est, ex eodem per truncum attracto succo varietate quoque plantarum naturæ aptè aluntur, vt cognoscitur in arbore supra truncum insita, vel etiam varijs in ramis fructuum varietate fecundata: Hanc enim certum est, eodem, quo priùs, succo imbui; & tamen fructus, frondes, ac flores diuersos progignit: Singulum ergo, à varietate coloris, ac naturæ partium non argui varietatem succi ad eas alendas requisiti, sed sufficere, vt is in suis qualitatibus non sit omninò dissimilis; quia sic ab earum singula in sui naturam faciliè vertitur. Ita etiam diuersitas coloris partium vniuscuiusque plantæ non arguit diuersitatem naturæ, vel temperamenti, nisi secundum aliquid accidentium magis vel minus intensum, prout substantiæ modus in duritie, soliditate, & his contrarijs requirit, & magis, vel minus efficaciter operatur: Quare videmus, in quolibet planta, vel arbore eiusdem qualitatis in sapore odore, & virtute alterandi esse radices, frondes, germina, flores, thyrsus, ramos &c., vt quotidie in medicinalibus parandis experimur: itaque nec mirum, si eodem succo aluntur omnia sicuti autem se habet aliturus succus ad plantam, & eius partes, ita & ad hominem alimentum: Est enim homo planta quædam animata, sola animæ, ac rationalis formæ speciei à germinantibus dissidens plantis, vegetatiua verò potentia similis, ac vniformis: Quare, & in homine vnicus succus pro variarum partium, siuè albarum, siuè rubrarum, siuè nigrarum alitione sufficiet, & eò magis, quò excellentiùs vnaqueque superior natura (vt humana est respectu arboreæ) sua inferiori operatur.

Item, sicuti se habet naturalis facultas in vna parte, ita se habet in alia: Sed in ventriculo omnia siuè rubra, siuè alba, siuè viridia &c. in colorem vnicum, & illi similem alterantur, nec habetur respectus, quod albo ventriculo alba sola competant, nec iccori sola rubra: Ergo sic in alijs partibus non à colore partis arguitur alimentum debiti color, sed qualiscunque sit eius, quod ad eam pro alendo peruenit, in illius similitudinem alteratur, & transit. Probatur autem antecedens; quia omnia naturalia semper eodem instinctu insito, & vniformiter operantur, & adhuc magis in vno, & eodem subiecto.

Probatur  
alentis succi  
vniformitas  
à plantarum  
constitutione  
huiusmodi.

Probatur  
etiam ex em-  
plo costio-  
num ventri-  
culi, & icco-  
ris.

tertium  
exemplum  
ab Aethiope  
petitum.

Insuper, si ex diuersitate coloris partium diuersa quoque alentis succi qualitas exposceretur, in Aethiope non duplex, sed triplex requireretur succus: albus scilicet pro ossibus, & nervaceis partibus, ruber pro carne, & parenchymatibus viscerum, niger autem pro cute. Videmus tamen in eo nullum alium vel atrum, vel nigrum succum, præter illum album lactearum, & rubrum sanguinem, qui in cæteris omnibus hominibus conspiciuntur, per peculiare ductus, ac seundim in cutem irruere. Et sic constat, ac satis probatum est, non requiri diuersitatem succi alimentosi pro variarum hominis partium enutritione, sed vnicum pro omnibus satis esse.

Respondetur  
ad primam  
pro  
chyloratio-  
nem.

His itaque positis additamentis, sat videntur rationes pro sanguine productæ emicare, itaut ad rationes Pallierij pro chyloratio in præcedenti allatas nunc respondere tempus sit. Ad primam ergo, à diuersitate partium constitutionis petitam dicitur, diuersitatem illam solum in qualitatibus non in formalitate substantiæ, obseruari: ideo, si cuti ab vno semide sanguinis adiumento, omnia corporis membra, quàmuis aspectu varia, formantur, ita & vno alimento, è sanguine emanante, eadem omnia nutrirì, quid mirum? Nil naturæ inconuenit, ab vnica re plures elici rerum species. Imò hæc illius summa prudentia est, qui è limo terræ hominem formauit, & ab humo animalia, & germinantia cuncta produxit; qui semini vim genito simile procreandi insinauit sine scrupulo, aut dubio, quin ex eodem, & ossa, & nerui, & venæ, & arteriæ, & pancreata, & cuncta, quæ in corpore organizant, generentur; cui nec impossibile fuit efficerè, vt eodem cibo, (si velit quis) alatur homo, carnis, equus, bos, gallina, veruex &c., quæ tantopere inter se non aspectu, magnitudine, & temperamento solum, sed & forma, sed natura differunt tantopere: Minus ergo mirandum, eodem succo, nempe sanguine, omnes partes, solis qualitarum gradibus dissidentes, enutrirì, cum præcipue in illo varij à natura commixti succi alligentur, sanguis nimirum stricte sumptus, pituita, & vtraque bilis. Quin, & eundem succum varijs plantarum generibus (vt inferiorum exemplo probauimus) pro alimento inferuire constat: quidni ergo vnus etiam succus varijs eiusdem corporis membris, ab eadem forma rectis, satis erit?

Nec varia partium temperies huic officit positioni: ea siquidem non in alimenti ipsius diuersitatem, sed in aliti naturam referenda est: nam, vt alimentum aliat, alitiq; naturam induat, ab eodem debet euinci, ac immutari; & sic eodem alimento tum calidæ, tum frigidæ naturæ (dummodo substantiæ similitudine polleant) commodè aluntur. Nonnè ex eodem floris succo formant varia animantia mel, & venenum? Eodem prorsus terræ succo, si contigua ex semine nascantur, fruuntur laqueæ, & petroselinum; allium & acetosa, ruta, & portulaca, quæ contrarijs inter se temperamentis gaudent: Neque enim à diuersitate attracti succi diuersitas simplicium, sed à simplicium diuersitate succi diuersitas generatur. Et sic videmus, eundem panem, eandem escam in  
homine

homine bilioso. biliosum sanguinem, in pituitoso pituitosum generare, nonnegata laterim aliqua alimenti aliti-temperiem aliquatenus immutandi virtute. Nisi dicamus, omnia mixta in se quoque mixta temperamenta continere, & sic ab vno eodemq; succo tum calidum, tum frigidum quid elici posse; cui sententiæ, vt Hippocraticæ, non reluctamus: sed, hoc dato, non infringitur vis rationis nostræ, imò ampliatur, confirmaturq; ex sanguine posse varias partes varios elicere succos, cum ipse sit ex quatuor elementis, imò & ex quatuor humoribus compositus, itaut in se calidum, frigidum, humidum, & siccum optime contineat.

Ad alteram rationem, ab alimenti superfluo deductam, facilis responsio est, dicendo, diuersam esse naturam eiusdæ alimenti ab adhuc euincendo: vnde sicuti ob chyli albedinem non possumus vini rubri, panis atrii, & viridis herbæ mansæ negare, vel albi lactis asserere assumptionem; ita nec à superflui lactis, seminis, cambij, vel roris pallore rite possumus rubri sanguinis pernegare, nec chyli immediatum arguere accessum.

Respondetur ad secundam per chyli rationem

Ad tertiam, à diuersitate ductuum, ac elaborationum multiplicitate deductam, dicimus, alios ductus ad alimenti delationem, alios ad spirituum, vel vitalium, vel animalium, pro vita manutenenda, exercendamque deportationem, & alios ad excrementorum seiuñctionem, excretionemque optimè à Natura in humano plasmate institutos fuisse: Vnde ab illorum multiplicitate non quidem alimenti deferendi, sed vsuum vtilem multipliciter argui. Sic etiam multas fieri alimentorum elaborationes, & eas quidem necessariò ad hoc, vt res insensibilis, inanimatumq; corpus assumptum transeat in viuientis corporis substantiam, nõ benè arguit diuersitatem specierum alimenti adhuc euincendi.

Respondetur ad tertiam

Ad quartam de partium distinctione iam satisfactum, cum diximus, optimè & prudentissimè ex eadem re varias partes, & progigni, & alii, vt varijs quoque ad vitam necessarijs vsibus inferuire; sicuti è terræ vel aquæ limine cuncta formauit Deus animalia, & ex iisdem, earumque succis eadem cuncta gubernat.

Respondetur ad quartam

Ad quintam de succo congenito aptè dicitur, multò magis partibus viuentibus congenium esse alimentum, quod è chylo in sanguinem verso, ac arterioso sanguine, spirituq; per arteriatum anastomoses vndique perfluere desumitur, quàm quod è succo in venulis omnium excrementorum ductui propinquis, & communibus incluso possit expectari: quippe cum ille sit, ex quo semen emanauit, e quo embriotraxit originem, e quo ros, cambium, gluten, omnibus proficua, constat: hic verò rudis adhuc sit materia, & ni sanguinis formam, excrementis sepositis, adipiscatur, ad nutritionem inutilis.

Respondetur ad quintam

Ad sextam de fame pereuntibus nonnè clara ratio est, tabescere corpus, non ex defectu chyli immediatè, sed ex sanguinis ob illius penuriam adustione, crassitie, & terreitate? Nisi enim sanguis determina-

Respondetur ad sextam



tis vicibus inflaretur, dissoluitur, vitur, crassescit, spiritibus orbatur, itaut non solum non sufficiat pro omnibus partibus, sed & ineptius tum nutritioni, tum vitalitati reddatur. Videmus autem, pro horum confirmatione, corpus plethoricum diutius fami, & chyli defectui superesse. Alioqui, si illa valeret ratio, ritè quoque diceremus, corporis partes nonnullas immediate ali pane, vino &c., eo quia, nisi quis cibetur, breuibz interit diebz.

Respondetur ad septimum.

Ad importunum circuitum idem, quod supra de lacte, reponimus; gaudere scilicet hisce circuitibus Naturam, & ab his cunctas generationes, & illius mirandas pulchritudines, quæ varietatibus gaudent, provenire; quæ minimum de accidentibus curat, dummodò substantia perficiatur: videmus propterea, sumptum in ventriculo vinum rubicundum albescere, cum tamen successivè in iecinore rubescere iterum debeat, & ad cerebrum, mammaeq; delatum rursus candicare cogatur.

Hippocratis conciliatio.

Ad Hippocratem dicimus, imò ipsius sententiam esse, cuncta nutrire eo succo, qui per venas excurrit e quatuor humoribus conflatus, sicuti, at ossa ipsa; præcipuè autem *cit. lib. de carn. num. 13.* ibi enim hæc habet: Dictum autem à me prius est, quod solæ ex ossibus maxillæ ipsæ, in seipsis venas habent, & ob id alimentum amplius in ipsas, quàm in alia ossa trahitur. Sic etiam *num. 12.* dixerat, In maxilla venæ sunt, & hæ huic ossi soli inter omnia ossa, ex inferno ventre alimentum præbent. Vbi etiam, venas e ventre tenuissimum trahere, asseruit. Ipsum autem non alias agnovisse venas, quàm, quarum radicatio iecur est, vel arterias, quarum radicatio in Corde, manifestè dixit *lib. de alim. num. 7.* Vbi per eas sanguinem, ac spiritum in totum corpus migrare, dixit. Quemadmodum & *lib. de off. nat. num. 13.* alimentum in corpus à ventre distribui per venas edocuit. Qui, si aliquando asseveravit, alimentum partibus congenue debere, nullibi tamen aperuit, id de chylo edixisse, sed benè vnamquamque partium ad se allicere per venas, quod sibi magis simile est; prout & in responsione ad primum argumentum dictum fuit.

### CAPVT DECIMVM SEPTIMVM.

*Non malè, imò rectius per vetera, quàm per nova dogmata multa enucleantur arcana Natura.*

**R**eliquum nunc est, ut quædam, quæ corollarij vice sunt, hic addantur: Neque enim in adhucque disputatis consistit ob dicta inventa vasa tum lactea, tum lymphatica confictarum ab his Auctoribus positionum numerus: sed quasi solaris hinc lux Medico ruluxerit Orbi, præter hucusque agitatæ disceptationes, multa, quæ alijs difficillima cognitu videbantur, facile harum adinventionum medio nunc cognosci, eorumq; causam tradi posse, ostendunt: quotum tamen non minus, imò

imò magis erat facile verisimiles assignare causas iuxta vetera dogmata, quàm iuxta eorum noua. Age, experiamur.

Dicunt ergo, mediantibus his nouis ductibus, sciri, quomodo tam citò ex cibo, vinoq; ac alijs cordialibus assumptis, refocillentur vires; cur ex immodico cibo, vel potu pulsuum inæqualitates, ex cruditateq; synopes obueniant; qua de causa tam citò corriuentur ad lotium nimij potus, itaut res edibitæ eadem, qua antea, qualitate imbutæ, meiantur; quomodo ad mammas, ac ad vrinam pili epti, aut alia, quæ historiæ referunt, aliquando per ipsas exiisse, deducantur: Omnia enim hæc, & alia inferiùs afferenda, inquirunt, per lacteas inuentas venas faciliè posse conspici, dignosci, & enucleari.

Ego verò non minus, imò veriùs, & faciliùs per Antiquorum dogmata eadem dubia posse dissolui, contendo: Etenim, dum scire volumus, quomodo ex assumptione cibi, ac potissimum vini, & cordialium statim refocillentur vires fatiscences, considerare debemus, quod vel vires patiebantur ex sola spirituuum subita dissolutione, vel ex defectu solidioris, ac adæquatj alimenti; illud quidem in breui inedia, ventriculi mordicatione, aut aliquo tùm animi, tùm corporis inopinato tristi sensu; hoc verò ob magnas sequutas vacuationes, alimenti longam subtractionem, vel prauitatem, nimios labores, & importunas ægritudines. Ad primum defectum sola spirituuum instaurantia, lenientia, vel tristitiam soluentia sunt satis, & ideo breuissima via id consequi non raro licet. Ad secundum verò, cum continentium, contentorum, & impetum facientium refocillationes requirantur, non sic citò, nec sic subitò datur instauratio. Ad primum ergo sine his nouiter inuentis vijs aptissimè, ac citissimè posse per os assumptis ferri subsidium, hæc consideranti patebit; quod scilicet spiritus instaurant, quæ spirituosa sunt, & halituum instar ad Cor, cerebrumquè, in quibus vitales, animalesq; spiritus fabrefiunt, ascendere quàm celerrimè valent. Huic autem halitui via præbetur latissima per gulam recta ad fauces, & ab his per manifestos meatus ad cerebrum pergit; Ad Cor verò per eandem viam, quæ Aortæ, & Cauæ contigua per varias inconspicuas arteriarum, & venularum anastomoses cordi facillimè communicat, & meliùs lacteis venulis, quæ retrò ad tubum thoracicum propè spinam abeunt, in axillares venas insinuantur, sicq; longius, & minus cordi communicans iter ostendunt. Tollitur autem dissolutio, si ex ore ventriculi patiente, & mordicato oriatur, immediato tùm cibo, tùm potu assumptis, qui & morsum temperent, & ventriculo voluptatem suis instaurantibus, & lenientibus qualitatibus inducant, & acres eluent succos: Si verò in animo tristitia subsit, fugatur halitibus tùm vini, quod cor exhilarare, etiam sacre literæ testantur, tùm cordialium, quæ sympathica spiritali symetria operantur, quibus supradictus patet aditus. Quæ autem viget in corpore, anodinis vel intus, vel extra adhibitis lenitur. Neque mirum, sic citò in talibus refici vires assumptis, cum & per simplicem odoratum alen-

Vires vel est spirituum. vel ex alimenti defectu patiuntur.

Cur ad spirituum defectum citissimè per os assumptis succurrant.

tium, & olentium hoc fieri, tradat Hippocrates *lib. de alim. num. 11.*, & in dies experiamur in lypothimijs, per vini, ac aceti olfactum profigandis.

*Altera viri  
imbecillitas  
citius per vi-  
as veteres,  
quàm per  
novas emen-  
datur.*

Ad alteram verò virium imbecillitatem requiritur ipsius alimenti non sola assumptio, sed & concoctio, ad cor, & totum corpus deductio, cuiusquæ congrua agglutinatio, quæ citra temporis intercapedinem promoueri non possunt: Sed citius quidem, & per breviorē viam deductio ad hepar, Cor, & totum corpus fiet per oscula venarum, quæ à Portæ ramulis in ventriculum, vel intestina inhiant, quàm sic ponamus, chylum in intestina primò, deinde in glandulas, & Receptaculum, inde in lacteas thoracicas, post in axillares venas abire, & exinde ad Cor circulantis sanguinis ope coquendus retrogrediatur, ac indidem ad hepar colandus incedat: Siquidem, si viam metiamur, longior, & minus communicabilis hæc longè erit, quàm illa: Agglutinatio autem, & securius & citius quidem fiet è probè cocto, ac laudabili sanguine, quàm ex imbecillo, seroso, frigidoq; chylò, & abundanter in antecedentibus probatum extat. Adde, quod, sicut tristanti, famescentiq; æsophago totum corpus compatitur, viresq; eneruantur, ita ipsi epulanti, ac in lactis epulis voluptuanti omnia congaudent, atque asurgunt membra; voluptuatur autem appetens ventriculus moderato tùm opus, tùm potus assumpto. Ergo quouis modo vires instaurare sit opus, citius, ac melius per veteres, quàm per nouiter inuentas vias assequemur.

*Cur cibo nimio assumpto, pulsus inæqualis fiat, & aliquando syncope, aliquando mors inopinata succedat, quàm inueterata Artis documenta facerent: quandoquidem promptius de hoc reddere rationem imò via antiqua datur, quàm nouissima: Neque enim ad hoc casus quicquam chyli ad lacteas ductio facit; cum non statim assumpto cibo, chylus infumatur in ipsas; sed vel post descensum ad intestina, vel si per æsophagi lacteum ramulum (quamuis nec hic à Bartholino potius lacteus, quam lymphaticus autumetur), non ante coctionem ventriculi saltem imperfectam: Dato autem, quod infumeretur statim, non eo furore, copiaq; insumi posset, quæ valeret Cor obruere, tùm quia dictus ramulus vix visibilis, tùm quia in thoracicum tubulum, à Corde seiunctum, abijt, tum quia impelleretur in ipsum solum id, quod possit recipi, aut attrahet ipse tantundem; à quo cum paululum sit, & in tubulis à Corde non manantibus, nil timendum. Iam verò dictum est, patientiorem esse viam ab Antiquis monstratam, quàm quæ nouiter indicata est, siuè à stomaco, siuè ab æsophago, siuè ab intestinis ponatur chylus irruere.*

*Dictorum  
symptomata  
& necis ve-  
tiores causæ.*

Nec lucidiùs noua hæc inuentio nos in cognitionem ducet, quomodo, & cur, cibo nimio assumpto, pulsus inæqualis fiat, & aliquando syncope, aliquando mors inopinata succedat, quàm inueterata Artis documenta facerent: quandoquidem promptius de hoc reddere rationem imò via antiqua datur, quàm nouissima: Neque enim ad hoc casus quicquam chyli ad lacteas ductio facit; cum non statim assumpto cibo, chylus infumatur in ipsas; sed vel post descensum ad intestina, vel si per æsophagi lacteum ramulum (quamuis nec hic à Bartholino potius lacteus, quam lymphaticus autumetur), non ante coctionem ventriculi saltem imperfectam: Dato autem, quod infumeretur statim, non eo furore, copiaq; insumi posset, quæ valeret Cor obruere, tùm quia dictus ramulus vix visibilis, tùm quia in thoracicum tubulum, à Corde seiunctum, abijt, tum quia impelleretur in ipsum solum id, quod possit recipi, aut attrahet ipse tantundem; à quo cum paululum sit, & in tubulis à Corde non manantibus, nil timendum. Iam verò dictum est, patientiorem esse viam ab Antiquis monstratam, quàm quæ nouiter indicata est, siuè à stomaco, siuè ab æsophago, siuè ab intestinis ponatur chylus irruere.

Atuerò ad hanc causam reducenda non est dictorum symptomatum, siuè necis aggressio, sed bene ad ventriculi tensionem nimiam, quæ, septum dilatari, prohibet, & Aortam premit; præterquàm quod si in gulam, vel statuum copia eleuetur, vel cibi nimietas regurgitet, potest & asperam

# CAPVT DECIMVMSEPTIMVM. 299

Asperam arteriam comprimere, & pulmones constringere, & Cor per meatus tūm patentes, tūm inuisibiles obruere, & offuscare. Adde etiā, à nimia copia, vel frigidiori assumptorum, calorem ventriculi natiuum vel suffocari, vel etiam extinguī posse: Vbi verò in vna parte extinguitur, statim omnes alias in consensum trahi, si inter celebres illa sit, & Cordi propinqua, vt est ventriculus. Nec inter causas huiusmodi infimum locum tenet oris ventriculi summa sensibilitas, propter quam sicuti in cruditatibus, quæ ipsum asilignant, lypothimias enasci, & aliquando mortem ex maximo consensu cum Corde, ac cerebro per arterias, ac nervos, conspiciamus, ita & in ingurgitationum copia similia aduenire, non est mirandum.

Et quamvis quis semel scripserit, in mortuo Viro circa cor inuentum esse concretum sanguinem multum, non ideo dicendum est, id euenisse ob crassitudinem inductam sanguini ex carentia subtilioris chyli ob lactearum obstructionem enata: sed imò vel ob frigiditatem ab inuincibili succo inductam, vt de argento viuo largius assumpto testatur *Matthiol. in 6. lib. Dioscorid. cap. 28.*, vel ob torrefactionem ab animi ingenti calore, seu inedia longa, productam hoc euenisse, dicendum est.

Cur in mortuo inuentus sit circum Cor concretus sanguis.

Neque minus imbecilla est assertio, ex lactearum inuentione patere viam, qua sic citò ab ingurgitato nimio potu per vrinam exbrigentur bibacissimi potatores, & qui diabete laborant, si causam dederimus sufficientem, absque quod ad nouas has vias recurramus. Abnuī Bartholinus, cui ferè impossibile videtur, dictum potum sic festinanter per aliam viam pertransire, quia deberet, vt ait ipse, per hepar, cor, & arterias emulgentes, ad renes deferri, quod nec sic citò, nec sic inalteratè, vt videmus quandoque fieri posset: Sed mirari desinat: nam famosi hi potatores, & qui diabetici sunt, iecore, ac renibus calidissimi sunt, itaut pro sui refrigerio non solum potum attrahant, sed & velocissimè furent; ac rapiant; iecur quidem per venas stomacho insinuat, ac introhiantes; renes verò tūm per venas emulgentes à Caua, & iecore, tūm ab intestinis ipsis, & mesenterio contiguīs, per alios cæcos ductus, & per continuitatem substantiæ, per quam quælibet pars ab altera vicina, & attrahit, & acceptat humores: nulle enim nexibus partes partibus contiguīs, venæ venis, arteriæ arterijs conspirant, & annectuntur vbi que. Neque opus est pro mistu, vt serum totum ad Cor perueniat; sed iecur cum sanguine prætergressum, facillimè per emulgentes venas ad renes diducitur, & sic non longior hæc via est, quàm alia, quæ supponit, potum à ventriculo ad intestina descendere, ab his in lacteas, à lacteis in Receptaculum, & hinc ad renes. Sed præterea hi illi forsan meatuli sunt, quos inuisibiles Antiqui nuncupabant.

Cur & quomodo diabetici & bibacissimi sic citò potum mingant.

Quod autem à iecoris gibba citra cordis iter possit, ac soleat serofitas per Cauam, & emulgentes venas ad renes deuenire, nouum non est, sed vtitatissimum, ac vetustissimum; & hæc causa est, cur, gibba iecoris affecta, Galenus, cum cæteris Practicantibus laudet in declinatione

tium, & olentium hoc fieri, tradat Hippocrates *lib. de alim. num. 11.*, & in dies experiamur in lypothimijs, per vini, ac aceti olfactum profrigidandis.

*Altera viis imbecillitas citius per vias veteres, quam per novas emendatur.*

Ad alteram verò virium imbecillitatem requiritur ipsius alimenti non sola assumptio, sed & concoctio, ad cor, & totum corpus deductio, eiusque congrua agglutinatio, quæ citra temporis intercapedinem promoveri non possunt: Sed citius quidem, & per breviorē viam deductio ad hepar, Cor, & totum corpus fiet per oscula venarum, quæ à Portæ ramulis in ventriculum, vel intestina inhiant, quàm sic ponamus, chylum in intestina primò, deinde in glandulas, & Receptaculum, inde in lacteas thoracicas, post in axillares venas abire, ut exinde ad Cor circulantis sanguinis ope coquendus retrogrediatur, ac indidem ad hepar colandus incedat: Siquidem, si viam metiamur, longior, & minus communicabilis hæc longè erit, quàm illa: Agglutinatio autem, & securius & citius quidem fiet è probè cocto, ac laudabili sanguine, quàm ex imbecillo, seroso, frigidoque chylo, ut abundanter in antecedentibus probatum extat. Adde, quod, sicut tristanti, famescenti, æsophago totum corpus compatitur, viresque enervantur, ita ipsi epulanti, ac in lætis epulis voluptuanti omnia congaudent, atque assurgunt membra: voluptuatur autem appetens ventriculus moderato tùm cibo, tùm potu assumpto. Ergo quovis modo vires instaurare sit opus, citius, ac melius per veteres, quàm per noviter inventas vias assequemur.

*Cur cibo nimio assumpto, pulsus inæqualis fiat, & aliquando syncopes, aliquando mors inopinata succedat, quàm inueterata Artis documenta facerent: quandoquidem promptius de hoc reddere rationem imò via antiqua datur, quàm novissima: Neque enim ad hosce casus quicquam chyli ad lacteas traductio facit; cum non statim, assumpto cibo, chylus insumatur in ipsas; sed vel post descensum ad intestina, vel si per æsophagi lacteum ramulum (quamvis nec hic à Bartholino potius lacteus, quàm lymphaticus autumetur), non ante coctionem ventriculi saltem imperfectam: Dato autem, quod infunderetur statim, non eo furore, copiaque infusi posset, quæ valeret Cor obruere, tùm quia dictus ramulus vix visibilis, tùm quia in thoracicum tubulum, à Corde seiunctum, ab it, tùm quia impelleretur in ipsum solum id, quod possit recipi, aut attrahet ipse tantundem; à quo cum paululum sit, & in tubulis à Corde non manantibus, nil timendum. Iam verò dictum est, patientiorem esse viam ab Antiquis monstratam, quàm quæ noviter indicata est, siuè à stomacho, siuè ab æsophago, siuè ab intestinis ponatur chylus irruere.*

*Ad ea non facit chyli in lacteas traductio.*

Nec lucidiùs novæ hæc inventio nos in cognitionem ducet, quomodo, & cur, cibo nimio assumpto, pulsus inæqualis fiat, & aliquando syncopes, aliquando mors inopinata succedat, quàm inueterata Artis documenta facerent: quandoquidem promptius de hoc reddere rationem imò via antiqua datur, quàm novissima: Neque enim ad hosce casus quicquam chyli ad lacteas traductio facit; cum non statim, assumpto cibo, chylus insumatur in ipsas; sed vel post descensum ad intestina, vel si per æsophagi lacteum ramulum (quamvis nec hic à Bartholino potius lacteus, quàm lymphaticus autumetur), non ante coctionem ventriculi saltem imperfectam: Dato autem, quod infunderetur statim, non eo furore, copiaque infusi posset, quæ valeret Cor obruere, tùm quia dictus ramulus vix visibilis, tùm quia in thoracicum tubulum, à Corde seiunctum, ab it, tùm quia impelleretur in ipsum solum id, quod possit recipi, aut attrahet ipse tantundem; à quo cum paululum sit, & in tubulis à Corde non manantibus, nil timendum. Iam verò dictum est, patientiorem esse viam ab Antiquis monstratam, quàm quæ noviter indicata est, siuè à stomacho, siuè ab æsophago, siuè ab intestinis ponatur chylus irruere.

*Dictorum symptomatum & necis vehementiores cause.*

Atuero ad hanc causam reducenda non est dictorum symptomatum, siuè necis aggressio, sed benè ad ventriculi tensionem nimiam, quæ, septum dilatari, prohibet, & Aortam premit; præterquàm quod si in gulam, vel flatuum copia cleuetur, vel cibi nimietas regurgitet, potest & asperam

asperam arteriam comprimere, & pulmones constringere, & Cor per meatus tūm patentes, tūm inuisibiles obruere, & offuscare. Adde etiā, à nimia copia, vel frigidiore assumptorum, calorem ventriculi natium vel suffocari, vel etiam extinguī posse: ubi verò in vna parte extinguitur, statim omnes alias in consensum trahi, si inter celebres illa sit, & Cordi propinqua, vt est ventriculus. Nec inter causas huiusmodi infimum locum tenet oris ventriculi summa sensibilitas, propter quam sicuti in cruditatibus, quæ ipsum affligunt, lypothimias enasci, & aliquando mortem ex maximo consensu cum Corde, ac cerebro per arterias, ac nervos, conspiciamus, ita & in ingurgitarum copia similia aduenire, non est mirandum.

Et quāvis quis semel scripserit, in mortuo Viro circa cor inuentum esse concretum sanguinem multum, non ideo dicendum est, id euenisse ob crassitudinem inductam sanguini ex carentia subtilioris chyli ob lactearum obstructionem enata: sed imò vel ob frigiditatem ab inuincibili succo inductam, vt de argento viuo largius assumpto testatur *Marthiol. in 6. lib. Dioscorid. cap. 28.*, vel ob torrefactionem ab animi ingenti calore, seu inedia longa, productam hoc euenisse, dicendum est.

Neque minus imbecilla est assertio, ex lactearum inuentione patere viam, qua sic citò ab ingurgitato nimio potu per vrinam exbrigentur bibacissimi potatores, & qui diabete laborant, si causam dederimus sufficientem, absque quod ad nouas has vias recurramus. Abnuī Bartholinus, cui ferè impossibile videtur, dictum potum sic festinanter per aliam viam pertransire, quia deberet, vt ait ipse, per hepar, cor, & arterias emulgentes, ad renes deferri, quod nec sic citò, nec sic inalteratè, vt videmus quandoque fieri posset: Sed mirari desinat: nam famosi hi potatores, & qui diabetici sunt, iecore, ac renibus calidissimi sunt, itaut pro sui refrigerio non solum potum attrahant, sed & velocissimè furentur, ac rapiant; iecur quidem per venas stomacho insinuat, ac intrò hiantes; renes verò tūm per venas emulgentes à Caua, & iecore, tūm ab intestinis ipsis, & mesenterio contiguīs, per alios cæcos ductus, & per continuitatem substantiæ, per quam qualibet pars ab altera vicina, & attrahit, & acceptat humores: nulle enim nexibus partes partibus contiguīs, venæ venis, arteriæ arterijs conspirant, & annectuntur vbiq̃ue. Neque opus est pro mītu, vt serum totum ad Cor perueniat; sed iecur cum sanguine prætergressum, facillimè per emulgentes venas ad renes diducitur, & sic non longior hæc via est, quàm alia, quæ supponit, potum à ventriculo ad intestina descendere, ab his in lacteas, à lacteis in Receptaculum, & hinc ad renes. Sed præterea hi illi forsan meatuli sunt, quos inuisibiles Antiqui nuncupabant.

Quod autem à iecoris gibba citra cordis iter possit, ac soleat serofitas per Cauam, & emulgentes venas ad renes deuenire, nouum non est, sed vñtissimum, ac vetustissimum; & hæc causa est, cur, gibba iecoris affecta, Galenus, cum cæteris Practicantibus laudet in declinatione

Cur in mortuo inuentus sit circa Cor concretus sanguis.

Cur & quomodo diabetici & bibacissimi sic citò potate mingant.



phlegmones diuretica, sicuti, Caua parte læsa, per aluum purgantia; Huncq; venarum emulgentium esse vsum, hancq; renum propriam actionem attracticem, itaut facillimè serum à Caua in ijs eximijs portatoribus separent, idem tradit *Gal. lib. 4. de vsu part. cap. 13.* Et propterea ren dexter sinistro sublimior, & in plurimis iecur contingens, à natura constitutus est, vt idem testatur *lib. 5. de vsu part. cap. 5.* quicquid è contra doceant cum eodem Bartholino ceteri Circulationis amatores, omnia vetera nauseantes, ac inuertes, qui putant, emulgentes venas, pro referendo ad Cor renum sanguine inferuire: quorum tamen ratio in fallacissimis experimentis consistit: quid enim referent, si quicquid ab arterijs deportatur (si vera sint Circulantium supposita) pro ipsis alendis renibus, & pro sanguine à sero depurando per veteres, vix sufficit? quomodo infusetur in venas, si in vrinarios meatus sese exonerant? Apage ergo has nouitates, & renum tractioni stetur cum Veteribus; tùm si quæ lacteæ, vel lymphaticæ huc pertingant, sint vel venarum ipsarum propaggines, vel ex cæcis ductibus, vbique apud ipsos admissis.

Nec melius soluet Bartholinus suis his venis albis eos per mammarum papillas, & per vesicam exitus pilorum, surculorum, acuum, muscarum, & aliorum, qui in mirandis Auctorum historijs canuntur, quàm facerent veteres hucusque alij Doctores: nam, si conferantur viæ hæ nouæ cum veteribus, ex cuiusmet ore intelligemus, non minus, imò multò magis exiles, & inconspicuas esse lacteas venas, quæ in glandulas lumbares, & ab his in renes, quàm quæ è meseraicis in iecur, & ab eo in emulgentes sanguiferæ feruntur. Sed quod omnem tollit lapidem, illud est, quod sæpè multa miranda canuntur, quæ non esse credenda, duxerim; cuius generis esse, puto, quæ ex varijs Auctorebus narrantur per miætum aliquando exiisse, vt sunt radices apij, muscæ, fungi, anisi &c.: facilis enim potest in similibus fieri cernenti Medico impostura, vel à casu, vel à scurris; in matulam scilicet ante miætum, vel post similia proijciendo, vt Medicum ad diuinationem causæ perducant, & irriptionem; quæ postmodum a corde leuibus credita, scriptis pro mirabilibus mandantur.

De pilis quoque per vrinam excretis in magna copia, quomodo putare quis potest, huiusmodi per potum, vel cibum ab homine esse assumpta? Si vnicus pilus esset, credi posset, per inaduertentiam deglutiri; Sed de multis, ridiculum est hoc putare: quare statuendum est de huiusmodi pilorum quantitate, si excreantur, vel non esse veros pilos, sed quamdam eorum similitudinem æmulari, ab humoribusq; adultis, vt Auctores fideliter tradunt, gigni; vel ex aliquo supernaturali affectu, nimirum maleficio, prouenire, sicuti nonnunquam, & clauos, & pilos, & alia per vomitum excerni, ab Exorcizantibus fertur.

Similis ex parte habenda sententia est de ijs, quæ per mammæ excerni quandoque, literis aliqui tradidere: Etenim vel credulo Medico talia è mammis

Auctoris opinio citra, ea, quæ in vrinis reſide-  
re nonnulli  
descripserunt.

Quid de pi-  
lis per vrinā  
excretis sen-  
sien.

è mammis emanasse, persuasum fuisse, vel si verè emanarunt (quod mihi tamen adhuc videre non contigit, sicuti nec in urinis), non eadem verè, quæ deglutita fuerint, sed quid ijs simile in mammis ipsiis à natura ludente genitum eo modo, quo tophos, lapides, neruulos, pilos, ac similia nonnunquam in varijs corporis partibus gigni, non ambigitur, statuentum est. Quippè, præterquam quod rarò, putandum est, pilos, herbarumq; surculos inconcisos deglutiri, hoc etiam dato, incredibile mihi videtur, posse ad mammas similia corpora perducì: siue enim per attractionem, (vti tenendum est), siue per impulsum, aut compressionem, vt vult Pecquetus, chyli perductio fiat, nunquam arbitrari licet posse dicta corpora in venas insumi, tum propter attrahentis facultatis naturam, quæ non nisi similia, ac familiaria exfugit, cæteris relictis, tum propter osculorum (quæcunque vel lactea, vel mesaraica sũt) exiguitatem, quæ non nisi liquida, ac tenuia admittunt; Et sic commentatur Vesallius similem Aristotelis pronunciationem de mammarum pilo, vt putat, per potum, vel cibum deglutito *lib. 7. de hist. ani. cap. 11.* (in quo potius vulgarem opinionem, quàm rationem, ac experientiam propriam videtur insequutus); scribens *lib. 5. de corp. hum. sapor. cap. 18.* nò esse credendum, per tot venarum ambages tale corpus ad mammas pervenire posse, cum alioqui non sit irrationabile, sicuti, & in renibus, & urinarijs meatibus, ita & in mammis posse pilos nasci, & inde egredi: „ Ait enim Hipp. *lib. de gland. num. 2.* Vbi glandulæ sunt, ibi & pilos „ nasci, colligentes id, quod in extremitates redundat, & efferuefcit. Quæ verba, etsi propriè de externis pilis audiantur, quid verat eadem concurrente causa, in internis quoque eosdem procreari?

Eiusdem census omnia alia problema à Bartholino, his præsis lacteis mediantibus soluta, benè consideranti videbuntur; cur scilicet diuretica ebibita nonnunquam proprium succum odorem in mictu conferuent (quod & de allio, & de alijs olidis edulij testatur Hippocr. *lib. 4. de morb. num. 32.*) & cur tam citò post frigidum potum aliquando hydrops, seu ventris ingens tumefactio succedat: Illud enim non ob breviorẽ viam inuentam (quæ talis non est, vt visum supra); Sed ob vim à remedio, ciboq; naturæ illatam, propter quam inalteratum remansit, & ad exitum, quicquid assumptum est, citò perductum fuit; hoc verò nò ob serum in peritoneo imbibitum simpliciter, ex quo parua procul dubio fieret ventris eleuatio; Sed potius ob statum multum a calore nativo imbecillitate eleuatum, qui in omnibus ventris cavitatibus occlusus, nullumq; inueniens exitum, aluum distendit, ac tumefacit. Et huius demonstratiua ratio est, quod, si à simplici potata substantia tumefactio produceretur, cum solum ad sesqui libram, verbigratia, aqua deglutita sit non magis eleuaretur venter, quàm sit aquæ ebibitæ moles, quæ abdominis cavitatum respectu minima est; videmus autem ad triplum, & quadruplum aliquando augeri, & sic etiam quandoque breuissimè solis calefacientibus, ac discutientibus adhibitis remedijs, citra manifestam

vacuationem

Eiusdem opinionis de ijs quæ per mammæ quondam exiisse, scripsere aliqui.

Cur quædam per urinam cum proprio odore excreantur.

Cur aliquando aqua ebibita statim replet intumescat.

vacuationem detumescere. Quod si sustineatur, à solo sero (vt in vera Ascite) fieri tumefactionem, nulla patentior via per lacteas, quàm per alias venas, nobis præferetur; dum inter peritoneum, & intestina aqua præter naturæ consuetudinem colligitur, quò per præternaturalem quoque exitum potius, quàm per naturales ductus eructatur.

Quid de vrinæ  
lacteis di-  
cendum.

Sed nec magis nunc apparet, cur aliquando visæ fuerint vrinæ lacteæ, quàm allas: neque enim melius putabitur id euenire ob lacteas venas, succum suum copiosius effundentes ob obstructionem aliquam in renes, quam vel ex iecoris imbecillitate, quæ immutatum chylum ad emulgentes perducit finit, (& hoc non nisi in pessimis morbis videbitur); vel in sæminis à lacteo succo à mammis ad vterum demandato, qui inde cum vrina exeat. Sed &, quod melius dicitur, huiusmodi vrinæ non chylum propriè, sed potius crudum succum, in malis habitibus aceruatum, aut alba menstrua in sæminis, muliebri fluxu laborantibus, aut crassi, incoctiq; spermatis in gallica lue inuoluntarium prouentum arguunt.

Quid de se-  
ro lacteo in  
phlebotomi-  
is extracto  
sentien.

Sic prorsus etiam solui potest exitus albi, & ferè lactei feri in sanguine per phlebotomiam extracto rarò adiuuenti; quod quidem non ex diducto per lacteas chylo produci, à nobis creditur; sed potius ex pituitoso succo in improspere coctionibus cum sanguine in venis coaceruato, sicuti & ipsemet postmodum Bartholinus in alio lib. defens. proficitur.

Nonnulla  
pro lactea  
Diui Pauli  
decolleti ef-  
fusione di-  
cuntur.

Quare non nisi per quandam hæresim hic Auditor lib. de lact. thorac. cap. 13. illud miraculum in Diui Pauli decollatione visum, nimirum lactis ex iugulatione profluuium, in dictas lacteas thoracicas, chylum propè iugulares venas effundentes, retorsit: cum omnino id naturaliter sit impossibile: quia, etiamsi, vt ipso ait, non nihil chyli per angustissima foraminula in axillares venas duceretur, manifestum est, statim à sanguinis in ijs commorantis rubore tinctum, ac à copiosiore illo euctum iri. Tantoq; magis contra euincitur, quod ipse cap. 12. prius dixerat, ad venas iugulares chylum nullo modo posse ascendere ob quasdam valvulas, quæ tale iter ad superiora impediunt, sicuti & idem alibi confirmavit; venas autem subclauias, seu axillares, in quas chylum à thoracica lactea effundi, ipse, & Pecquetus astruunt, infra collum esse, & propè clauiculas, manifestum est. Sicq; in decollatione nec poterat naturaliter chylus exire, nec vnquam id accidisse in rerum natura, nisi ex miraculo, (in Sanctæ Catharinæ quoque decollatione viso), credo, cuilibet historias profanas decollatorum relegenti constare. Sed & leuitas causæ à dicto Bartholino adductæ patet ex eo quod dixit, faciliè in Viro defatigato, imbecillo, & in carceribus detento id potuisse accidere; cum e contra hæ causæ potius lacti gignendo (vt quod nutrimenti vbertas est), obstant: aliud enim est serosum, albumq; exire sanguinem, aliud lacteum pro cruore succum effundi.

Hiscæ exemplis facile cuique est cæteras omnes soluere ambiguitates,

# CAPVT DECIMVMSEPTIMVM. 303

tes, quas per hæc inuenta »ascula, & per introductam circulationem tollere iactant Inuentores, quas lubens prætereo, ne tempus frustra conteram, & quia tantum non daturotium: facturus tamen, »bi ansa aliunde detur, aut necessitas cogat. Nunc »ero hic pedem sisto, & fatiscenti calamo anchoram pono.

Tu interim, benignissime Lector, si quicquam tibi senseris hosce meos aridere conceptus, ne putes Operæ meæ, sed proprio nostrorum Ve terum honori hoc esse adscribendum. Quippè is sum, qui fat laudis ex eo mihi euenturum spero, quod nostros semper habuerim in honore magistros, à quibus non secus, ac à Matribus lac, omnis nostra »irtus, omnis scientia, & ars dimanarunt. Sin forsan tibi hæc mea scripta ob »etustatem subiecti, & contentorum assuetudinem mucida, & nauscosa videbuntur, meos tamen saltèm nouos non aspernere labores.

FINIS.



1957-2017 100 YEARS

1991

